INDEX FUNGUS 1-20

DOOR

Dr R. A. MAAS GEESTERANUS

1953

INDEX FUNGUS 1 - 20

door

R. A. MAAS GEESTERANUS

INHOUD

		pagina
I.	Voorwoord	5
II.	Literatuurlijst	7
III.	Adreslijst	11
IV.	Artikelen en Mededelingen	12
V.	Auteurs	31
VI.	Bestuursmededelingen	48
VII.	Boekbesprekingen	51
VIII.	Determinatietabellen	54
IX.	Excursies, Tentoonstellingen, Voordrachten	55
X.	Figuren en foto's	58
XI.	In Memoriam	59
XII.	Redactioneel	60
XIII.	Vondsten in de pers	61
XIV.	Waarnemingen	64
XV.	Soortenlijst	66

I. VOORWOORD

Ons land kan niet bogen op een rijke literatuur over de hogere fungi. Toch is er reeds zoveel geschreven, dat het niemand meer mogelijk is, te overzien wat er over een hem op dat ogenblik interesserende soort uit ons land bekend is. Enerzijds moet de erkenning van dit feit een ieder, die zich degelijk wil inwerken, wel een bijzonder onzeker gevoel geven. Aan de andere kant, zou men aan die onzekerheid een eind willen maken, dan is het al een zeer ontmoedigende gedachte te bedenken, dat men alle tijdschriften, waarin mycologische artikelen verwacht kunnen worden, moet doorwerken, wil men zijn waarnemingen toetsen, of niet in herhalingen vallen, of zelfs fouten maken. De enige oplossing is het maken van een kaartsysteem. Maar welk een tijdrovend en veelal dubbel werk zou het zijn, indien ieder dat voor zich zelf zou doen. Daar ik een dergelijk kaartsysteem voor mijn werk toch nodig had, leek het mij niet anders dan natuurlijk ook anderen hiervan te laten profiteren. Roept echter niet uit: "hoera, nu zijn wij er", want voor U ligt slechts een index op twintig jaargangen van Fungus. Er zijn immers nog verschillende andere Nederlandse tijdschriften, die gegevens over fungi bevatten en hoewel mijn indices daarop ten dele in voorbereiding, ten dele gereed zijn, kunnen deze niet tezamen met die van Fungus gepubliceerd worden.

Een van onze beste mycologen schreef mij eens: "De waarde van Uw index staat of valt met de waarde, die men aan de soortnamen in Fungus wil toekennen." Dit is ontegenzeggelijk en helaas waar. Daarom zal iedere gebruiker van deze index zeer critisch te werk moeten gaan en voor zichzelf en telkens weer moeten uitmaken of een bepaalde determinatie als juist aanvaard kan worden. Pas als hij dat doet, meen ik, dat deze index aan zijn doel zal hebben beantwoord, namelijk een bijdrage te leveren om uiteindelijk de stand van de mycologie in ons land op een ander plan te brengen.

Hoe teleurstellend het ook moge klinken, de soortenlijst is niet volledig en kan het ook niet zijn. Nederlandse namen bijvoorbeeld zijn over het algemeen niet opgenomen. Voor de argumentatie verwijs ik naar Van Eyndhoven's opmerkingen in 14, p. 40.

Fungi van tentoonstellingen zijn, met uitzondering van voor ons land nieuwe of zeer bijzondere soorten, niet in de soortenlijst vermeld, omdat de juiste vindplaats niet meer is na te gaan. Hen, die desondanks prijs stellen op de volledigheid van het overzicht, verwijs ik naar de rubriek Excursies, Tentoonstellingen, Voordrachten, pag. 55-57.

Buitenlandse vondsten zijn evenmin opgenomen.

In een aantal gevallen is het mij door correspondentie gelukt om nauwkeurige(r) vindplaatsen te vermelden dan in Fungus opgegeven staan. Deze zijn dan in de soortenlijst aangeduid met de toevoeging (nadere informatie).

Hoewel ik er naar gestreefd heb om bij de nomenclatuur van de fungi de moderne zienswijzen te volgen, is mij dit noch altijd gelukt, noch soms wenselijk geleken. Het is uitermate moeilijk om te zeggen "dat is de juiste naam", en tenslotte heb ik mij steeds voor ogen gehouden, dat niemand gedwongen kan worden de zienswijze van anderen te aanvaarden. Ik heb voortdurend moeten overwegen aan welke naam de voorkeur te geven en heb mij daarbij de meer bezadigde houding van mycologen als Konrad en Maublanc - met wie ik het overigens niet in alles eens ben! - ten voorbeeld gesteld. Anders had U kennis moeten maken met namen als Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. ex Fr.)Singer & Smith (= Pholiota mutabilis) en Leucocoprinus naucinus (Fr.)Locq. (= Lepiota naucina). Namen, die met zovele andere misschien wel juist zijn, maar waarvan het niet aan mij ligt te beoordelen of zij juister zijn dan even recente andere namen. In de soortenlijst worden verder enkele soorten opgenomen, waarover ik in de mij ten dienste staande moderne literatuur niets heb kunnen vinden. Ik heb deze laten staan zoals zij waren, hoewel zij wellicht door specialisten veranderd of als dubieus geschrapt zouden zijn. Soms ook is het duidelijk, dat een bepaalde soort tot een ander geslacht gerekend moet worden. Het ligt echter niet op mijn weg en evenmin is deze soortenlijst de juiste plaats om in een dergelijk geval de nieuwe combinatie te maken. Ik heb dan volstaan met een korte opmerking.

Wat betreft het citeren van de auteursnamen, kan ik vermelden, dat ik over deze kwestie met enkele mycologen van wereldnaam heb gecorrespondeerd en als resultaat daarvan tot de huidige oplossing ben gekomen. Deze is derhalve niet onoverwogen, maar evenmin overdreven. Of zij goed is, zal de tijd leren, slechts zij opgemerkt, dat de methode der Franse school, die ook in ons land aanhangers heeft, beslist onjuist is.

Tenslotte rest mij nog een woord van bijzondere dank aan het Bestuur onzer Vereniging voor de geboden gelegenheid deze index te publiceren.

II. L I T E R A T U U R L I J S T

(gebruikt bij het opstellen van de soortenlijst)

Ainsworth, G.C. and Bisby, G.R., A Dictionary of the Fungi - Kew, 1950.

Berkeley, M.J., Outlines of the British Fungology - London, 1860.

Boudier, E., Histoire et Classification des Discomycètes d'Europe - Paris, 1907.

--- , Icones Mycologicae, vol. 1-4 - Paris, 1905 - 1910.

Bourdot, H. et Galzin, A., Hymenomycètes de France, vol. 1 - Sceaux, 1927.

Bresadola, J., Iconographia Mycologica, vol. 1-26 - Mediolani, 1927-1933.

Buchwald, N.F., Studies in the Sclerotiniaceae. I. Taxonomy of the Sclerotiniaceae - Contr. Dept. Plant Pathol. Copenhagen, no 32, 1949.

Cejp, K., Omphalia(Fr.)Quél. - Kavina & Pilát, Atlas des Champignons de l'Europe, vol. 4 - Praha, 1936.

Coker, W.Ch. and Couch, J.N., The Gasteromycetes of the Eastern United States and Canada - Chapel Hill, 1928.

Cooke, M.C., Handbook of British Fungi, vol. 1-2 - London, 1871.

--- , idem, 2nd and revised edition - London, 1883.

--- , Mycographia, seu Icones Fungorum, vol. 1, Discomycetes, part 1 - London, 1879.

--- , Illustrations of British Fungi(Hymenomycetes), vol. 1-8 - London, 1881-1891.

Corner, E.J.H., A Monograph of Clavaria and allied Genera - Ann. Bot. Mem., no 1, 1950.

Cunningham, G.H., The Gasteromycetes of Australia and New Zealand - Dunedin, 1942.

Donk, M.A., Revisie van de Nederlandse Heterobasidiomycetae (uitgez. Uredinales en Ustilaginales) en Homobasidiomycetae-Aphyllophoraceae. Deel 1 - Med. Nederl. Mycol. Ver., vol. 18-20, 1931, p. 67 - 200.

--- , Revision der niederländischen Homobasidiomycetae-Aphyllophoraceae II - Med. Nederl. Mycol. Ver., vol. 22, 1933.

Eyndhoven, G.L. van, Das Genus Tulostoma in den Niederlanden - Med. Nederl. Mycol. Ver., vol. 24, 1937, p. 7-11.

--- , Uebersicht über die Verbreitung der Genera Geastrum, Myriostoma und Astraeus in den Niederlanden - Med. Nederl. Mycol. Ver., vol. 24, 1937, p. 20-48.

Favre, J., Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens et de quelques régions voisines - Matériaux pour la Fl. Cryptogam. Suisse, vol. 10, fasc. 3 - Berne, 1948.

Fries, E., Observationes Mycologicae - Havniae, 1815.
--- , Systema Mycologicum I - III - Gryphiswaldiae, 1821-1832.
--- , Epicrisis systematis Mycologici - Upsaliae, 1836-1838.
--- , Summa vegetabilium Scandinaviae, sectio posterior - Holmiae et Lipsiae, 1849.
--- , Hymenomycetes Europaei - Upsaliae, 1874.
Fuckel, L., Symbolae Mycologicae, Beiträge zur Kenntniss der Rheinischen Pilze - Wiesbaden, 1869.
--- , idem, Nachträge I - III - Wiesbaden, 1871-1875.
Gal, Mme M. le, Florule mycologique des Bois de la Grange et de l'Etoile. Discomycètes - Rev. de Mycol., N.S., vol. 2, 1937, p. 150-162, 197-222.
--- , Quelques Galactinia de la Flore Française - Rev. de Mycol., N.S., vol. 4, 1939, p. 169-186; vol. 5, 1940, p. 102-112; vol. 10, 1945, p. 90-95.
--- , Les Aleuria et les Galactinia - Rev. de Mycol., N.S., vol. 6, 1941, Suppl., p. 56-82.
Gilbert, E.J., Le genre Amanita Persoon - Thèse, Paris, 1918.
--- , Amanitaceae in Bresadola, Iconographia Mycologica, vol. 27, suppl. 1, fasc. 1-3, 1940.
Grelet, L.J., Les Discomycètes de France d'après la classification de Boudier - Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, Sect. rég. Bot., 1932-1939 en Rev. de Mycol., N.S., vol. 7-14, 1942-1949.
Hollós, L., Die Gasteromyceten Ungarns - Leipzig, 1904.
Huijsman, H.S.C., Observations sur le "genre" Lepiota - Med. Nederl. Mycol. Ver., vol. 28, 1943, p. 3-60.
--- , Lepiota pseudo-lilacea nov. spec. - Bull. Soc. Linn. Lyon, vol. 16, 1947, p. 180-182.
Kallenbach, Fr., Die Röhrlinge (Boletaceae) in Die Pilze Mitteleuropas, vol. 1 - Leipzig, 1926-1938.
Kern, Hs., Die Röhrlinge, Boletaceae - Olten, 1945.
Knauth, B. und Neuhoff, W., Die Milchlinge (Lactarii) in Die Pilze Mitteleuropas, vol. 2B, pars 5 - Leipzig, 1937-1943.
Konrad, P. et Maublanc, A., Icones selectae Fungorum, vol. 1-6 - Paris, 1924-1937.
--- --- , Les Agaricales. Agaricaceae in Encyclopédie Mycologique, no 14 - Paris, 1948.
Kühner, R., Notes sur le genre Inocybe - Bull. Soc. Mycol. France, vol. 49, 1933, p. 81-121.
--- , Recherches sur le genre Lepiota - Bull. Soc. Mycol. France, vol. 52, 1936, p. 177-238.

Kühner, R. et Boursier, J., Notes sur le genre Inocybe - Bull. Soc Mycol. France, vol. 48, 1932, p. 118-161.
Lange, J.E., Flora Agaricina Danica, vol. 1-5 - Copenhagen. 1935-1940.
Lange, M., Species concept in the Genus Coprinus. A study on the significance of intersterility - Dansk Bot. Ark., vol. 14, 1952, no. 6.
Locquin, M., Notes sur les Lépiotes II - Bull. Soc. Linn. Lyon. vol. 14, 1945, p. 44-63, 82-100.
---, Notes sur les Lépiotes III. Synonymie des espèces figurées dans la Flora Agaricina Danica de Lange - Bull. Soc. Linn. Lyon, vol. 15, 1946, p. 17-18.
Malençon, G., Les Truffes Européennes - Rev. de Mycol., vol. 3, Mém. 1 1938.
Massee, G., British Fungus-Flora, vol. 1-4 - London, 1892-1895.
Müller, E., Die schweizerischen Arten der Gattung Leptosphaeria und ihrer Verwandten - Sydowia, vol. 4, 1950, p. 185-319.
Nannfeldt, J.A., Studien über die Morphologie und Systematik der nichtlichenisierten inoperculaten Discomyceten - Nov. Act. Reg. Soc. Sci. Upsal., ser. 4, vol. 8, 1932, no 2.
---, The Geoglossaceae of Sweden - Ark. f. Bot., vol. 30 A, 1942, no. 4.
Neuhoff, W., Die Gallertpilze (Tremellineae) in Die Pilze Mitteleuropas, vol. 2 A - Leipzig, 1935-1936.
---, Die Gallertpilze Schwedens (Tremellaceae, Dacrymycetaceae, Tulasnellaceae, Auriculariaceae) - Ark. f. Bot., vol. 28 A, 1936, no 1.
Nüesch, E., Die Trichterlinge. Monographie der Agariceen-Gattung Clitocybe mit Bestimmungsschlüssel - St. Gallen, 1926.
Oort, A.J.P., De Nederlandsche Mycena's - Med. Nederl. Mycol. Ver., vol. 16-17, 1928, p. 184-255.
Pearson, A.A., Notes on the Boleti - Naturalist, 1946, p. 85-99.
---, The genus Russula - Naturalist, 1948, p. 85-108.
---, The genus Russula. Second and revised edition - Naturalist 1950, p. 1-24.
---, British Boleti - Naturalist, 1950, p. 1-19
---, The genus Lactarius - Naturalist, 1950, p. 81-99.
Perdeck, A.C., Revision of the Lycoperdaceae of the Netherlands - Blumea, vol. 6, 1950, p. 480-516.
Persoon, C.H., Synopsis methodica Fungorum - Gottingae, 1801.
---, Mycologia Europaea, vol. 1-3 - Erlangae, 1822-1828.
Phillips, W., A Manual of the British Discomycetes, etc. - London, 1887.
Pilát, A., Pleurotus Fries in Kavina & Pilát, Atlas des Champignons de l'Europe, vol. 2 - Praha, 1935.

Pilát, A., Polyporaceae in Kavina & Pilát, Atlas des Champignons de l'Europe, vol. 3 - Praha, 1936-1942.

--- , Revision der Gattung Lentinus Fr. aus dem Herbar des Naturhistoriska Riksmuseet in Stockholm - Ann. Mycol., vol. 39, 1941, p. 71-103.

--- , The Bohemian species of the Genus Agaricus - Act. Mus. Nation. Pragae, vol. 7 B, 1951, no 1.

Quélet, L., Les Champignons du Jura et des Vosges, vol. 1-2 - Paris, 1870-1873.

--- , Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium - Lutetiae, 1886.

--- , Flore Mycologique de la France et des pays limitrophes - Paris, 1888.

Rea, C., British Basidiomycetes. A Handbook to the larger British Fungi - Cambridge, 1922.

Rehm, H., Ascomyceten in Rabenhorst, Kryptog.-Fl. Deutschl., ed. 2, vol. 1, pars 3 - Leipzig, 1896.

Ricken, A., Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der angrenzenden Länder, besonders Oesterreichs und der Schweiz - Leipzig, 1915.

Romagnesi, H., Classification du genre Drosophila Quélet - Bull. Soc. Linn. Lyon, vol. 13, 1944, p. 51-54.

--- , Synonymie de quelques-unes des espèces figurées dans la Flora Agaricina Danica de J.E. Lange - Bull. Soc. Mycol. France, vol. 60, 1944, p. 82-87.

Saccardo, P.A., Sylloge Fungorum, vol. 1-25 - 1882-1931.

Schaeffer, J., Russula Monographie - Ann. Mycol., vol. 31, 1933, p. 305-516; vol. 32, 1934, p. 141-243.

Seaver, F.J., The North American Cup-Fungi (Operculates) - New York, 1928.

--- , Idem, supplement - New York, 1942.

--- , The North American Cup-Fungi (Inoperculates) - New York, 1951.

Singer, R., Monographie der Gattung Russula - Hedwigia, vol. 66, 1926. p. 163-260.

--- , Neue Mitteilungen über die Gattung Russula - Hedwigia, vol 68, 1928, p. 191-202; vol. 69, 1929, p. 253-261.

--- , Monographie der Gattung Russula - Beih. Bot. Centralbl., vol. 49, Abt. 2, 1932, p. 205-380.

--- , The "Agaricales" (Mushrooms) in modern taxonomy - Lilloa, vol. 22, 1949.

Singer, R. and Smith, A.H., A Monograph on the Genus Leucopaxillus Boursier - Pap. Michigan Acad. Sci. Arts. Lett., vol. 28, (1942)1943, part 1, p. 85-132.

Smith, A.H., Studies in the Genus Agaricus - Pap. Michigan Acad. Sci. Arts. Lett., vol. 25, (1939)1940, part 1, p. 107-138.
--- , The North American species of Mycena - Ann Arbor, 1947.
Smith, A.H. and Singer, R., A Monograph on the Genus Cystoderma - Pap. Michigan Acad. Sci. Arts. Lett., vol. 30, (1944)1945, part 1, p. 71-124.
Smith, H.V., The Genus Limacella in North America - Pap Michigan Acad. Sci. Arts. Lett., vol 30, (1944)1945, part 1, p. 125-147.
Sydow, P. et H., Monographia Uredinearum, vol. I-IV - Lipsiae 1904-1924.
Velenovsky, J., Monographia Discomycetum Bohemiae - Pragae 1934.
Veselý, R., Amanita in Kavina & Pilát Atlas des Champignons de l'Europe, vol. 1 - Praha, 1934.
Viennot-Bourgin, G., Les Champignons Parasites des plantes cultivées, vol. I-II - Paris, 1949.

III. ADRESLIJST

Adressen - 8, p. 2-7; 12, p. 33-38; 16, p. 51-59.

ADDENDA

Heim, R., Le genre Inocybe in Encyclopédie Mycologique I - Paris, 1931
Kühner, R., Le genre Galera (Fries) Quélet in Encyclopédie Mycologique VII - Paris, 1935.
--- , Le genre Mycena (Fries) in Encyclopédie Mycologique X - Paris, 1938.

IV. ARTIKELEN en MEDEDELINGEN

(gerangschikt naar de belangrijkste slagwoorden)

Aanvulling, Een kleine (de Veye) - 10, p. 25-26.
Aardappelbovist, Het drama van de (de Veye) - 6, p. 10-11.
Aardster-flora van Amsterdam, De (van Eyndhoven) - 12, p. 78-79.
Aardsterren en boomen ?, Bestaat er verband tusschen (van Eyndhoven) - 6. p. 85-86.
Aardsterren, Het bewaren van gedroogde (van Eyndhoven) - 5, p. 56.
Aardtong en truffelknotszwam (de Veye) - 6, p. 84-85.
Afbeeldingen van Nederlandse paddestoelen, Navraag omtrent (Boetje-van Ruyven) - 8, p. 43.
Afwijking bij Geaster striatus D.C., Een merkwaardige (van Eyndhoven) - 6, p. 69.
Afwijkingen bij paddestoelen, Enkele zeldzame (Wildervanck) - 19, p. 13-17.
Albinisme bij paddestoelen (van der Lek) - 10, p. 24-25.
Albino's onder de paddestoelen (van der Lek) - 10, p. 12.
Allerhande (Mycol. persberichten; Verzoek om medewerking; promotiebericht; Flora Agaricina Danica; van den redacteur) (de Veye) - 6, p. 57-58.
Amanitopsis strangulata Fr. en nog iets (G.A.de Vries) - 13, p. 10-12.
Ambrosia (van den Bergh) - 18, p. 31-33, 49-51.
Ambrosia-gallen (Docters van Leeuwen) - 18, p. 47-49.
Amoebe met een staartje, Een (Middelhoek) - 11, p. 59-61.
Amsterdam als paddestoelendorado (Kleijn) - 8, p. 38-39.
Amsterdam, De paddenstoelen-inventaris van (Akke de Vries) - 5, p. 69-70.
Amsterdam, De Zuidelijke wandelweg bij (Smit) - 8, p. 67.
Amsterdam en de mycologie (Akke de Vries) - 5, p. 51-54.
Amsterdam, Fungi in (Kleijn) - 11, p 24.
Amsterdam's aardster-flora (van Eyndhoven) - 12, p. 78-79.
Apeldoorn 21-22 Sept. 1940, Met de N.M.V. op excursie in de omstreken van (de Veye) - 12, p. 2-5.
Arachnopeziza aurelia (Fr. ex Pers.) Fuck., een nieuwe Discomyceet voor ons land? (Gremmen) - 18, p. 4-6.
Ardennen, Interessante vondsten in de (Oort) - 9, p. 26-27.
Armillaria mellea (Vahl) Quél., Onderzoekingen over (van Vloten) - 8, p. 20-23.
Ascomyceten, Een bijdrage tot de kennis der Nederlandse (Gremmen) - 17, p. 32-34.

Ascomyceten in de omgeving van Eindhoven, Eenige opmerkingen over het voorkomen van sommige minder algemeene (Daams) - 15, p. 31-32.
Asco's, Een paar nieuwe (Schweers) - 8, p. 66-67.
Badhamia utricularis (Berk.), Nieuwe voedsterzwam voor (Schweers) - 7, p. 77.
Bekeerd (Huÿsman) - 1, p. 5-7.
Bekerzwam, De blaasvormige (de V.) - 8, p. 45.
Bekerzwam, De grote bruine (de V.) - 6, p. 21.
Bekerzwammen, Oranje (Bakker) - 10, p. 38-39.
Bekerzwammetjes in den winter (Kleijn) - 8, p. 55-56.
Belangrijk bericht (de Veye) - 5, p. 13-14, 27-28.
Belonioscypha sensu Rehm en de identiteit van B. ciliatospora (Fuck.) Rehm en Helotium scutula (Pers. ex Fr.) Karst. (Gremmen) - 20, p. 7-17.
Berkenboleet en zijn verwanten, Over de (Maas Geesteranus) - 16, p. 13-16, 27-30.
Berkenboleet, Nogmaals de "groene" (Schweers) - 6, p. 70-71.
Betuwe, Enkele merkwaardige vondsten uit de (Verschueren) - 6, p 8-9.
Biefstukzwam op het hout van eiken, De invloed van de (Schoevers) - 10, p. 19-21.
Blauwzuur in paddestoelen (Schravesande) - 18, p. 6.
Bloedstelpende werking van Rhacodium Cellare (Pers.) (Ligteaberg) - 10, p. 65-66.
Boekbesprekingen - zie aparte rubriek.
Boleet ?, Een nieuwe (Bouwman) - 1, p. 53-54.
Boleet, Een purperroode (F.) - 1, p. 25-26.
Boleten, De Nederlandsche (Joman) - 6, p. 46-48, 62-63, 82-84.
Boleten, Over (Huÿsman) - 18, p. 17-23, 37.
Boletus aurantiacus Roques ex Bulliard (van Eyndhoven) - 16, p. 16-17.
Boletus auriporus Peck 1872 (van Eyndhoven) - 11, p. 22-23.
Boletus auriporus Peck 1872, Een nieuwe boleet voor ons land (van Eyndhoven) - 7, p. 27-30.
Boletus parasiticus op Scleroderma vulgare (Edie) - onderschrift (R.) 3, p. 39-40.
Boletus pseudo-sulphureus Kallenbach, De nieuwe boleet (Bouwman) 1, p. 62.
Boletus Rhodoxanthus (Krombh.) Kbch. (van Eyndhoven) - 5, p. 33-34.
Boletus rufescens (Secr.) Konrad (Middelhoek) 15, p. 10-11.
Boletus scaber en rufus, Kleurvariaties bij (Akke de Vries) - 6, p. 55.
Boting-fonds. Attentie voor het (de Veye) - 11, p. 48.
Boting-fonds, Nogmaals het Hendricus (de V.) - 9, p. 14.

Brabant, Nieuws uit (Daams) - 17, p. 63-65.
Brand, Na de (Boetje-van Ruyven) - 19, p. 23-24.
Brandnetelklokje (de Veye) - 9, p. 54-56.
Brandplek-ervaringen, Enkele (de Veye) - 10, p. 39.
British Mycological Society, De Jubilee Meeting van de (Oort) - 17 p 51-52
Buitenlandse litteratuur, Uit de - zie onder rubriek Boekbesprekingen.
Cantharellus olidus - Geurende cantharel (Oort) - 6, p. 25-27.
Ceratostomella ulmi, de geslachtelijke vorm van Graphium ulmi Schwarz (M.) - 3, p. 77-78.
Ceratostomella ulmi in de poppenwiegen van de iepenspintkever ?, Door welke oorzaak ontstaan de coremia van (Fransen) - 7, p. 39-41.
Chaam, Paddenstoelenvondsten in de omgeving van (Walrecht) - 6 p. 34-35.
Champignon-kweekerij van de Herofabrieken, Een bezoek aan de (Clerx) - 3 p. 3-5.
Champignon, Mijn grootste (Schoevers) - 11, p. 9-11
Champignons prédateurs" Les (verslag van lezing en film) (van den Bergh) - 17, p. 57-61.
Claudopus byssisedus (Fr ex Pers.) Gillet, Over een mycophagische eigenschap van (Schweers) - 14, p. 10-11.
Clitocybe olearia (De Candolle) R Maire een nieuwe aanwinst voor onze fungiflora (de Veye) - 11, p. 53-58.
Clitocybe vibecina, Heksenkringen van (Clerx) - 3, p. 64-65.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not. (Gremmen) - 17, p. 4-5.
Conserveeren van paddenstoelen (Meulenhoff) - 2, p. 81-82.
Conserveermiddel voor paddenstoelen (Uffelie) - 9, p. 45.
Coprinus atramentarius en alkohol (Wildervanck) 20, p. 4-6
Coprinus comatus (Boting) - 5, p. 56-57.
Coprinus comatus, Andermaal (Bakker) - 5, p. 94.
Coprinus dilectus Fr. (van der Laan) - 14, p. 75.
Coprinus geb atramentarius, De kinderkamer van de familie (de Veye) - 6, p. 72-73.
Cordyceps capitata en C. ophioglossoides (Wildervanck) - 16, p 46
Cordyceps-soorten, Indische (de Lint) - 7, p. 30.
Cortinarius soorten, Enkele voor ons land nieuwe (de Veye) - 6 p. 48-52
Craterellus sinuosus e.a. (Klein) - 10, p. 36.
Daedalea en Trametes (Bakker) - 8, p. 41
Daldinia concentrica (Bolt ex Fr) Ces et De Not. (van Kregten) - 16, p. 4-6.
Dankbetuiging (de V.) - 5, p. 26-27.

Dank, Een woord van (de Lint) - 18, p. 76.
Delden !, Komt naar (Schweers) - 1, p. 17-18.
Delden, Onze excursie in de omstreken van - 1, p. 29-30.
Denekamp, Herinneringen aan enkele vacantiedagen te (Huÿsman) - 13 p. 46-48
Dennenmoorder en zwavelkopje als concurrenten (Oort) - 20 p. 2-4.
Dennenschelpje, Het (de Veye) - 5, p. 73-74.
Desmazierella acicola Lib. (Schweers) - 12, p. 73-75.
Desmazierella acicola Lib., De imperfecte vorm van (Gremmen) - 19, p.32-35.
Determineeren, Foutief (Bakker) - 14, p. 59-60
Determineeren van de hoogere fungi, Het (Meulemeester) - 2e aankondig no, p. 2-5.
Determineertabel voor de geslachten der witsporige plaatjes-zwammen (van Eyndhoven) - 14, p. 15-17.
Determineertabellen voor de geslachten der gekleurdsporige plaatjes-zwammen (van Eyndhoven) - 15, p. 19-22.
Diagnose, Om een (Middelhoek) - 12, p. 27-30.
Dichomyces princeps Thaxter (Middelhoek) - 12, p. 76-77.
Dictyophora, De sluier van (Reijnders) - 11, p. 49-53.
Dictyophora duplicata (Bosc)Ed Fischer in Nederland ? (Zaneveld) - 10. p. 48-49.
Dictyophora duplicata (de gesluierde dame) waarschijnlijk reeds in 1917 in ons land gevonden en andere belangrijke Phalloideeën-vondsten hier te lande (Reijnders) - 11, p. 29-35.
Disciseda cervina (Berk.)Cunningham een nieuwe aanwinst voor ons land (van Eyndhoven) - 10, p. 55-57.
Discomyceet, parasiteerende op het steenlevermos, Een nieuwe exotische (Schweers) - 17, p. 36-37.
Disco's der Nederlandsche flora, Kleine bleeke (Schweers) - 12 p. 43.
Disco's der Nederlandsche flora, Kleine bruine of zwarte (Schweers) - 12, p. 42 43.
Disco's der Nederlandsche flora, Kleine gele en roode (Schweers) - 12 p. 24-25, 42.
Diversen - 5, p. 75-77; 6, p. 19, 40, 57-58, 73-74, 90; 7, p. 18, 35-36 51-52, 64, 80.
Dothidella ulmi (puv)Winter en zijn levenswijze (Gremmen) - 19, p.8-10.
Drente, Enige aardige vondsten in (Reijnders) - 12, p 7-11, 57-62
Droogte en toch . . of wel: ende desespereert niet! (van den Bergh) 18. p. 7-8.
Droogtevormen van Collybia maculata, Twee merkwaardige (Akke de Vries) 6, p. 33.

"Education mycologique" (Wilhadus) - 5, p. 34-35.
Eerelid, Ons tweede (de V.) - 5, p. 26-27.
Eerstelingen (Klein) - 10, p. 66.
Eetbaarheid van zwammen, Over (Valckenier Suringar) - 4, p. 11-12.
Eikhaas die een beukhaas bleek te zijn, Van een (de Veye) - 11, p. 27.
Eikhaas en reuzenzwam (de Veye) - 5, p. 70-71.
Eindhoven in 1949, Paddenstoelenvondsten in de omgeving van (Daams & Westmijze) - 19, p. 61-64.
Enschede, Met de Mycologische op excursie in de omstreken van (de Veye) - 9, p. 17-19.
Entoloma sphagneti R.Naveau n.s. 1923 (Schweers) - 19, p. 10.
Eten van paddestoelen door eekhoorns (van Eyndhoven) - 12, p. 64-65.
Excursies op kleinere schaal, Plan voor districtsgewijze (Smit) - 14, p. 36.
Excursie-verslagen - zie aparte rubriek.
Fabius als Fungus-redacteur (Reijnders) - 3, p. 73-74.
Fabius, Generaal (Wilhadus) - 3, p. 72-73.
Fistulina hepatica, Het vruchtlichaam van de biefstukzwam (Reijnders), 8, p. 58-63.
Flammula henningsii Bres. (Westmijze) - 19, p. 30-32.
Fluweelpootje tusschen gras (Clerx) - 3, p. 64-65.
Fomes annosus Fr., Waarnemingen over (van Vloten) - 7, p. 25-27.
Fotografeeren van paddestoelen (Bouwman) - 1e aankondig. no, p. 4-7.
Fransche alpen, Mycologische vondsten in de (Swanenburg de Veye) - 4, p. 3-6, 19-23.
Franse mycologen, Het congres van de (Westmijze) - 18, p. 73-75.
Fransche mycologen op stap, Met de (Huÿsman) - 9, p. 23-24.
Fransche mycologen op stap, Met de (Schweers) - 6, p. 86-88.
Fuligo septica, Enorme ontwikkeling van (v.d.Lek) - 5, p. 91.
Fungilore - 1e aankondig.no. p. 11-12.
Fungilore (F.) - 1, p. 10.
Fungilore. Een en ander omtrent het woord paddenstoel en verwanten (Brakman) - 1, p. 21-23.
Fungilore. Judasziel. Middel tegen koorts (Andriesse) - 2, p. 81.
Fungilore. Volksgeloof en Vogelnestzwammetjes (Fabius) - 2, p. 80-81.
Fungilore, Vragenlijst over - 12, p. 50-51.
Fungi van de Kaloot, Een paar (Maas Geesteranus) - 20, p. 69-71.
"Fungus" fundatus ! - 2, p. 1.
Fungus 10 jaar ! (Reijnders) - 10, p. 44-45.
Fungus 15 jaar ! (Reijnders) - 15, p. 15-16.
Gallen op paddenstoelen (van Eyndhoven) - 14, p. 67-69.
Gallen op paddenstoelen, 4e mededeeling (van Eyndhoven) - 15, p. 30-31.

Ganoderma voor ons land? Een nieuwe (Oets) - 16, p. 32.
Geaster nanus P. met triplex-kraag (van Eyndhoven) - 7, p. 57.
Geaster rufescens P., Een merkwaardige afwijking bij (van Eyndhoven) - 7, p. 57-58.
Geaster striatus D.C., Een merkwaardige afwijking bij (van Eyndhoven) - 6, p. 69.
Geaster triplex Jungh. (van Eyndhoven) - 6, p. 12.
Geastrum nanum Pers. met twee peristomen (Van Ooststroom) - 14, p. 49.
Geastrum schaefferi Vitt., Een nieuwe aardster voor Nederland (van Eyndhoven) - 12, p. 11-12.
Gekraagde aardster (Geastrum triplex Jungh.) Een merkwaardige groep van de (van Eyndhoven) - 11, p. 26.
Gekraagde aardster met dubbel peristoom (van Eyndhoven) - 7, p. 7-8.
Geopyxis ammophila (Dur. et Lév.) Sacc. (= Peziza sabulicola Dunal) (Schweers) - 5, p. 64-65.
Gepeperde melkzwam, Een en ander over de (de Veye) - 5, p. 17.
Gesluierde dame, De (Klein) - 11, p. 8-9.
Gesluierde dames in één tuin, Negen (Boetje-van Ruyven) - 11, p. 46-47.
Giftige paddenstoelen (M.) - 1, p. 73-74.
Giftpilze und Pilzvergiftigungen, Ueber (Welsmann) - 6, p. 77-78.
Glinsteringen (Klein) - 11, p. 25.
Glinsteringen der jaren 1940 en 1941 (Schweers) - 13, p. 34.
Glinsteringen der jaren 1946 en 1947 (Schweers) - 18, p. 34.
Glinsteringen des jaars (Schweers) - 2, p. 64; 3, p. 75-76; 8, p. 37-38.
Glinsteringen des jaars 1935 (Schweers) - 7, p. 55-56.
Glinsteringen des jaars 1937 (Schweers) - 9, p. 39-40.
Glinsteringen des jaars 1938 (Schweers) -10, p. 37.
Glinsteringen des jaars 1939 (Schweers) -11, p. 43.
Glinsteringen des jaars 1942 (Schweers) -14, p. 66.
Glinsteringen des jaars 1943 (Schweers) -15, p. 11.
Glinsteringen des jaars 1944 (Schweers) -16, p. 31.
Glinsteringen des jaars 1945 (Schweers) -17, p. 6.
Glinsteringen van een fungi-arm jaar (Meijer) - 18, p. 52-53.
Gloeoglossum affine Durand een nieuwe aardtong voor Europa (Schweers) - 20, p. 68-69.
Gorssel als mycologische delicatesse opgediend krijgt! Wat ge te (de Veye) - 7, p. 8-10.
Gorssel op 12 en 13 Oct. 1940, Algemeene ledenexcursie der N.M.V. te (Smits) - 12, p. 19-21.
Gorsselsche excursie (4-5 Oct. 1935), Na de (Smits) - 7, p. 77.
Groene knolzwam, Signalement van de - 3, p. 46-47.

Groene schimmels (Lütjeharms) - 2, p. 30.
Groene schimmels (M.) - 1, p. 9, 28, 46.
Groningen Mycologische vondsten op een fabrieksterrein, Paddenstoelen-nieuws uit (Swanenburg de Veye) - 2, p. 33-37, 50-53.
Grijze klokjes (Klein) - 7, p. 12-13.
Gyromitra (Helvella) gigas Krombh. (van Eyndhoven) - 5, p. 91-92
Hebeloma sacchariolens, Ongewone ontwikkeling van (van der Lek) - 10, p. 61-63.
Heksenkring, De geschiedenis van een (van der Lek) - 7, p. 10-11.
Heksenkringen en antibiotica (Hueck) - 17, p. 1-4.
Heksenkringen en antibiotica, Rectificatie op (Hueck) - 17, p. 44
(Helvella ephippium Lév.), Een zeldzame Helvella weergevonden (Kleijn en Agsteribbe) - 14, p. 73-74.
Helvella queletii Bres. (Schweers) - 13, p. 24-25.
Herfstkleuren (Schravesande) - 16, p. 47-48.
Hoorn van Overvloed bij Gieten, De (de Veye) - 12, p. 17.
Hoorn van Overvloed, Een nieuwe rijk voorziene vindplaats van de (de Veye) - 9, p. 11-12.
Huidverschijnselen veroorzaakt door eetbare paddestoelen (de Veye) - 13, p. 28.
Hulpbetoon, Onderling (Redactie) - 18, p. 54-55.
Hulp gevraagd (Smit) - 17, p. 28.
Hydnotria tulasnei (Middelhoek) - 16, p. 19.
Hydnum erinaceum, Een Nederlandschen naam voor - 3, p. 48.
Hygrometrische aardster, Astraeus hygrometricus, in het westen des lands (van Eyndhoven) - 17, p. 30-32.
Hygrophorusweide, een associatie (Andreas) - 20, p. 66-68.
Hygrophorusweide, een associatie (Schweers) - 19, p. 17-18.
Hymenogaster tener (Berk.), een nieuw geslacht en een nieuwe soort voor Nederland (G.A.de Vries) - 11, p. 20-21.
Ieperziekte - 1, p. 36.
Indië, Mycologische waarnemingen in (Lütjeharms) - 9, p. 3-5.
Inktzwammen met rode inkt (Boetje-van Ruyven) - 10, p. 25.
Inktzwammen zonder inkt (de Veye) - 10, p. 12.
Inleiding, Ter (Oort) - 5, p. 1.
Inocybe fulvida Bres. (Schweers) - 15, p. 2-3.
Inocybesoorten uit ons land, Nieuwe (Huÿsman) - 7, p. 5-7.
Inocybe's, Twee (Reijnders) - 13, p. 44-46.
Intermezzo (de V.) - 9, p. 29.
Internationale band tusschen mycologen, Een - 2e aankondig.no, p. 10.
Isaria farinosa (Klein) - 9, p. 10.

Isaria's in ons land ?, Hoe staat het met de (Daams) - 18, p. 44-46.
Jaarverslag van den secretaris - zie rubriek Bestuursmededelingen.
Jubileums-paddenstoelententoonstelling te doen slagen, Leden helpt allen mee onze (Swanenburg de Veye) - 18, p. 42-44.
Judasoor in onze oude kruidboeken, Het (van Dijk) - 14, p. 27-30.
Kampernoeljes of Champignons (F.) - 2e aankondignno. p. 5-7.
Kapjesmorielje, De (Klein) - 5, p. 90-91.
Kegel-mycena, De (Klein) - 7, p. 50.
Kennemerland, Eenige vondsten in (Boting) - 4, p. 24-25, 61.
Kerstgaven (Klein) - 9, p. 46.
Keverschimmels op een gastheer, Twee (Middelhoel) - 16, p. 6-8.
Kleine Stinkzwam, De (van de Wouw) - 3, p. 32.
Kleinigheden (Klein) - 11, p. 64-65.
Kleuren (Bakker) - 16, p. 8.
Koeienboleet en rose spijkerzwam (de Veye) - 6, p. 88-89.
Kopergroenzwam en brandnetels (Klein) - 8, p. 40.
Kopschimmel, Een (Klein) - naschrift (de Veye) - 6, p. 69-70.
Krulzoom zoekt het hooger op, De (van der Lek) - 13, p. 35-37.
Kweken van paddenstoelen, Het (Andriesse) - 3, p. 5-7.
Laboulbeniacae voor ons land, Een nieuwe (Middelhoek) - 13, p. 52-53.
Laboulbenia flagellata Peyritsch, een merkwaardige en voor Nederland nieuwe fungus (Zaneveld) - 9, p. 61-65.
Laboulbeniales voor ons land, Enige nieuwe (Middelhoek) - 14, p. 57-59, 71-72.
Leden onzer vereeniging, Aan het bestuur en aan alle (Huÿsman) - 9, p. 47-48.
Ledenvergadering- convocaties en verslagen - zie Bestuursmededelingen.
Ledenvergadering in Utrecht, Komt allen 14 Juli a.s. op de algemeene (de Veye) - 5, p. 79-80.
Lek erelid van onze vereniging, Dr van der (Swanenburg de Veye) - 17, p. 41-42.
Lentinus adhaerens Fries (1836) ex Albertini et Schweinitz, een nieuwe aanwinst voor onze fungiflora (G.A.de Vries) - 14, p. 46-47.
Lepiota brebissonii Godey (Huÿsman) - 12, p. 67-73.
Lepiota brebissonii Godey (van der Lek) - 20, p. 45-46.
Lepiota ?, Een tropische (van der Laan) - 15, p. 4-5.
Lepiota en nog wat, Over het geslacht (Huÿsman) - 9, p. 65-68.
Lepiota odorata Cool, Een nieuwe vindplaats van (Joman) - 5, p. 34.
Lepiota procera, Eigenaardige vindplaatsen van de grote parasolzwam (van der Lek) - 8, p. 15-16.
Lepiota pudica (Bull.) (Boting) - 6, p. 53.
Lepiota's en nog wat, Over (Huÿsman) - 9, p. 50-52.
Lepiota's in bloemenkassen; een nieuwe soort? (Meijer) - 14, p. 4-8.

Leptonia parasitica Quélet (= Claudopus subdepluens Fitzpatrick) (Meulenhoff) - 5, p. 84-86.
Levertraanzwam Naucoria cucumis (Pers.) Fr., De (de Veye) - 6, p. 27 - 29.
Lezing (over Coprinus) voor de flora-commissie, Verslag van een (Uffelie) - 18, p. 35-37.
Lichtende Mycena's (van der Lek) - 4, p. 42-44.
Lichtend hout (Fabius) - 2, p. 37-39; 3, p. 40-42.
Lichtgevende larven in boomzwammen (Schweers) - 12, p. 32.
Lütjeharms tot hoogleraar benoemd, Dr. W.J. (de V.) - 9, p. 29-30.
Lycoperdon-onderzoek, Voorlopig verslag van het (Maas Geesteranus en Perdeck) - 19, p. 18-22.
Maan invloed op den groei van paddenstoelen ? Heeft de (Fabius) - 3, p. 54-58.
Marasmius (Crinipellis) stipitarius (Fr.), De substraten van (van Eyndhoven) - 16, p. 34-35.
Martinet en de zwammen (Daams) - 20, p. 34-35.
Mea culpa (van den Bergh) - 19, p 23.
Mededeelingen van den conservator - 1e aankondiging no. p. 15-16; 2e aankondig.no. p. 14-15.
Medewerking aan de 14e paddenstoelen-tentoonstelling, Oproep tot (Bestuur en Tentoonstell. Commissie) - 2, p. 20-22.
Medewerking bij het verzamelen van Myxomycetes, Dringend verzoek om - 16, p. 25.
Medewerking gevraagd voor het verzamelen van gegevens omtrent de weide-champignon, Psalliota campestris (Bels) - 16, p. 24-25.
Medewerking (Inocybe), Verzoek om - 1e aankondig.no. p. 13; 2e aankondig. no. p. 12.
Medewerking, Nog een verzoek om (de Veye) - 10 p. 53.
Medewerking, Oproep tot (Boetje-van Ruyven) - 1, p. 52.
Medewerking, Oproep tot (Kruyt) - 11, p. 66.
Medewerking (Russula's), Verzoek om - 2e aankondig.no., p. 10-11.
Medewerking verzocht - 19, p. 11.
Medewerking, Verzoek om (Oort) - 14, p. 70.
Medewerking voor het doen van waarnemingen betreffende het voorkomen van Stereum purpureum en Fomes pomaceus, Verzoek om (Oort) - 10, p. 52-53.
Medewerking Xylariaceeën, Verzoek om - 2e aankondig.no. p. 11-12
Melkzwammen, Twee (G.A. de Vries) - 15, p. 5-6.
Merkwaardige groeiplaats, Een (Schweers) - 6, p. 72.
Merkwaardige vondst (Lütjeharms) - 1e aankondig.no., p. 15-16.
Merulius lacrimans op steenkool (Wilhadus) - 11, p. 11-12.

Meulemeester tot erelid der N.M.V. benoemd (de V.) - 9, p. 13-14.
Meulenhoff als voorzitter van de Nederlandsche Mycologische Vereeniging, Bij het afscheid nemen van Dr. J.S. (Meulemeester) - 5, p. 3-5.
Meulenhoff van 1919 tot 1933 voorzitter der Ned. Mycol. Ver. - 5. p 2
Meyendelnieuws (Boetje-van Ruyven) - 5, p. 87-88.
Milieu-verruiming (Schweers) - 4, p. 76-77.
Misvormingen bij paddenstoelen (Klein) - 20, p. 52-53.
Misvormingen bij plaatjeszwammen, Een paar merkwaardige (Reijnders) 11 p. 45-46.
Monstervormen van Collybia dryophila (Bouwman) - 6 p 44-46.
Monstruositeit, Een merkwaardige (Reijnders) - 6, p. 60-62.
Monstruositeiten bij paddenstoelen (Reijnders) - 4. p. 35-41 51-57.
Morielje, Loflied op den (Ver Sacrum) - 16, p. 41-42.
Morieljes (F.) - 1e aankondig.no, p. 7-9.
Morieljesporen met het bloote oog zichtbaar (Louwaars) - 1, p. 37-38
Morieljes van Java, De (Boedijn) - 11, p. 6-8.
Morieljes, Veenkoloniale (de Veye) - 9, p. 49-50.
Morphologie en physiologie der fungi. Fragmenten uit de physiologie Inleiding tot de (Huÿsman) - 15, p. 11-13, 17-19; 16, p. 2-4, 20-22.
Muurzwam (Plicaria muralis (Sow.) Rehm), De (W.J.L.) - 2, p. 6-9.
Mycena osmundicola Lange (Hueck) - 13, p. 49-50.
Mycena's gevraagd (Reijnders) - 5, p. 35.
Mycoflora van Nederland, in het bijzonder van de fungi van brandnetels, Een bijdrage tot de (Gremmen) - 18, p. 27-31.
Mycologie I, Enige critische opmerkingen over de moderne (Formijne) - 19 p. 54-57.
Mycologie en industrie (Westerdijk) - 15, p. 25-30.
Mycologie, Hoofdstedelijke (Bol) - 7, p. 59-61.
Mycologie in de tropen, De studie der (Boedijn) - 7, p. 67-70.
Mycologie in het hooggebergte (Formijne) - 8, p. 24-27
Mycologie in Scandinavië en Finland, Iets over de (Bels-Koning) - 19 p. 42-46
Mycologische aanteekeningen (Maas Geesteranus) 17, p 27, 2-4 - 17, p. 37-38.
Mycologische aantekeningen, Commentaar op (Daams) - 17 p. 46.
Mycologische dissertatie (Schweers) - 13, p. 55.
Mycologische film, Een nieuwe (Schweers) - 2e aankondig no p. 1-2
Mycologische herinneringen (Kam) - 13, p. 35.
Mycologische lessen (van Herwijnen) - 13, p. 56.
Mycologische lessen (van der Laan) - 13, p. 37.
Mycologische rariteit, Een (de V.) - 5, p. 43.

Mycologische rariteit uit de medische wereld, Een (de Veye) - 10, p. 11.
Mycologische vondsten in de Fransche alpen (Swanenburg de Veye) - 4, p. 3-6, 19-23.
Mycologische vondsten op champignonbedden (Broekhuizen) - 8, p. 46-49.
Mycologische vondsten van de Plasmolen en Gennep in het tijdvak 1937-1949, Bijzondere (Schweers) - 20, p. 46-49.
Mycologische waarnemingen in Indië (Lütjeharms) - 9, p. 3-5.
Mycologische waarnemingen uit de jaren 1942-47 (G.A.de Vries) - 18, p. 46-47.
Mycologisch grapje in de zestiende eeuw (van Dijk) - 14, p. 69.
Mycologisch werk uit het buitenland (Maas Geesteranus) - 15, p. 22-23; 17, p. 66-68.
Myco-onderwereld, Uit de (van Wijk) - 16, p. 22-23.
Mycophagie (Pelagicus) I-III - 14, p. 11-15, IV - 14, p. 34-35; V - 14, p. 49-51; VI - 14, p. 75-76; VII - 15, p. 13-14.
Myxomyceten-verzamelaars, Verzoek aan onze (Schoevers) - 3, p. 13.
Natuur ornamenteert, Als de (de Veye) - 6, p. 59.
Natuurbescherming - 1e aankondig.no. p. 12-13.
Naucoria carpophila Fr., een nieuwe zwam voor ons land (de Veye)-5, p. 57.
Naucoria fulgens J.Favre et R.Maire n.s. (subgenus Alnicola Kühner) (Schweers) - 10, p. 63.
Nederlandsche Mycologische Vereeniging bij haar vijf en twintig jarig bestaan, De (Meulenhoff) - 4, p. 64-70.
Nederlandse Mycologische Vereniging, 40-Jarig bestaan van de (Smit) - 18, p. 26.
Nieuw-Beerta, Paddenstoelen uit de omgeving van (Nannenga) - 6, p. 15.
Nieuw-Beertasche paddenstoelen, Nogmaals de (Nannenga) - naschrift (de V.) - 6, p. 31-32.
Notitieboekje 1939, Uit mijn (Wilhadus) - 11, p. 61-63.
Nullenschemering en vruchtbaarheid (Schweers) - 6, p. 52-53.
Nunspeet, Op naar - 3, p. 17-18.
Nunspeet, Terug van - 3, p. 37-39.
Nyctalis asterophora (Meulenhoff) - 6, p. 9-10.
Oesterzwam, Een abnormaal gevormde (de V.) - 7, p. 37.
Oliebolzwam (Rhizina inflata Schff.), De (Weverling) - 12, p. 46-47.
Ombrophilia clavus (Alb. én Schw.) Fr. (Schweers) - 9, p. 9-10.
Omphalia belliae Johnst. (Kleijn) - 13, p. 25-27.
Omphalia candida Bresadola (van Eyndhoven) - 11, p. 44-45.
Omphalia philonotis (Lasch) Quél., een nieuwe aanwinst voor onze flora (de Veye) - 11, p. 21-22.

Omphalia sphagnicola (Berk.)Karst. (Schweers) - 16, p. 9.
Omphalia typhae nov. spec. (Schweers) - 6, p. 79-80.
Omphalia Viridis Lange, Omphalia umbellifera (L.)Fr. var. viridis Fr. (Andreas) - 20, p. 72.
Ons terrein (Fabius en Reijnders) - 1e aankondig.no, p. 3-4.
Oort tot hoogleeraar benoemd, Dr. A.J.P. (de Veye) - 19, p. 66.
Oosterhout, de woonplaats van Volvaria loveiana e.a., Het bosch van (Schweers) - 13, p. 41-44.
Oproep (Schweers) - 15, p. 24.
Oudemans tot Donk, Van (Zijm) - 10, p. 15-18.
Paddestoel als veroorzaker van huiselijk leed (Meijer) - 9, p. 25-26.
Paddenstoel !, Een "versteende" (Spierenburg) - 5, p. 80-84.
Paddenstoelen (Clinge Doorenbos) - 5, p. 19.
Paddenstoelen en antibiotica (Schravesande) - 18, p. 53-54.
Paddenstoelen (en een blunder van een ouden rat!) Paas- (van der Lek) - 9, p. 56-59.
Paddestoelen, Enkele weinig bekende of over het hoofd geziene (Boetje-van Ruyven) - 6, p. 68-69.
Paddestoelen en knaagdieren ? (van Kregten) - 17, p. 9-10.
Paddenstoelen en P.K., Paarden, (Akke de Vries) - 8, p. 39-40.
Paddenstoelen en regenval (Reijnders) - 2, p. 9-13, 22-26.
Paddenstoeleneters, Wenken voor (de Lint) - 11, p. 64.
Paddenstoelenherbarium, Over het aanleggen van een gedroogde (de Veye) - 7, p. 58-59.
Paddenstoelen in Augustus, De (Boting) - 6, p. 12-14.
Paddenstoelen in Britsch Indië (Stork) - 5, p. 92.
Paddestoelen in de winter (van der Lek) - 20, p. 33-34.
Paddenstoelen in de winter op Terschelling (Liernur) - 20 p. 18.
Paddestoelen in een cactuskas (Smit) - 11, p. 24.
Paddenstoelen in Engeland (Louwaars) - 2, p. 43-44.
Paddenstoelen, Inleiding tot de kennis van (Joman) - 1, p. 3-5.
Paddenstoelen in ultra-violet licht (Wilhadus en Fabius) - 2, p. 26-28.
Paddenstoeleninventarisatie te Rotterdam - 14, p. 70.
Paddenstoelenjaar 1932, Het (de Veye) - 4, p. 60.
Paddenstoelenjaar ? Was 1928 een gunstig of een ongunstig - 1e aankondig. no, p. 12.
Paddestoelenjager, Moeilijkheden voor den (Jurriaanse) - 7, p. 46-48.
Paddestoelen, Korte aanteekeningen over (Huÿsman) I - 7, p. 72-74, II - 8, p. 11-15; III - 8, p. 50-55.
Paddenstoelenkweekerij (de Lint) - 3, p. 76-77.
Paddenstoelen naar plaats en tijd, Het voorkomen van (Hueck) - 17, p. 17-20.

Paddenstoelennieuws uit Groningen. Mycologische vondsten op een fabrieksterrein (Swanenburg de Veye) I - 2, p. 33-37;
II - 2, p. 50-53.
Paddestoelen ontstonden, (Tsjechisch verhaaltje), Hoe de (Meijer) 11 p.27.
Paddenstoelen, Oude studies over (Kleijn) - 1, p. 64-65.
Paddenstoelen, Oude studies over (M.) - 1, p. 71.
Paddestoelenschilder, Over Antony Keizer den (Schweers) - 8, p. 41-42
Paddenstoelenseizoen 1934, Het (Brakman) - 6, p. 71.
Paddenstoelenseizoen 1934, Het (Nannenga) - 6, p. 71-72.
Paddenstoelenseizoen 1934, Het (de Veye) - 6, p. 56.
Paddestoelenspel - 12, p. 17.
Paddestoelententoonstelling te Arnhem, Bezoekt vooral onze a.s (de Veye) - 9, p. 1.
Paddenstoelenvangst na een droge zomer, De (Akke de Vries) - 6, p 33-34.
Paddenstoelenvergiftiging - zie onder vergiftiging.
Paddenstoelen voor onze flora, Nog een paar nieuwe (de Veye) - 6, p 64-68.
Paddenstoelen-zoeken (Fabius) - 1, p. 18-19.
Paddenstoelen zoeken (de Veye) - 4, p. 71-76.
Paddenstoelen zoeken in November (Boting) - noot (de Veye) - 5, p. 66-69
Paddestoeltje, Een geheel gewoon (Middelhoek) - 12, p. 44-45.
Panaeolus separatus (Linn.)Fr. (Annellaria separata (Linn.)Karst.) (Meijer) - 13, p. 13-14.
Panus stipticus, Abnormale (de Lint) - 11, p. 65.
Parasieten (Klein) - 6, p. 30-31.
Parasieten van paddestoelen, Enkele merkwaardige (van Zinderen Bakker) - 12, p. 39-41.
Parasolzwam uit de duinen, Een mooie (Akke de Vries) - 10, p. 35-36.
Peniophora gigantea (Fr.) Massee aan jonge Douglassparretjes (van Luyk) - 8, p. 64-65.
Peperbus (Myxostoma coliformis), Jeugdlichaam van de (Boting) - 2, p. 44-45.
Peperbus zonder steeltjes, Een (van Eyndhoven) - 11, p. 63.
Peronospora violacea Berkeley (Nieuw voor ons land)(Prell) - 14, p. 72-73.
Phaenologie, Aanteekeningen ten dienste van de - 1, p. 24-25, 52-53.
Phaenologie. Verschijnen van morieljes. Bijdragen voor de (Boting) - 2, p. 79-80.
Phaenologie, Bijdragen voor de (Fabius) I - 2, p. 30-31; II - 2, p. 45-46.
Phaenologie. Ulvenhoutsche bosch, Bijdragen voor de (Fabius) - 3 p.74-75.
Phaenologie, Oproep voor de medewerking ten dienste van de (Lütjeharms) - 1, p. 59-61.
Phaenologie en Boletus rufus (Boting) - 2, p. 63-64.

Phaenologie voor de bestrijding van plantenziekten en schadelijke dieren, De beteekenis van de (Schoevers) - 2, p. 3-5.
Phaenologische waarnemingen (R.) - 2, p. 13-14.
Phallus hadriani Fries (Meulenhoff) - 7, p. 38-39, 53-55.
Pistillaria quisquilliaris Fr., Nieuwe vindplaats van (van Eyndhoven) 5 p. 55.
Plaatzwammen, Twee, vermoedelijk voor Nederland nieuwe (Reijnders) 11, p. 4-5.
Pleurotus (Rhodotus) palmatus (Bull ex Fr.) (Boting) - 5, p. 33.
Pleurotus petaloides (Bull.) Fr. (Kleijn) - 12, p. 62-64.
Pleurotus petaloides (Bull.) Fr. (van der Lek) - 12, p. 21-23.
Pleurotus porrigens (Pers.) Fr. (Huÿsman) - 7, p. 48.
Pleurotus-puzzle, Een nieuwe (Schweers) - 8, p. 63-64.
Pleurotus serotinus (Schrad.) (Schweers) - 9, p. 59-60.
Pluteus pellitus Pers. (de V.) - 5, p. 55.
Polyporus tuberaster Jacq. ex Fr. in Nederland gevonden, Het vruchtlichaam van (Zaneveld) - 13, p. 1-5.
Populaire schetsen (Daams) I - 16, p. 44-45; II - 17, p. 22-23; III - 17, p. 34-36; IV - 17, p. 44-46.
Poronia punctata (L.) (van Eyndhoven) - 9, p. 69-70.
Poronia punctata (L.) (Uffelie) - 9, p. 68- 69.
Propagandacommissie, Een actieve (de V.) - 9, p. 28.
Propagandanummer (Reijnders) - 4, p. 63.
Proppenschieters onder de zwammen (Middelhoek) - 10, p. 57-60 - naschrift - p. 60-61.
Prijswedstrijd - 17, p. 27.
Psathyrella's, Een tweetal aardige (de Veye) - 5, p. 57-59.
Puzzeltjes (van der Lek) - 7, p. 42-44; II - 8, p. 33-37.
Rariteiten onder de paddestoelen (Meijer) - 9, p. 75-76.
Recepten (Pelagicus) - 14, p. 76-77; 15, p. 14-15.
Reticularia lycoperdon Bull., Over (Schure) - 5, p. 14-15.
Retouches, Enkele (Huÿsman) - 19, p. 2-7.
Reuzenbovist, De (Bovista gigantea) (van Herwijnen) - 6 p. 29 30
Reuzenbovist, Eenige opmerkingen omtrent de nomenclatuur van de (van Eyndhoven) - 13, p. 50-52.
Reuzenknotszwam (Clavaria pistillaris(L.)Fr.) na 36 jaar opnieuw in ons land gevonden (de Veye)-7, p. 30-32
Reuzenzwam in Amsterdamsch turngebouw, De onbekende (de Veye) - 5 p.94-95.
Rhacodium cellare (Pers.), Bloedstelpende werking van (Ligtenberg) 10 p. 65 66.
Rhizophidium acuforme is zijn naam ! (Boedijn) - 17 p. 32

Rhizophidium pollinis ? (Middelhoek) - 17, p. 20-22.
Rietland, Door het (Schweers) - 18, p. 1-4.
Roestzwammen-flora van de Zuid-Veluwerand I (Gremmen) - 19, p. 36-42.
Roestzwammen van het riet en iets over Darluca (Gremmen) - 20, p. 49-52.
Roodsporigen uit het jaar 1943 (Schweers) - 18, p. 51-52.
Rotterdam, Enige vondsten rond (Hueck) - 16, p. 17-18.
Rozites caperata (Fries ex Persoon)Karsten (de Veye) - 7, p. 11-12.
Russula cyanoxantha ? (Bakker) - 9, p. 26.
Russula ... lijdensweg, Mijn genoeglijke (Imler) - 20, p. 22-32.
Russula nigricans Bull. Eigenaardige vergroeiing van (van Kregten) - 15, p. 3-4.
Russula's, Over enkele (Huÿsman) - 11, p. 35-40; 12, p. 53-57.
Ruys 75 jaar, Ons eerelid Joh. (Meulenhoff) - 2, p. 71.
Satansboleet ? (Bredius) - 3, p. 31.
Schimmels en asthma (de Fremery) - 2, p. 58-59.
Schimmels, Insecten en (Bels) - 11, p. 13-14.
Schizophyllum commune op walvis-beenderen (van der Lek) - 7, p. 76.
Schooljeugd en de paddenstoelen, De - 1, p. 7-9.
Schooljeugd en paddenstoelen (Fabius) - 1, p. 70.
Sclerotinia kirschsteiniana P.Hennings, nieuw voor ons land (Kleijn) - 15, p. 9-10.
Sclerotinia oxycocci Wor. (Nannenga) - 7, p. 75.
Secretariaatswisseling ! (de Veye) - 11, p. 14.
September ! - 6, p. 1.
Slakkenspijs (Klein) - 6, p. 14.
Slijmzwam binnenshuis, Een (van der Lek) - 6, p. 80-82.
Slijmzwam-waarneming, Een (F.) - 1, p. 26-27.
Société mycologique de France (van Eyndhoven) - 19, p. 60-61.
Société Mycologique de France, De session 1946 van de (Reijnders) - 17, p. 10-15.
Spa, De afgebroken excursie te (Huÿsman) - 10, p. 30-32.
Speurtochten 1948 (Klein) - 19, p. 10-11.
Spoorbedrijf en sporenbedrijf (Schweers) - 6, p. 41-44.
Sporenval (Schweers) - 7, p. 71-72.
Standplaats en groeiwijze der paddestoelen, Waarnemingen betreffende de (Reijnders) - 3, p. 78-80.
Sterkop-stinkzwam - 2, p. 64-65.
Sterkopstinkzwam, De - 3, p. 1-3.
Sterzwammetje (Nyctalis asterophora Fr.) en zijn verwant (Nyctalis parasitica Bull.), Het (Reijnders) - 9, p. 33-37.
Stinkzwammen en enkele andere kleinigheden, Geurende (van den Bergh) - 17, p. 39.

Stinkzwam te stinken?, Wanneer begint de (Fabius) - 3, p. 32-33; - verbetering - 3, p. 50.
Stinkzwamtweeling, Een Siameesche (Edie) - 11, p. 12.
Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. (Nannenga) - 8, p. 27-28.
Stropharia's, Zeldzame (van der Lek) - 14, p. 30
Struikelblokken (Klein) - 9, p. 40.
Suggesties (Nannenga) - 18, p. 72-73.
Swanenburg de Veye afgetreden als redacteur van Fungus (Schoevers) - 15, p. 1-2.
Swanenburg de Veye afgetreden als redacteur van Fungus (Zaneveld) - 15, p. 1.
Systematiek der Basidiomyceten, Inleiding tot de (Lütjeharms) I - 9, p. 5-9; II - 9, p. 19-23.
Systematiek der hogere zwammen van H.Romagnesi, Een interessant artikel over de (Reijnders) I - 19, p. 26-30; II - 19, p. 57-60; III - 20, p. 40-45.
Teekent uwe waarnemingen op ! (Fabius) - 3, p. 22-28.
Tekenen in inkt van paddestoelen, Het (Middelhoek) - 9, p. 42-44, 52-54, 70-72; 10, p. 9-11, 21-23.
Tentoonstellingen, Onze - 2, p. 17-20.
Tentoonstelling verslagen - zie rubriek Excursies, Tentoonstellingen, Voordrachten.
Terschelling, Paddenstoelen in de winter op (Liernur) - 20, p. 18.
Texel, 'n Tocht naar (Schweers) - naschrift - 7, p. 49-50.
Texel, Zwammen-excursie op (van) 't Woudt) - 6, p. 54-55.
Thelephora sowerbii B. et Br. en Polystictus cinnamomeus (Jacq. ex Pers.) Sacc. (Smits) - 12, p. 23, 26-27.
Thijsse 70 jaar, Dr Jac.P. (de Veye) - 7, p. 18.
Toezending, Verzoek om - 3, p. 34.
Tonderzwam als recordbreekster, Nog iets over de (Schweers) - 10, p. 65.
Tonderzwam (Fomes fomentarius(Linn.)Fr.) eens weldoenster der menschheid (Schweers) - 10, p. 32-35, 45-48.
Tralie-stinkzwam (Clathrus ruber), Een nieuwe vondst van de (van Dijk) - 13, p. 19-24.
Tremella mycetophila Peck (de Veye) - 5, p. 72-73.
Tricholoma, Een zeldzame en merkwaardige (Boetje-van Ruyven) - 8, p. 55.
Tricholoma inocybeoides Pearson (van der Laan) - 11, p. 20.
Tricholoma personatum (Bakker) - 7, p. 32.
Tricholoma personatum var. anserina (Boting) - 3, p. 64.
Tricholoma's, De zwart wordende (van der Laan) - 13, p. 27.
Tricholoma virgatum (Fries)Gillet (Akke de Vries) 9, p. 24-25.
Tricholoma virgatum bij Hilversum (Doets) - 9, p. 44-45.

Truffel en haar kultuur, De (Ligtenberg) - 14, p. 1-4.
Truffel-knotszwam en Hertentruffel (R.) - 1, p. 62-63.
Truffels en manniet(Schravesande) - 17, p. 38-39.
Twenthe, Paddestoelen-rijkdom in ons (Meijer) - 12, p. 14-16
Typhula en Cnazonaria (Middelhoek) - 18, p. 13-15.
Urgentieprogram, punt no 1 (Huÿsman) - 18, p. 16-17.
Utrecht, Op naar - 1, p. 69.
Varen(s)gezellen, Gezellige (Schweers) - 9, p. 48
Varia (Verslag excurise Buunderkamp Meyendel onderzoek Mycologische plaatwerken Leiderskamp van het redactiebureau) (de Veye) - 6, p. 73-74.
Variabiliteit bij plaatzwammen (referaal)(Uffelie) - 18, p. 11-12; Verbetering (Huÿsman) - 18, p. 24.
Veendam, De gewone morielje in (de Veye) - 6, p. 18.
Vergadering, Onze jaarlijksche algemeene (Schoevers) 6, p. 75-76
Vergadering!, Op ter (Schoevers) - 8, p. 57-58.
Vergiftiging, De Gooische paddestoelen (Nannenga) - 9, p. 13.
Vergiftiging door Amanita phalloides, De (Hueck) - 20, p. 58-65.
Vergiftiging door de Voorjaars-Helvella (Bakker) - 3, p. 21-22
Vergiftiging door paddenstoelen (Meulenhoff) I - 1, p. 2-3. II - 1, p. 30-33; III - 2, p. 54-56; IV - 2, p. 72-75; V - 3, p. 18-21; VI - 4, p. 8-13; VII - 4, p. 23-24; VIII - 4, p. 58-60.
Vergiftiging, Paddenstoelen- (Liernur) - 19, p. 64-65.
Vergiftigingsgeval door Coprinus atramentarius, Een (Kalff) - 14, p 48-49
Vergiftiging, Valsche waarborgen tegen (M.) 2e aankondig.no p. 7-8
Verkleurzwammetje, Het (Clerx) - 6, p. 35.
Verpa digitaliformis (Docters van Leeuwen) - 10, p. 49-50.
Verpa digitaliformis (van der Lek) - naschrift (de V.) - 10 p. 50
Verzamelen en verzenden van paddenstoelen, Twee dozijn tips voor het (Swanenburg de Veye) - 18, p. 55-58.
Vezelkop, Een nieuwe (Boting) - 2, p. 44.
Vindplaatsen, Zonderlinge (van der Lek) - 9, p. 9.
Voedingswaarden van paddestoelen, Over de (Smit) - 13, p 55-56
Volvaria loveiana e.a., Het bosch van Oosterhout, de woonplaats van (Schweers) - 13, p. 41-44.
Vondst, die een groote bleek te zijn, Een kleine (Smits) - 10, p. 4-8.
Vondst, Een aardige (de Lint) - 7, p. 76.
Vondsten, Aardige (Middelhoek) - 16, p. 43-44.
Vondsten, Aardige (G.A. de Vries) - 10, p. 39-40.
Vondsten, Enige (Middelhoek) - 14, p. 8-9.

Vondsten, Enige (Neyzen en van Rijn) - 13, p. 14-15.
Vondsten in de pers - zie aparte rubriek.
Vondsten in Drente, Enige aardige (Reijnders) - 12, p. 7-11, 57-62.
Vondsten in een stadstuin (van Waveren) - 3, p. 11-13.
Vondsten in het najaar 1933, Merkwaardige (van der Lek) - 5, p 28-31.
Vondsten in het verkoolde veen (Schweers) - 12, p. 5-7.
Vondsten in 1935 en 1936, Vroege (Smits) - 7, p. 77.
Vondsten in 1941 (tot half September) I, Bijzondere (Reijnders) - 13, p. 5-10.
Vondsten in 1941 (II), Nog enkele aardige (Reijnders) - 13 p. 31-33.
Vondsten in 1942 (III), Interessante (Reijnders) - 14, p. 53-57.
Vondsten in 1943 (IV), Interessante, - onderschrift (Reijnders) - 14, p. 63-66.
Vondsten op Voorne, Bijzondere (van Eyndhoven) - 19, p. 24.
Vondsten productief, Maakt Uw (Maas Geesteranus) - 15, p. 23-24.
Vondst in een kelder, Een interessante (de Veye) - 10, p. 63-64
Vondst van een zéér bijzondere paddestoel, Een zéér toevallige (de Veye) - 12, p. 12-13.
Voorjaar 1935 (Boting) - 6, p. 89-90.
Voorjaarspaddestoelen (Oort) - 9, p. 37-38.
Voorjaarsvondsten (Schweers) - 4, p. 13-14.
Voorjaarsvondsten (Smits) - 12, p. 75-76.
Voorne, Bijzondere vondsten op (van Eyndhoven) - 19, p. 24.
Vragenbus (de Veye) - 5, p. 15-17; 6, p. 17-18.
Vreemdeling, Van een (Klein) - 8, p. 16.
Vruchtvormen bij zwammen, Over enkele typen van (Lütjeharms) - 4 p. 6-8.
Waaiertje, Het (de Veye) - 6, p. 7-8.
Waarnemingen - zie aparte rubriek.
Waarom sommige zwammen twee namen dragen (Schoevers) - 1, p. 38-39.
Walcheren, Rijke dagen op (de Lint) - 8, p. 28-29.
Walcheren, Uit (Huÿsman) - 5, p. 31-33.
Wat is dat nu weer? (Middelhoek) - 17, p. 61-63; 18, p. 11.
Wat over 't hoofd wordt gezien (Bakker) - 4, p. 62.
Weidechampignon in westelijk Noord-Holland, Het voorkomen van de (van Herwijnen) - 11, p. 23-24.
Westerdijk 25 jaar directrice phytopathologisch laboratorium Willie Commelin Scholten, Ons medelid Prof. Dr Joh.a. - 2, p. 72.
Wetenschappelijke namen der fungi, De (van Eyndhoven) - 14, p. 39-46.
Wieringermeerpolder-paddenstoelen (Schweers) - 5, p. 72.
Winter, In den - 1, p. 41-42.
Winterswijkse flitsen (Middelhoek) - 11, p. 17-19.
Wonderen de wereld al uit ?, Zijn de (Huÿsman) - naschrift - 13, p. 54-55

Wortelschimmels (Klein) - 9, p. 74.
Xylariaceeën (Lütjeharms) - 2e aankondig. no., p. 11-12.
Zadelhelvella, Nog een vindplaats van de (Maas Geesteranus en Perdeck) - 15, p. 5.
Zaneveld geen conservator meer (Smit) - 14, p. 36.
Zeldzaamheden op bladscheeden en traptreden (Schweers) - 10, p. 51-52.
"Zoekt en gij zult vinden" (Schweers) - 11, p. 40-42.
Zuid-Limburg, Met de Nederl. Mycologische Vereeniging naar (van Eyndhoven) - 10, p. 27-30.
Zwambeschrijving, Rationeele (Schweers) - 7, p. 45-46.
Zwammen en strenge winters (Meijer) - 17, p. 42-44.
Zwammenluister (de V.) - 5, p. 5-6.
Zwammen op doode iepenboomen, Zeldzame (Stehouwer-Weyerse) - 9, p. 41
Zwammen, Vroege (van der Laan) - 17, p. 24-26.
Zwamstoel, Geen padden-, maar een (Oort) - 6, p. 54.
Zwarte vlekziekte op eschdoorn, De (van Eyndhoven) - 9, p. 72-73.

V. AUTEURS

Andreas, Che.H., De Hygrophorusweide, een associatie - 20, p. 66-68; Omphalia viridis Lange, Omphalia umbellifera (L.) Fr. var. viridis Fr. - 20, p. 72.

Andriesse, K., Fungilore (Judasoor, Middel tegen koorts) - 2, p. 81; Het kweken van paddestoelen - 3, p. 5-7; Phaenologische waarnemingen-4, p. 14.

Bakker, K., Vergiftiging door de Voorjaars-Helvella - 3, p. 21-22; Tricholoma personatum, Mycena arcangeliana Bres. - 4, p. 46; Wat over 't hoofd wordt gezien - 4, p. 62; Andermaal Coprinus comatus - 5, p. 94; Tricholoma personatum - 7, p. 32; Daedalea en Trametes - 8, p. 41; Russula cyanoxantha ? - 9, p. 26; Oranje bekerzwammen - 10, p. 38-39; Waarnemingen - 14, p. 30-31; Foutief determineeren - 14, p. 59-60; Waarnemingen - 14, p. 61; 78; Kleuren - 16, p. 8; Waarnemingen - 16, p. 9; 17, p. 26-27, 40, 46-47

Bels, P.J., Insecten en Schimmels (Medewerking gevraagd) - 11, p. 13-14; Medewerking gevraagd voor het verzamelen van gegevens omtrent de weidechampignon, Psalliota campestris - 16, p. 24-25.

Bels-Koning, H.C., Iets over de mycologie in Scandinavië en Finland - 19, p. 42-46.

Bergh, J.G. van den, Geurende stinkzwammen en enkele andere kleinigheden - 17, p. 39; "Les champignons prédateurs" (verslag van lezing en film) - 17, p. 57-61; Droogte en toch ... ofwel: ende desespereert niet ! - 18, p. 7-8; Ambrosia - 18, p. 31-33, 49-51; Mea culpa - 19, p. 23; Waarnemingen - 19, p. 23.

Boedijn, K.B., De studie der mycologie in de tropen - 7, p. 67-70; De morieljes van Java - 11, p. 6-8; Rhizophidium acuforme is zijn naam ! - 17, p. 32.

Boetje-van Ruyven, M.R.S., Boekbespreking: Verkade's Paddenstoelen-album - - 1, p. 42-44; Boekbespreking: Paddenstoelen-kalender - 1, p. 44-45; Oproep tot medewerking - 1, p. 52; Meyendelnieuws - 5, p. 87-88; Enkele weinig bekende of over het hoofd geziene paddestoelen - 6, p. 68-69; Boekbespreking: M. Kruseman en Martine Wittop Koning, Paddestoelen zoeken en eten - 7, p. 50-51; Navraag omtrent afbeeldingen van Nederlandse paddestoelen - 8, p. 43; Een zeldzame en merkwaardige Tricholoma - 8, p. 55; Inktzwammen met rode inkt - 10, p. 25; Negen gesluierde dames in één tuin - 11, p. 46-47; Waarnemingen - 14, p. 51; Na de brand - 19, p. 23-24.

Bol, J., Hoofdstedelijke mycologie - 7, p. 59-61.

Boting, H., Een nieuwe vezelkop - 2, p. 44; Jeugdlichaam van de Peperbus (Myxostoma coliformis) - 2, p. 44-45; Phaenologie en Boletus rufus - 2,

p 63-64; Bijdragen voor de phaenologie (verschijnen van morieljes) - 2, p 79-80 Tricholoma personatum var anserina 3 p 64 Zeedenappelmycena - 3, p. 83. Eenige vondsten in Kennemerland - 4, p. 24-25 Psalliota echinata (Roth) - 4, p. 29-30 Eenige vondsten in Kennemerland - 4, p. 61; Pleurotus (Rhodotus) palmatus (Bull ex Fr) - 5, p. 33, Excursie 'Elswout' -5, p. 37-39 Coprinus comatus - 5 p. 56-57 Paddenstoelen zoeken in November - ncot (de Veye) - 5 p 66-69; Vroege vondsten en waarnemingen voorjaar 1934 - 5, p 93 De paddenstoelen in Augustus - 6, p. 12-14 Lepiota pudica (Bull.) - 6, p. 53 Voorjaar 1935 - 6, p. 89-90.

Bouwman, B.E., Het fotografeeren van paddenstoelen - 1e aankondig.no, p 4-7 Een nieuwe boleet ? - 1, p. 53-54; De nieuwe boleet B. pseudosulphureus Kallenbach - 1 p 62. Monstervormen van Collybia dryophila - 6, p. 44-46.

Brakman, C., Fungilore. Een en ander omtrent het woord paddenstoel en verwanten - 1, p. 21-23. Het paddenstoelenseizoen 1934 - 6, p. 71.

Bredius, H., Satansboleet ? - onderschrift (Lütjeharms) - 3, p. 31.

Broekhuizen, S., Mycologische vondsten op champignonbedden - 8 p. 46-49.

Brouwer, Fop.I., Waarnemingen - 12, p. 79

Clerx, J.F., Een bezoek aan de Champignon-kweekerij van de Hero-fabrieken 3 p 3-5 Fluweelpootje groeiende tusschen het gras - 3, p. 64-65. Heksenkringen van Clitocybe vibecina - 3, p. 65 Het verkleurzwammetje - 6, p. 35.

Daams, J., Waarnemingen - 14, p 60 Eenige opmerkingen over het voorkomen van sommige minder algemeene Ascomyceten in de omgeving van Eindhoven - 15, p. 31-32 Populaire schetsen I - 16, p 44-45, II - 17, p 22-23 III - 17, p. 34-36; IV - 17, p. 44-46; Commentaar op "Mycologische aantekeningen" - 17, p. 46 Nieuws uit Brabant - 17, p. 63-65; Hoe staat het met de Isaria's in ons land - 18 p 44-46 Boekbespreking, T Rautavaraa, Suomen Sienisato Studies on the mushroom crop in Finland and its utilisation - 19 p. 46-48 Van de redacteur - 19, p 52 Boekbespreking Prof J A Nannfeldt Svampar in Svenska Växter onder redactie van Björn Ursing 19 p. 65 Boekbespreking T J Hintikka Sieni Kirja 19 p 66 De Martinet en de zwammen - 20, p 34-35; Verslag over Fungus 19e-20e jaargang - 20, p. 55-56.

Daams, J. en Westmijze, W.K., Paddenstoelenvondsten in de omgeving van Eindhoven in 1949 - 19, p. 61-64.

Doeters van Leeuwen, W.M., Verpa digitaliformis 10 p. 49-50, Ambrosia-gallen - 18, p. 47-49.

Doets, C., Tricholoma virgatum bij Hilversum 9 p. 44-45

Donk, M.A., Boekbespreking: E.J.Gilbert Les Bolets - 3, p.62-63; Boekbespreking: K.B.Boedijn en A.Steinmann, Les espèces des genres Helicobasidium et Septobasidium des Indes Neerlandaises - 3 p.82. Boekbespreking M.Josserand et P.Konrad, Note sur deux Collybia du groupe clusilis - 3, p. 82. Boekbespreking: Dr.W.Neuhoff, Kritische Gallertpilze II - 3, p. 82-83.

Doorenbos, Clinge, Paddenstoelen - 5, p. 19.

Dijk, W.van, Een nieuwe vondst van de tralie-stinkzwam, Clathrus ruber - 13, p. 19-24; Het judasoor in onze oude kruidboeken - 14, p. 27-30; Een mycologisch grapje in de zestiende eeuw - 14, p 69; Waarnemingen - 17, p. 46.

Edie, J.E., Boletus parasiticus op Scleroderma vulgare - 3, p. 39-40; Een Siameesche stinkzwamtweeling - 11, p. 12.

Eyndhoven, G.L.van, Excursie naar "Elswout" - 4, p. 47; Voorjaar 1933 - 5, p. 18; Boletus rhodoxanthus (Krombh.)Kbch. - 5, p. 33-34; Nieuwe vindplaats van Pistillaria quisquilliaris Fr. - 5, p. 55; Het bewaren van gedroogde aardsterren - 5, p. 56; Gyromitra (Helvella) gigas Krombh. - 5, p. 91-92; Vroege vondsten en waarnemingen voorjaar 1934 - 5.p.93; Geaster triplex Jungh. - 6, p. 12; Een merkwaardige afwijking bij Geaster striatus D.C. - 6, p. 69; Bestaat er verband tusschen aardsterren en boomen ? - 6, p. 85-86; De gekraagde aardster met dubbel peristoom - 7, p. 7-8; Boletus auriporus Peck 1872. Een nieuwe boleet voor ons land - 7, p. 27-30; Geaster nanus P. met triplex-kraag - 7, p. 57; Een merkwaardige afwijking bij Geaster rufescens P. (fimbriatus Fr.) - 7, p. 57-58; Poronia punctata (L) - 9, p. 69-70; De zwarte vlekziekte op eschdoorn - 9, p. 72-73; Met de Nederl. Mycologische Vereeniging naar Zuid-Limburg - 10, p. 27-30 Disciseda cervina (Berk.) Cunningham, een nieuwe aanwinst voor ons land - 10, p. 55-57; Boletus auriporus Peck 1872 - 11, p. 22-23; Een merkwaardige groep van de gekraagde aardster (Geastrum triplex Jungh.) - 11, p. 26; Omphalia candida Bresadola - 11, p. 44-45; Een peperbus zonder steeltjes - 11, p. 63; Een nieuwe aardster voor Nederland, Geastrum schaefferi Vitt. - 12, p. 11-12; Het eten van paddestoelen door eekhoorns - 12. p. 64-65. Waarnemingen - 12 p. 65 De aardster-flora van Amsterdam - 12 p. 78 79. Eenige opmerkingen omtrent de nomenclatuur van de reuzenbovist - 13, p. 50-52. Determineertabel voor de geslachten der witsporige plaatjeszwammen - 14. p. 15-17 De wetenschappelijke namen der fungi - 14. p. 39-46. Waarnemingen - 14, p. 61; Gallen op paddenstoelen - 14, p. 67-69; Waarnemingen - 15 p. 6 Determineertabellen voor de geslachten der gekleurdsporige plaatjeszwammen 15 p 19 22 Gallen op paddenstoelen (4e mededeeling) - 15 p. 30 31; Waarneming. 15, p. 32. In memoriam Dr.Jac P Thijsse 25 Juli 1865 - 8 Januari 1945 - 16, p. 1-2; Waarnemingen - 16,

p. 9, Boletus aurantiacus Roques ex Bulliard - 16, p. 16-17; De substraten van Marasmius (Crinipellis) stipitarius (Fr.) - 16, p. 34-35; Verslag van den penningmeester over de periode 1 Juli 1942 - 31 December 1945 - 16, p. 37-38 De hygrometrische aardster Astraeus hygrometricus in het westen des lands - 17, p. 30-32, Verslag van de penningmeester over het jaar 1946 - 17, p 48 Mededelingen van de Ned. Myc. Vereniging - 19, p. 11; Bijzondere vondsten op Voorne - 19, p. 24; Société Mycologique de France - 19, p. 60-61.

Eyndhoven, G.L. van en Kleijn, H., Verslag van de commissie tot nazien van de rekening en verantwoording van den penningmeester over de vereenigingsjaren 1939/1940, 1940/1941 en 1941/1942, tevens verslag van den wnd. penningmeester over 1941/1942 - 14, p. 23-24.

Fabius, G.C.A., Morieljes - 1e aankondig.no, p. 7-9, Kampernoeljes of Champignons - 2e aankondig.no, p. 5-7; Fungilore - 1, p. 10; Paddenstoelen-zoeken - 1, p. 18-19. Een purperroode boleet - 1, p. 25-26; Een slijmzwam-waarneming - 1, p. 26-27. De schooljeugd en de paddenstoelen - 1, p. 70; Bijdragen voor de phaenologie I - 2, p. 30-31; Lichtend hout - 2, p. 37-39, Boekbespreking: Kallenbach M. und F., Wandtafelserie, Tafel 1, Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) - 2, p. 40-42; Bijdragen voor de phaenologie II - 2, p. 45-46; Fungilore (Volksgeloof en Vogelnestzwammetjes) - 2, p. 80-81; Teekent Uwe waarnemingen op ! - 3, p. 22-28; Boekbespreking: Acta phaenologica - 3, p. 28-30; Wanneer begint de stinkzwam te stinken ? - 3, p. 32-33; Lichtend hout - 3, p 40-42; Heeft de maan invloed op den groei van paddenstoelen ? 3, p. 54-58; Bijdragen voor de phaenologie. Ulvenhoutsche bosch - 3, p. 74-75.

Fabius, G.C.A. en Reijnders, A.F.M., Ons terrein - 1e aankondig.no, p.3-4.

Formijne, P., Mykologie in het hooggebergte - 8, p. 24-27; Enige critische opmerkingen over de moderne mycologie I - 19, p. 54-57.

Fransen, J.J., Door welke oorzaak ontstaan de coremia van Ceratostomella ulmi in de poppenwiegen van de iepenspintkevers ? - 7, p. 39-41.

Fremery, H.N. de, Schimmels en asthma - 2, p. 58-59.

Gremmen, J., Coccomyces coronatus (Schum.)De Not. - 17, p. 4-5; Een bijdrage tot de kennis der Nederlandse Ascomyceten - 17, p. 32-34; Arachnopeziza aurelia (Fr ex Pers.)Fuck., een nieuwe Discomyceet voor ons land ? - 18, p. 4-6; Een bijdrage tot de mycoflora van Nederland, in het bijzonder van de fungi van brandnetels - 18, p. 27-31; Dothidella ulmi (Duv.) Winter en zijn levenswijze - 19, p. 8-10; De imperfecte vorm van Desmazierella acicola Lib - 19, p. 32-35; De roestzwammenflora van de Zuid-Veluwerand (I) - 19, p. 36-42; Het genus Belonioscypha sensu Rehm en de identiteit van B. ciliatospora (Fuck.)

Rehm en Helotium scutula (Pers. ex Fr.) Karst. - 20, p. 17-17; De roestzwammen van het riet en iets over Darluca - 20, p. 49-52.

Herwijnen, A. van, De reuzenbovist (Bovista gigantea) - 6, p. 29-30. Het voorkomen van de weidechampignon in westelijk Noord-Holland - 11, p. 23-24; Mycologische lessen - 13, p. 56.

Hueck, H.J., Mycena osmundicola Lange - 13, p. 49-50. Enige vondsten rond Rotterdam - 16, p. 17-18; Uit de buitenlandsche litteratuur: Gosta Lindeberg: Uber die Physiologie Lignin-abbauender Boden-hymenomyzeten: Oskar Modesz: Zur Kenntnis der Mykorrhiza-bildner von Kiefer und Fichte - 16, p. 35; Heksenkringen en antibiotica - 17, p. 1-4; Het voorkomen van paddestoelen naar plaats en tijd - 17, p. 17-20; Rectificatie op Heksenkringen en antibiotica - 17, p. 44; Uit de buitenlandse litteratuur: Karl Höfler, Pilzsoziologie; Karl Friedrich, Untersuchungen zur Ökologie der höheren Pilze - 17, p. 53-54; De vergiftiging door Amanita phalloides - 20, p. 58-65.

Huijsman, H.S.C., Bekeerd - 1, p. 5-7; Boekbespreking: R.Heim, Le genre Inocybe - 4, p. 16: Uit Walcheren - 5, p. 31-33; Nieuwe Inocybesoorten uit ons land (voorloopige mededeeling) - 7, p. 5-7: Pleurotus porrigens (Pers.)Fr. - 7, p. 48; Korte aanteekeningen over paddestoelen I - 7, p. 72-74; II - 8, p. 11-15; III - 8, p. 50-55; Met de Fransche mycologen op stap - 9, p. 23-24; Aan het bestuur en aan alle leden onzer vereeniging - 9, p. 47-48: Over Lepiota's en nog wat - 9, p. 50-52; Over het geslacht Lepiota en nog wat - 9, p. 65-68; De afgebroken excursie te Spa - 10, p. 30. Over enkele Russula's - 11, p. 35-40; II - 12, p. 53-57; Lepiota brebissonii Godey - 12, p. 67-73; Herinneringen aan enkele vacantiedagen te Denekamp doorgebracht - 13, p. 46-48, Zijn de wonderen de wereld al uit ? - naschrift - 13, p. 54-55: Inleiding tot de morphologie en physiologie der fungi - 15, p. 11-13, 17-19; 16, p. 2-4, 20-22; Urgentieprogram, punt no 1 - 18, p. 16-17; Over Boleten - 18, p. 17-23 37: Variabiliteit bij plaatzwammen (verbetering) - 18 p. 24; Paul Konrad † - 19, p. 1; Enkele retouches - 19, p 2-7: Boekbespreking Agaricaceae par P. Konrad et A.Maublanc - 20, p 18-19. Boekbespreking Les associations fongiques des Hauts Marais Jurassiens et de quelques régions voisines par Jules Favre - 20, p. 19-20.

Imler, L., Mijn genoeglijke Russula ... lijdensweg 20, p. 22-32.

Joman, A., Inleiding tot de kennis van paddenstoelen - 1, p. 3-5: Een nieuwe vindplaats van Lepiota odorata Cool - 5, p 34; De Nederlandsche boleten (Proeve tot determineering der soorten, vrij bewerkt naar Kallenbach s 'Pilzbestimmungstabelle, Die Röhrlinge") 6 p. 46-48, 62-63, 82-84.

Jurriaanse, T., Moeilijkheden voor den paddenstoelenjager - 7, p. 46-48.
Kalff, J., Een vergiftigingsgeval door Coprinus atramentarius 14.p.48-49.
Kam, N.G., Mycologische herinnering - 13. p. 35, Waarnemingen.Champignons in verdedigingswerken - 16, p. 24.
Kits van Waveren, E., Vondsten in een stadstuin - 3, p. 11-13
Klein, R., Giftigheid Claviceps purpurea sclerotiën - 4 p.47; De kapjesmorielje - 5, p.90-91; Slakkenspijs - 6, p.14; Parasieten - 6, p. 30-31. Een kopschimmel + nachrift (de Veye) - 6, p.69-70 Grijze klokjes - 7, p.12-13; De kegelmycena - 7, p.50; Van een vreemdeling - 8, p.16; Kopergroenzwam en brandnetel - 8, p. 40; Isaria farinosa - 9, p. 10; Struikelblokken - 9, p. 40. Kerstgaven - 9, p. 46; Wortelschimmels - 9, p. 74; Craterellus sinuosus e.a. - 10, p. 36; Eerstelingen - 10, p.66; De gesluierde dame - 11, p. 8-9; Glinsteringen - 11, p. 25; Kleinigheden - 11, p.64-65; Waarnemingen - 12, p. 47-48; Speurtochten 1948 - 19, p. 10-11; Misvormingen bij paddenstoelen - 20, p. 52-53.
Kleijn, H., Oude studies over paddenstoelen - 1, p. 64-65; Amsterdam als paddenstoelen dorado - 8, p. 38-39; Bekerzwammetjes in den winter - 8, p 55-56. Fungi in Amsterdam - 11 p. 24; Pleurotus petaloides (Bull.) Fr. - 12, p. 62-64 Omphalia belliae Johnst. - 13, p.25-27. Sclerotinia kirschsteiniana P.Hennings, nieuw voor ons land - 15. p. 9-10.
Kleijn, H. en Agsteribbe, E., Een zeldzame Helvella weergevonden (Helvella ephippium Lév.) - 14, p. 73-74.
Kregten, T.O.van, Waarnemingen - 14, p. 32-33; Eigenaardige vergroeiing van Russula nigricans Bull. - 15, p. 3-4; Waarnemingen - 15, p. 6,15; Daldinia concentrica (Bolt. ex Fr.) Ces. et De Not. - 16, p. 4-6; Paddestoelen en knaagdieren? - 17, p. 9-10; Waarnemingen - 17, p.10.
Kruyt, W., Oproep tot medewerking - 11, p. 66.
Laan, H.J.van der, Tricholoma inocybeoides Pearson - 11, p. 20; De zwart wordende Tricholoma's - 13, p. 27; Mycologische lessen - 13, p. 37; Waarnemingen - 14, p. 31-32, 52, 60-61; Coprinus dilectus Fr. - 14, p. 75; Een tropische Lepiota ? - 15, p. 4-5; Vroege zwammen - 17,p.24-26.
Lek, H.A.A.van der, Lichtende Mycena's - 4, p. 42-44; Merkwaardige vondsten in het najaar 1933 - 5, p. 28-31, Enorme ontwikkeling van Fuligo septica - 5, p. 91 Boekbespreking: Friesia. Nordisk Mycologisk Tidskrift 6 p 15 17. Boekbespreking: Takewo Hemmi Studies on some wood-destroying Fungi attacking Conifers in Japan - 6, p.35-36; Boekbespreking: Friesia Nordisk Mykologisk Tidskrift Bd. 1 Heft 3, 1934 - 6, p. 36-37; Een slijmzwam binnenshuis - 6, p. 80-82; De geschiedenis van een heksenkring - 7, p 10-11, Boekbespreking Atlas des Champignons de l Europe. rédigé par Prof. Dr Ch. Kavina et Dr A.Pilát, Fasc.1-5, 1934 - 7, p.15-17; Puzzletjes - 7, p.42-44;

Schizophyllum commune op walvisbeenderen - 7, p. 76; Eigenaardige vindplaatsen van de grote parasolzwam, Lepiota procera - 8, p 15-16; Boekbespreking: Roelfsema, E.J.D., De champignoncultuur - 8, p. 31-32; Puzzletjes II - 8, p. 33-37; Zonderlinge vindplaatsen - 9, p. 9; Paas-Paddestoelen (en een blunder van een ouden rat!) - 9, p. 56-59; Albino's onder de paddestoelen - 10, p. 12; Boekbespreking: W.W.Ray, Some mushrooms, edible and poisonous - 10, p, 12-13; Albinisme bij paddestoelen - 10, p. 24-25; Verpa digitaliformis - naschrift (de Veye) - 10, p. 50; Ongewone ontwikkeling van Hebeloma sacchariolens - 10, p. 61-63; Pleurotus petaloides (Bull.)Fr. - naschrift - 12, p. 21-23; De krulzoom zoekt het hoger op - 13 p. 35-37; Zeldzame Stropharia's - 14, p. 30; In memoriam T.A.C.Schoevers - 16 p 11-12; Verslag bibliotheek - 16, p. 38-39; Verslag van de bibliothecaris - 17. p 49-50, Paddestoelen in de winter - 20, p. 33-34, Lepiota brebissonii Godey - 20, p. 45-46.

Liernur, A.G.M., Paddenstoelenvergiftiging - 19, p. 64-65; Paddenstoelen in de winter op Terschelling - 20, p. 18.

Ligtenberg, P.C., Bloedstelpende werking van Rhacodium cellare (Pers.) - 10, p 65-66; De truffel en haar kultuur - 14, p. 1-4; Waarneming - 15, p. 23.

Lint, S.de, Paddenstoelenkweekerij - 3. p. 76-77; Vroege vondsten en waarnemingen voorjaar 1934 - 5, p. 92-93 Indische Cordyceps-soorten - 7, p. 30; Een aardige vondst - 7, p 76; Rijke dagen op Walcheren - 8 p. 28-29; Wenken voor paddenstoelen-eters - 11, p 64, Abnormale Panus stipticus - 11, p. 65; Waarnemingen - 12, p. 49; 13, p. 56; 14, p. 33-34; 16, p. 48; Een woord van dank - 18, p. 76.

Lint, S.de, Graaf, Dr H.de, Weverling, J.A., Kort verslag van de excursies van het district V Zuid-Holland, gehouden op 3 en 17 October 1943 - 14, p. 77-78; Verslag van de in 1948 door district V (Zuid-Holland) gehouden excursie - 18, p. 75-76,

Louwaars, W., Morieljesporen met het bloote oog zichtbaar - 1. p. 37-38; Paddenstoelen in Engeland - 2, p. 43-44.

Lütjeharms, W.J., Een merkwaardige vondst - 1e aankondig.no, p. 15-16; Xylariaceeën - 2e aankondig.no p. 11-12; Oproep voor de medewerking ten dienste van de phaenologie - 1, p. 59-61, De muurzwam, Plicaria muralis (Sow.)Rehm - 2. p 6-9; Groene schimmels - 2, p 30, Onderschrift - 3, p. 31-32, Over enkele typen van vruchtvormen bij zwammen - 4. p. 6-8; Lysurus australiensis weer gevonden! - 4. p. 16, Verslag van de vijftiende paddenstoelententoonstelling - 5 p. 44-51, Mycologische waarnemingen in Indië - 9. p. 3-5; Inleiding tot de systematiek der Basidiomyceten I - 9, p. 5-9; II - 9, p. 19-23,

Luyk, A. van, Peniophora gigantea (Fr.)Massee aan jonge Douglas-sparretjes - 8, p. 64-65.

Maas Geesteranus, R.A., Mycologisch werk uit het buitenland - 15, p. 22-23. Maakt Uw vondsten productief 15, p. 23-24. Over de berkenboleet en zijn verwanten - 16, p. 13-16, 27-30. Mycologische aanteekeningen 17, p. 27-24. 17, p. 37-38. Mycologisch werk uit het buitenland II - 17, p. 66-68. Een paar fungi van de Kaloot - 20, p. 69-71.

Maas Geesteranus, R.A. en Perdeck, A.C., Nog een vindplaats van de zadelhelvella 15, p. 5. Voorlopig verslag van het Lycoperdon onderzoek - 19, p. 18-22.

Maas-van der Meulen, E., Waarnemingen - 14, p. 17-18.

Meulemeester, P.J.A.J., Het determineeren van de hoogere fungi - 2e aankondig no p. 2-5. Bij het afscheid nemen van Dr J.S. Meulenhoff als voorzitter van de Nederlandsche Mycologische Vereeniging - 5, p. 3-5. In memoriam Dr J.S. Meulenhoff eerelid van de Ned. Mycologische Vereeniging 7, p. 65-66. In memoriam C. Brakman †, 10, p. 43. Frater Wilhadus †, 18, p. 39.

Meulen, H. van der, Waarnemingen - 14, p. 31.

Meulenhoff, J.S., Valsche waarborgen tegen vergiftiging 2e aankondig no p. 7-8. Vergiftiging door paddenstoelen I - 1, p. 2-3. Groene schimmels - 1, p. 9. Boekbespreking Dr E. Martin-Sans, 1 Empoisonnement par les Champignons et particulièrement les intoxications dues aux Agaricacées du groupe des Clitocybe et du groupe des Cortinarius - 1, p. 14. Boekbespreking Ullstein Sonderheft nr 12 Pilze und Pilzgerichte - 1, p. 23-24. Groene schimmels - 1, p. 28. Vergiftiging door paddenstoelen II 1, p. 30-33. Boekbespreking Jacob E. Lange, Studies in the Agarics of Denmark Part VII Franz Kallenbach, Die Pilze Mitteleuropas Bd 1 Die Röhrlinge 8 Lief., P. Konrad et A. Maublanc, Icones selectae Fungorum, fasc. IV 1, p. 45-46. Groene schimmels - 1, p. 46. Oude studies over paddenstoelen 1, p. 71. Giftige paddenstoelen - 1, p. 73-74. Boekbespreking: Pilzmerkblatt, Ausgabe 28 - 2, p. 40. Vergiftiging door paddenstoelen III 2, p. 54-56. Ons erelid Joh. Ruys 75 jaar 2, p. 71. Vergiftiging door paddenstoelen IV - 2, p. 72-75. Conserveeren van paddenstoelen - 2, p. 81-82. Vergiftiging door paddenstoelen V - 3, p. 18-21. In memoriam Dr L. Vuyck 3, p. 53-54. In memoriam G.C.A. Fabius 3, p. 70-72. Ceratostomella ulmi de geslachtelijke vorm van Graphium ulmi Schwarz - 3, p. 77-78. Vergiftiging door paddenstoelen VI 4, p. 8-11. VII - 4, p. 23-24. Boekbespreking Vuillemin Les champignons parasites et les mycoses de l'homme - 4, p. 28-29. Vergiftiging door paddenstoelen VIII 4, p. 58-60. De Nederlandsche Mycologische Vereeniging bij haar vijf en twintigjarig bestaan 4, p. 64-70.

Leptonia parasitica Quélet (= Claudopus subdepluens Fitzpatrick) - 5 p. 84-86; Boekbespreking: Konrad, P. et Maublanc, A., Icones selectae Fungorum, fasc. VIII Lange Jacob E., Studies in the Agarics of Denmark no IX. Lange Jacob E., Flora Agaricina Danica Kavina, Prof. Dr C. et Pilát Dr A Atlas des champignons de l Europe: Dujarric de la Rivière R Le poison des Amanites mortelles 5 p. 88 90 Nyctalis asterophora - 6 p 9-10 Phallus hadriani Fries - 7 p 38 39 53 55

Meulenhoff, J.S en Vuyck, L., Ons tweede periodiek 1e aankondig.no p 2

Meijer, M.G.J., Een paddestoel als veroorzaker van huiselijk leed - 9 p 25 26 Rariteiten onder de paddestoelen - 9, p. 75-76. Hoe de paddestoelen ontstonden (Cechisch verhaaltje in en uit het Esperanto vertaald) - 11 p 27 Paddestoelenrijkdom in ons Twenthe - 12 p. 14 16 Panaeolus separatus (Linn.) Fr (Annellaria separata (Linn.)Karst) 13, p. 13-14; Lepiota's in bloemenkassen; een nieuwe soort? - 14, p. 4 8 Zwammen en strenge winters - 17 p. 42-44 Glinsteringen van een fungi-arm jaar - 18, p. 52-53.

Middelhoek, A., Het tekenen in inkt van paddestoelen - 9 p. 42-44 52 54 70-72 10 p 9-11 21 23 Proppenschieters onder de zwammen naschrift - 10, p 57-61 Winterswijkse flitsen (Verslag excursie Ned Myc Ver op 14 en 15 October 1939) 11 p 17 19 Een amoebe met een staartje - 11 p 59 61 Om een diagnose 12, p. 27-30 Een geheel gewoon paddestoeltje - 12 p 44-45 Dichomyces princeps Thaxter - 12 p 76 77 Waarnemingen - 13 p 38 Een nieuwe Laboulbeniacae voor ons land - 13 p 52 53 Enige vondsten 14 p 8 9 Kort verslag van de excursie te Lunteren op 26-27 October j l 14 p 25 27. Waarnemingen - 14 p 51 Enige nieuwe Laboulbeniales voor ons land - 14 p. 57-59 71-72 Boletus rufescens (Secr.)Konrad - 15 p 10-11. Twee keverschimmels op een gastheer 16 p 6-8 Hydnotria tulasnei - 16 p. 19 Aardige vondsten - 16 p. 43-44; Rhizophidium pollinis ? - 17, p. 20 22; Wat is dat nu weer ? - 17, p. 61-63; 18, p. 11; Typhula en Cnazonaria - 18, p. 13-15.

Müller, J R , Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1936 1937 - 9, p 2 Financieel overzicht vereenigingsjaar 1937 - 38 - 10 p 26 Financieel overzicht vereenigingsjaar 1938 - 39 11 p 28 Financieel overzicht vereenigingsjaar 1939-1940 12, p. 52

Nannenga, E T , Paddenstoelen uit de omgeving van Nieuw Beerta 6 p. 15 Nogmaals de Nieuw Beertasche paddenstoelen naschrift (de V) 6. p. 31 32 Het paddenstoelenseizoen 1934 6 p 71 72 Sclerotinia oxycocci Wor - 7 p 75 Strobilomyces strobilaceus (Scop) Berck 8 p 27 28 De Gooische paddenstoelenvergiftiging 9 p 13 Suggesties 18 p 72-73.

Neijtzell de Wilde, E., Waarnemingen Boleten en konijnen - 16 p. 24. Waarnemingen - 17, p. 46.

Neyzen, Nora en Rijn, K. van, Enige vondsten - 13, p. 14-15.
Oets, J., Een nieuwe Ganoderma voor ons land ? - 16, p. 32.
Oort, A.J P., Nog eens de Zeeden-Mycena - 4, p 15 Ter inleiding - 5, p.1; Kort verslag van de jaarvergadering te Utrecht op 8 Juli 1933 - 5. p. 11-12; Jaarverslag van den secretaris over 1932-33 - 5, p. 12-13; Vroege vondsten en waarnemingen voorjaar 1934 - 5 p. 93. Jaarverslag van den secretaris over het jaar 1933-'34 - 6, p. 3-5. Kort verslag van de algemeene ledenvergadering. gehouden op Zaterdag 14 Juli 1934 te Utrecht - 6, p. 5-7; Onze excursie naar Baarn op 14 Oct. j.l. - 6, p. 24-25 Cantharellus olidus - Geurende cantharel - 6 p 25-27 Geen padden- maar een zwamstoel - 6, p. 54; Jaarverslag van den secretaris 7 p 2-3 Verslag van de algemeene Ledenvergadering op Zaterdag 3 Juli te Utrecht gehouden - 7 p. 3-4 Tentoonstelling in het Koloniaal Instituut - 7, p. 13; Verslag van de excursie naar Ruurlo op 9 en 10 September j l. - 7, p 13-14. Verslag van den secretaris over het jaar 1935-1936 8. p. 7-9 Verslag van de algemeene ledenvergadering - 8. p 9. Boekbespreking. Paddenstoelenboek. deel 1. door Cath.Cool en Dr H A A van der Lek derde druk bewerkt door Dr H.A.A. van der Lek 8 p 42 43. Boekbespreking: Het raadsel der iepenziekte door Dr S Broekhuizen. Libellenserie no 134 - 8, p 43. Verslag van de zestiende paddestoelententoonstelling. gehouden op 16. 17 en 18 October 1937 te Arnhem - 9, p. 15-17; Interessante vondsten in de Ardennen - 9, p. 26-27; Voorjaarspaddestoelen - 9, p. 37-38; Jaarverslag van den secretaris over het jaar 1937-'38 10 p 1-2 Kort verslag van de jaarvergadering 10, p. 3-4; Verzoek om medewerking voor het doen van waarnemingen betreffende het voorkomen van Stereum purpureum en Fomes pomaceus - 10. p. 52-53; Jaarverslag van den secretaris 1938-'39 - 11, p. 2; Verslag van de jaarvergadering - 11 p. 2-4; Verzoek om medewerking - 14, p 70; De Jubilee Meeting van de British Mycological Society London 20 25 October 1946 - 17, p 51-52 Dennenmoorder en zwavelkopje als concurrenten - 20, p. 2-4.
Oststroom, S.J. van, Waarnemingen - 12. p 49: Geastrum nanum Pers. met twee peristomen - 14, p. 49.
Pelagicus, Mycophagie I-III - 14, p. 11-15; IV - 14. p 34-35 V - 14 p. 49-51; VI - 14. p. 75-76 Recepten - 14, p 76-77 Mycophagie VII 15 p. 13-14; Recepten - 15, p. 14-15.
Prell, Hans H., Peronospora violacea Berkeley (Nieuw voor ons land.) - 14 p. 72-73.
Reijnders, A.F M , Boekbespreking: Dr A.Schierbeek. De wonderwereld van het mikroskoop - 2e aankondig.no, p. 8; Truffelknotszwam en Hertentruffel - 1, p. 62-63; Bespreking van mycologische verhandelingen: Dr J G.

Betrem, De Iepenziekte en de iepenspintkevers; A.J.P.Oort, The sexuality of Coprinus fimetarius - 1, p. 63-64; Paddenstoelen en regenval - 2, 9-13, 22-26; Phaenologische waarnemingen - 2, p. 13-14; Boekbespreking: artikelen Dr Rant in Tropische Natuur - 3, p. 7-8; Boekbesprekingen: Transactions British Mycological Society, vol. 15 parts 1 en 2 - 3, p. 8-10; Onderschrift - 3, p. 40. G.C.A.Fabius als Fungus-redacteur 3 p. 73-74, Waarnemingen betreffende de standplaats en groeiwijze der paddenstoelen - 3, p. 78-80; Boekbespreking: Kallenbach, Merulius lacrymans - 4, p. 28; Lepiota Friesii (Lasch) = Lep. acutesquamosa Weinm. 4, p. 30-31; Lentinus suavissimus - 4 p 31; Monstruositeiten bij paddenstoelen I - 4, p. 35-41; II - 4, p. 51-57; Propaganda nummer - 4, p. 63; Mycena's gevraagd - 5, p. 35, Boekbespreking: G D.Swanenburg de Veye, Paddenstoelen in woord en beeld - 5, p. 37; Een merkwaardige monstruositeit - 6, p. 60-62, Het vruchtlichaam van Fistulina hepatica, de biefstukzwam - 8, p. 58-63. Het sterzwammetje (Nyctalis asterophora Fr.) en zijn verwant (Nyc talis parasitica Bull) - 9, p. 33-37, Fungus 10 jaar ! - 10, p. 44-45. Twee, vermoedelijk voor Nederland nieuwe, plaatzwammen - 11, p. 4-5; Dictyophora duplicata (de gesluierde dame) waarschijnlijk reeds in 1917 in ons land gevonden en andere belangrijke Phalloideeën-vondsten hier te lande - 11, p. 29-35; Een paar merkwaardige misvormingen bij plaatzwammen - 11, p. 45-46; De sluier van Dictyophora - 11, p 49-53. Enige aardige vondsten in Drente - 12, p. 7-11; 57-62; Bijzondere vondsten in 1941 (tot half September) I - 13, p. 5-10; Nog enkele aardige vondsten in 1941 (II) - 13, p. 31-33, Twee Inocybe's 13, p. 44-46; Interessante vondsten in 1942 (III) - 14 p. 53-57; Interessante vondsten in 1943 (IV) - 14, p. 63-66; Fungus 15 jaar ! - 15, p 15-16 De session 1946 van de Société Mycologique de France - 17, p. 10-15 Verslag van de jubileumtentoonstelling der Ned. Mycol. Ver., ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan, gehouden op 16, 17 en 18 October in Artis te Amsterdam 18, p. 63-72; Een interessant artikel over de systematiek der hogere zwammen van H.Romagnesi - 19, p 26-30 Verslag over Fungus 18e jaargang 1948 en 19e jaargang 1949, eerste gedeelte - 19, p 51; Een interessant artikel over de systematiek der hogere zwammen van H Romagnesi II - 19 p. 57-60; In memoriam E.J A.Boellaard - 19 p. 66 Een interessant artikel over de systematiek der hogere zwammen van H.Romagnesi III - 20, p. 40-45.

Schoevers, T.A.C., Waarom sommige zwammen twee namen dragen - 1 p. 38 39. De beteekenis der phaenologie voor de bestrijding van plantenziekten en schadelijke dieren - 2, p 3 5; Verzoek aan onze myxomyceten-verzamelaars - 3 p 13 Onze 15de paddenstoelententoonstelling te Haarlem op 7, 8 en 9 October - 5, p 6-10; Onze jubileumtentoonstelling Terugblik - 5, p. 20-26; Onze jaarlijksche algemeene vergadering - 6, p 75

76, Op ter vergadering ! - 8, p 57-58 De invloed van de biefstukzwam op het hout van eiken - 10, p 19-21 Mijn grootste champignon - 11, p. 9-11 G D Swanenburg de Veye afgetreden als redacteur van Fungus - 15, p. 1-2.

Schravesande, J A., Herfstkleuren - 16, p 47-48 Truffels en manniet 17 p. 38-39 Blauwzuur in paddenstoelen - 18 p 6. Paddenstoelen en antibiotica - 18, p. 53-54;

Schure, P J S., Over Reticularia lycoperdon Bull. - 5, p. 14-15.

Schweers, A C S., Een nieuwe mycologische film - 2e aankondig no p 1-2. Komt naar Delden ! - 1, p. 17-18; Glinsteringen des jaars - 2, p. 64; 3, p. 75-76; Voorjaarsvondsten - 4, p. 13-14; Milieu-verruiming - 4, p 76-77 Geopyxis ammophila (Dur et Lév)Sacc (= Peziza sabulicola Dunal) 5, p 64-65 Wieringermeerpolder paddenstoelen 5, p. 72. Spoorbedrijf en Sporenbedrijf 6 p. 41-44. Nullenschemering en vruchtbaarheid 6, p. 52-53 Nogmaals de groene berkenboleet - 6, p. 70-71 Een merkwaardige groeiplaats - 6 p 72 Omphalia typhae nov spec (Sect. Mycenarae Fr) 6 p 79-80 Met de Fransche mycologen op stap 6 p 86-88 Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1933-1934 - 7, p. 4-5 Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1934-1935 - 7 p. 5, Rationeele zwambeschrijving - 7, p. 45-46; 'n Tocht naar Texel (= naschrift) - 7, p. 49-50; Glinsteringen des jaars 1935 - 7, p. 55-56; Sporenval - 7, p. 71-72; Nieuwe voedsterzwam voor Badhamia utricularis (Berk.) - 7 p. 77 Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1935-1936 - 8, p. 9-10, Glinsteringen des jaars , 8 p 37-38 Over Antony Keizer den paddenstoelenschilder - 8 p. 41-42; Een nieuwe Pleurotus puzzle - 8 p. 63-64 Een paar nieuwe Asco s 8 p. 66-67; Ombrophila clavus (Alb en Schw)Fr 9 p 9-10, Glinsteringen des jaars 1937 - 9 p 39-40 Gezellige varen(s)gezellen - 9, p. 48 Pleurotus serotinus (Schrad) 9 p 59-60 De tonderzwam (Fomes fomentarius (Linn.)Fr) eens weldoenster der menschheid 10, p 32-35, 45-48 Glinsteringen des jaars 1938 10 p 37 Zeldzaamheden op bladscheeden en traptreden - naschrift 10, p. 51-52 Naucoria fulgens J Favre et R Maire n.s. (subgenus Alnicola Kühner) - 10, p 63; Nog iets over de tonderzwam als recordbreekster 10, p. 65; "Zoekt en gij zult vinden" - 11, p. 40-42; Glinsteringen des jaars 1939 - 11 p 43; Vondsten in het verkoolde veen - 12, p. 5-7 Kleine gele en roode Disco's der Nederlandsche flora - 12, p. 24-25 42, Waarnemingen - 12, p. 30-31; Lichtgevende larven in boomzwammen 12, p 32; Kleine bruine of zwarte Disco's der Nederlandsche flora 12, p. 42-43; Kleine bleeke Disco's der Nederlandsche flora - 12, p. 43; Waarnemingen - 12, p. 48-49, Desmazierella acicola Lib -

12, p. 73-75; Waarnemingen - 12, p. 79; Helvella queletii Bres. - 13, p. 24-25; Josef Hanel (gestorven den 12en November 1940 te Hannersdorf in de Oost-Sudeten) - 13, p. 28; Waarnemingen - 13, p. 28-30; Glinsteringen der jaren 1940 en 1941 - 13, p. 34. Waarnemingen - 13, p. 37-38; Het bosch van Oosterhout, de woonplaats van Volvaria loveiana e.a. - 13, p. 41-44; Mycologische dissertatie - 13, p. 55; Over een mycophagische eigenschap van Claudopus byssisedus (Fr. ex Pers.) Gillet - 14, p. 10-11; Waarnemingen - 14, p. 52; Glinsteringen des jaars 1942 - 14, p. 66; Inocybe fulvida Bres. - 15, p. 2-3; Glinsteringen des jaars 1943 - 15, p. 11; Oproep - 15, p. 24; Omphalia sphagnicola (Berk.) Karst. - 16, p. 9; Glinsteringen des jaars 1944 16 p. 31 Glinsteringen des jaars 1945 - 17, p 6 Een nieuwe exotische Discomyceet, parasiterende op het Steenlevermos - 17 p 36 37; Door het rietland - 18, p. 1-4; Glinsteringen der jaren 1946 en 1947 - 18, p 34; Waarnemingen - 18, p. 35; Artikelbespreking T Petch Cordyceps militaris and Isaria farinosa - 18, p. 44. Roodsporigen uit het jaar 1943 - 18, p. 51-52. Entoloma sphagneti R.Naveau n.s 1923 - 19, p. 10; De Hygrophorusweide, een associatie - 19, p. 17-18. Bijzondere mycologische vondsten van de Plasmolen en Gennep in het tijdvak 1937-1949 - 20, p 46-49; Gloeoglossum affine Durand een nieuwe aardtong voor Europa - 20, p. 68-69.

Siteur, G., Excursies van de Nederl. Mycologische Vereniging op 12 en 13 October in de omgeving van Eindhoven - 17, p. 7-9.

Smit, J.P.S., De zuidelijke wandelweg bij Amsterdam - 8, p. 67 Padde stoelen in een cactuskas - 11, p. 24. Jaarverslag 1939 '40 12, p 1 Verslag van de ledenvergadering op 21 Sept 1940 in het hotel Zeelandia te Apeldoorn - 12 p 1-2 Waarnemingen - 12 p 31 Verslag van de algemene ledenvergadering op 27 Sept 1941 te 20 uur in hotel Zeiler te Baarn - 13, p 17 18. Verslag van een leden excursie op Zondag 19 Oct 1941 tussen Hilversum en Baarn - 13, p. 18-19; Verslag van de excursies op 25 en 26 Oct 1941 in de omgeving van Kievitsdel 13 p 19 Over de voedingswaarden van paddestoelen - 13 p 55-56. Jaarverslag 1941-1942 - 14 p. 21-22; Verslag van de algemene ledenvergadering op Zaterdag 26 Sept. 1942 20 uur. in hotel De Veluwe te Lunteren - 14 p 22-23; Plan voor districtsgewijze excursies op kleinere schaal - 14, p. 36; Dr Zaneveld geen conservator meer 14 p 36 Jaarverslag 1 Juli 1942 - 1 Januari 1946 - 16 p. 36-37. Programma der excursies Ned Myc. Ver. te Eindhoven op 12 en 13 October 1946 16, p. 40-41. Algemene ledenvergadering 1946 16 p 48 50 Waarnemingen 17, p. 10. Hulp gevraagd - 17 p 28 Algemene ledenvergadering 17 p 29. Jaarverslag 1946 - 17 p 47 Weekendexcursie in de omgeving van

Oisterwijk op 25 en 26 October 1947. Concept-programma - 17. p. 54: Verslag van de ledenvergadering op Zaterdag 13 December 1947 te Utrecht - 18. p. 9-10: Nederlandse Mycologische Vereniging algemene ledenvergadering (agenda) - 18. p. 25: 40-Jarig bestaan van de Nederlandse Mycologische Vereniging - 18 p. 26: Verslag van de algemene ledenvergadering op Zaterdag 24 Juli 1948 om 11 uur in het Pharm Lab. te Utrecht - 18. p. 40: Jaarverslag 1947 - 18. p 40-41: Algemene ledenvergadering (Agenda) - 19. p. 13: Jaarverslag 1948 - 19 p. 49-50; Verslag van de algemene ledenvergadering op Zaterdag 16 Juli in het Pharm. Lab. te Utrecht - 19. p. 50; Jaarverslag 1949 - 20. p. 54

Smith, W., Waarnemingen - 12. p. 49.

Smits Jr., W.F., Na de Gorsselsche excursie (4-5 Oct. 1935) - 7. p. 77; Vroege vondsten in 1935 en 1936 - 7 p 77: Verslag van de algemeene ledenexcursie op Zaterdag 24 en Zondag 25 October 1936 in de omgeving van Wageningen 8. p. 17-19 Een kleine vondst die een groote bleek te zijn - 10 p. 4-8: Algemeene ledenexcursie der N M V te Gorssel op 12 en 13 October 1940 - 12 p. 19 21: Thelephora sowerbii B et Br en Polystictus cinnamomeus (Jacq ex Pers.)Sacc - 12. p 23. 26-27. Voorjaarsvondsten - 12. p. 75-76.

Spierenburg, D., Een "versteende"paddenstoel - 5. p. 80-84.

Stehouwer Weyerse, Chr., Zeldzame zwammen op doode iepenboomen - 9 p 41.

Stork, F., Paddenstoelen in Britsch Indië - 5. p. 92.

Swanenburg de Veye, G.D., Paddenstoelennieuws uit Groningen I Mycologische vondsten op een fabrieksterrein - 2. p 33-37. II 2. p 50-53, Mycologische vondsten in de Fransche Alpen - 4 p. 3-6. De ruwsporige Psilocybe foenisecii (Pers) - 4. p. 15-16. Mycologische vondsten in de Fransche Alpen II - 4 p. 19-23; Verslag van de excursie der Ned. Mycol Vereeniging te Ruurlo op 1 2 en 3 October 1932 - 4. p. 25-27 Psalliota echinata (Roth) - 4. p 30 Leptonia sarcita (Fr.) - 4. p 30 Was het paddenstoelen najaar '32 overal in ons land en in alle opzichten gunstig ? - 4. p. 45; Het paddenstoelenjaar 1932 - 4 p.60 Paddenstoelen zoeken - 4. p. 71-76; Zwammenluister - 5. p. 5-6; Belangrijk bericht - 5. p. 13-14; Vragenbus - 5. p. 15-17; Een en ander over de gepeperde melkzwam - 5. p. 17 Dankbetuiging - 5. p. 26-27 Ons tweede eerelid - 5. p. 27 Belangrijk bericht - 5. p. 27-28. Een mycologische rariteit - 5. p. 43. Pluteus pellitus Pers. - 5. p. 55; Naucoria carpophila Fr., een nieuwe zwam voor ons land - 5. p. 57. Een tweetal aardige Psathyrella's - 5. p. 57 59. Eikhaas en Reuzenzwam - 5. p. 70-71; Tremella mycetophila Peck. - 5. p. 72-73; Het dennenschelpje 5 p. 73-74; Komt allen 14 Juli a.s. op de algemeene vergadering in Utrecht - 5. p. 79-80. De "onbekende" Reuzenzwam in het Amsterdamsche turngebouw - 5. p. 94-95; Het waaiertje - 6. p. 7-8;

Het drama van de aardappelbovist - 6, p. 10-11; Vragenbus - 6, p. 17-18; De gewone morielje in Veendam - 6, p. 18; Diversen - 6, p. 19; De grote bruine bekerzwam - 6, p. 21; Verslag van de algemene ledenexcursies op Zaterdag 6 en Zondag 7 Oct. '34 in de omgeving van Nijmegen en Kleef - 6, p. 22-24; De levertraanzwam, Naucoria cucumis (Pers.) Fr. 6, p. 27-29; Enkele voor ons land nieuwe Cortinarius-soorten - 6, p. 48-52; Het paddenstoelenseizoen 1934 - 6, p. 56; Allerhande - 6, p. 57-58; Als de natuur ornamenteert - 6, p. 59; Nog een paar nieuwe paddenstoelen voor onze flora - 6, p. 64-68; De kinderkamer van de familie Coprinus geb. atramentarius - 6, p. 72-73; Varia - 6, p. 73-74; In memoriam A. Joman - 6, p. 75; Aardtong en truffelknotszwam - 6, p. 84-85; Koeien-boleet en rose spijkerzwam - 6, p. 88-89; Diversen 6, p. 90; In memoriam B.E. Bouwman - 7, p. 1; De algemeene ledenexcursie te Gorssel op 5 en 6 October a.s. - 7, p. 1-2; Wat ge te Gorssel als mycologische delicatesse opgediend krijgt! - 7, p. 8-10; Rozites caperata (Fries ex Persoon) Karsten - 7, p. 11-12; Diversen - 7, p. 18 Dr Jac.P. Thijsse 70 jaar - 7, p. 18; In memoriam H. Boting - 7, p. 21 De algemeene ledenexcursie der N.M.V. te Gorssel op 5, 6 en 7 October j.l. - 7, p. 21-25; De reuzenknotszwam (Clavaria pistillaris (L.) Fr.) na 36 jaar opnieuw in ons land gevonden - 7, p. 30-32; Boekbespreking Cool, Cath. en Lek, Dr H.A.A. van der, Paddenstoelenboek, deel II, 3e druk, Hana, K., Onze paddenstoelen, Libellenserie no 84; Lange, Jacob E., Flora Agaricina Danica, vol. 1 - 7, p. 32-33; Een abnormaal gevormde oesterzwam - 7, p. 37; Over het aanleggen van een gedroogde paddenstoelen-herbarium - 7, p. 58-59; Boekbespreking: De "Revue de Mycologie", een nieuw Frans tijdschrift - 7, p. 61-64; Boekbespreking. De "Revue de Mycologie" (vervolg) - 7, p. 78-79; Kort verslag van de op 26 en 27 Sept. j.l. te Heeze gehouden algemeene ledenexcursie der N.M.V. - 8, p. 19-20; De blaasvormige bekerzwam - 8, p. 45, Bezoekt vooral onze a.s. paddestoelen-tentoonstelling te Arnhem - 9, p. 1. Een nieuwe, rijk voorziene vindplaats van de Hoorn-van-overvloed - 9, p. 11-12; Meulemeester tot erelid der N.M.V. benoemd - 9, p. 13-14 Een vijftal lezingen over paddestoelen voor de Volksuniversiteit te A'dam - 9, p. 14. Nogmaals het Hendricus Botingfonds 9, p. 14. Met de Mycologische op excursie in de omstreken van Enschede - 9, p. 17 19. Een actieve propaganda-commissie - 9, p. 28. Telegrafisch verslag van de propaganda-excursie - 9, p. 28-29 Intermezzo - 9, p. 29 Dr W J. Lütjeharms tot hoogleeraar benoemd - 9, p. 29-30 Veenkoloniale morieljes - 9, p. 49-50. Het brandnetelklokje 9, p. 54-56. Een mycologische rariteit uit de medische wereld - 10, p. 11. Inktzwammen zonder inkt - 10, p. 12; Een kleine aanvulling - 10, p. 25-26; Enkele brandplek-ervaringen - 10, p. 39. Nog een verzoek om medewerking - 10, p. 53 Een interessante vondst in een kelder - 10, p. 63-64; Secreta-

riaatswisseling ! - 11, p. 14; Omphalia philonotis (Lasch)Quél., een nieuwe aanwinst voor onze flora - 11, p. 21-22; Van een eikhaas, die een beukhaas bleek te zijn - 11, p. 27; Attentie voor het Boting-fonds! - 11, p. 48; Clitocybe olearia (De Candolle)R. Maire (syn. Pleurotus olearius(D.C.) Fr.), een nieuwe aanwinst voor onze fungiflora - 11, p. 53-58; Met de N.M.V. op excursie in de omstreken van Apeldoorn 21-22 Sept. 1940 - 12, p. 2-5; Een zéér toevallige vondst van een zéér bijzondere paddestoel - 12, p. 12-13; De Hoorn van overvloed bij Gieten - 12, p. 17; Waarnemingen - 12, p. 31. Huidverschijnselen veroorzaakt door eetbare paddestoelen - 13, p 28; Een laatste woord van den redacteur - 14, p. 78 Dr van der Lek erelid van onze vereniging - 17, p 41-42; Leden, helpt allen mee, onze jubileums-paddenstoelen-tentoonstelling te doen slagen - 18, p. 42-44; Twee dozijn tips voor het verzamelen en verzenden van paddenstoelen - 18, p. 55-58. Dr A.J.P. Oort tot hoogleeraar benoemd - 19, p. 66; In memoriam P.J.A.J.Meulemeester - 20, p. 38-39.

Uffelie, O.F., Een conserveermiddel voor paddestoelen - 9, p 45; Poronia punctata (L.) - 9, p 68-69. Variabiliteit bij plaatzwammen (referaat) 18 p 11-12, Verslag van een lezing voor de flora-commissie op Zaterdag 10 April 1948 in het Pharmaceutisch Laboratorium te Utrecht door Dr A.F.M.Reijnders over "Coprinus" - 18, p. 35-37 Jaarverslag bibliothecaris 1948-1949 - 19, p. 50-51 Jaarverslag Commissie voor de Mededelingen - 19, p. 51.

Valckenier Suringar, J., Over eetbaarheid van zwammen - 4, p 11-12.

Ver Sacrum, Loflied op den morielje - 16, p. 41-42.

Verschueren, C.Ph., Enkele merkwaardige vondsten uit de Betuwe - 6, p.8 9

Vloten, H.van, Waarnemingen over Fomes annosus Fr. 7 p 25-27. Onderzoekingen over Armillaria mellea (Vahl)Quél. - 8 p. 20-23

Vries, A de, Nomenclatuur - 3, p 83; Amsterdam en de mycologie - 5, p. 51-54. De paddenstoelen inventaris van Amsterdam - 5, p 69-70 Twee merkwaardige droogtevormen van Collybia maculata - 6, p 33, De paddenstoelenvangst na een droge zomer - 6, p. 33-34; Kleurvariaties bij Boletus scaber en rufus - 6 p. 55, Verslag der propaganda-excursie op Zondag 4 Oct '36 op het terrein van Meer en Bosch - 8, p. 29 30 Verslag van de propaganda-excursie op 1 Nov. 1936 te Lage Vuursche 8 p 30 31. Paarden paddenstoelen en P.K. - 8, p. 39-40, Tricholoma virgatum (Fries)Gillet - 9 p 24-25; Een mooie parasolzwam uit de duinen - 10, p. 35-36; Onze propaganda-excursies 1938 - 10, p. 40-41.

Vries, G A de, Aardige vondsten - 10, p. 39-40; Hymenogaster tener (Berk.), een nieuw geslacht en een nieuwe soort voor Nederland - 11, p. 20 21. Amanitopsis strangulata Fr. en nog iets - 13, p. 10-12; Lentinus ad-

haerens Fries (1836) ex Albertini et Schweinitz, een nieuwe aanwinst voor onze fungi-flora - 14, p. 46-47, Kort verslag der excursies van district III - 14, p. 77; Twee melkzwammen - 15, p. 5-6; Mycologische waarnemingen uit de jaren 1942-1947 - 18, p. 46-47; Verslag van de excursies gehouden door district III - 19, p. 67.

Walrecht, B.J.J.R., Paddenstoelenvondsten in de omgeving van Chaam (N B) - 6, p. 34-35.

Welsmann, L., Über Giftpilze und Pilzvergiftungen - 6, p 77-78.

Westerdijk, Joha, Mycologie en industrie - 15, p. 25-30.

Westmijze, W.K., Het congres van de Franse mycologen - 18, p. 73-75. Flammula henningsii Bres. - 19, p. 30-32;

Weverling, J.A., De oliebolzwam (Rhizina inflata Sch ff.) - 12. p. 46-47; Waarnemingen - 12, p. 66, 79-80; 13, p. 56-57; 17. p. 65; Verslag van de in 1947 door district V (Zuid-Holland) gehouden excursies - 18, p. 8-9.

Wiersma, J.H., Waarnemingen - 18, p. 34-35.

Wildervanck, L.S., Cordyceps capitata en C. ophioglossoides - 16, p 46 Waarnemingen - 17, p. 65; 18, p. 34; Enkele zeldzame afwijkingen bij paddestoelen - 19, p. 13-17; Coprinus atramentarius en alkohol - 20 p. 4-6.

Wilhadus, Frater, Generaal Fabius 3, p 72 73 'Education mycologique' - 5 p 34-35 Merulius lacrimans op steenkool - 11 p. 11 12; Uit mijn notitieboekje 1939 - 11, p. 61-63.

Wilhadus, Frater en Fabius, G.C.A., Paddenstoelen in ultra-violet licht 2, p. 26-28

Woudt, B.D.van 't, Zwammen-excursie op Texel - 6, p. 54-55.

Wouw, A.P.van de, De kleine stinkzwam - 3, p. 32.

Wijk, L.J.van, Uit de myco-onderwereld 16 p. 22-23. Waarnemingen 17. p. 65.

Zaneveld, J S., Laboulbenia flagellata Peyritsch, een merkwaardige en voor Nederland nieuwe fungus - 9, p. 61-65; Komt Dictyophora duplicata (Bosc) Ed. Fischer in Nederland voor ? - 10. p. 48-49. Het vruchtlichaam van Polyporus tuberaster Jacq. ex Fr. in Nederland gevonden - 13. p 1 5; G D Swanenburg de Veye afgetreden als redacteur van Fungus 15 p 1 Uit het nieuwe redactiebureau - 15. p 3 Boekbespreking; Jean Anker en Svend Dahl Leven en Wetenschap. 3000 jaren biologie 16 p 10 Verslag van den redacteur van Fungus 16 p 39 Verslag Fungus; 17. p. 50 51; Laatste bericht uit het redactiebureau 18 p. 38, Verslag "Fungus" - 18. p. 41-42.

Zinderen Bakker, E.M.van, Enkele merkwaardige parasieten van paddestoelen - 12, p. 39-41.

Zijm, A.C., Van Oudemans tot Donk - 10, p. 15-18

VI. BESTUURSMEDEDELINGEN

Bibliothecaris 1948-1949, Jaarverslag (Uffelie) - 19, p. 50-51.
Bibliothecaris, Verslag van de (Van der Lek) - 17, p. 49-50.
Bibliotheek, Catalogus van de - 16, p. 25
Bibliotheek, Mededeling over de - 19, p. 11.
Bibliotheek, Verslag (Van der Lek) - 16, p. 38-39.
Commissie tot nazien van de rekening en verantwoording van den penningmeester over de vereenigingsjaren 1939/40, 1940/41 en 1941/42, tevens verslag van den wnd. Penningmeester over 1941/42. Verslag van de (Van Eyndhoven, Kleijn) - 14, p. 23-24.
Commissie voor de Mededelingen, Jaarverslag (Uffelie) - 19, p. 51.
Contributies, Voorstel van het bestuur inzake wijziging der - 17, p. 55-56.
Financieel overzicht vereenigingsjaar 1937-'38 (Müller) - 10, p. 26.
Financieel overzicht vereenigingsjaar 1938-'39 (Müller) - 11, p. 28.
Financieel overzicht vereenigingsjaar 1939-'40 (Müller) - 12, p. 52
Floracommissie - 19, p. 12.
Fungus 18e Jrg. 1948 en 19e Jrg. 1949 eerste gedeelte, Verslag over (Reijnders) - 19, p. 51.
Fungus 19e - 20e jaargang, Verslag over (Daams) - 20, p. 55-56
"Fungus", Verslag (Zaneveld) - 17, p. 50-51; 18, p. 41-42.
Fungus, Verslag van den redacteur van (Zaneveld) - 16, p. 39.
Jaarvergadering, Kort verslag van de (Oort) - 10, p. 3-4.
Jaarvergadering te Utrecht op 8 Juli 1933, Kort verslag van de - 5, p. 11-12
Jaarvergadering, Verslag van de (Oort) - 11, p. 2-4.
Jaarverslag 1939-'40 (Smit) - 12, p. 1
Jaarverslag 1940-'41 (Smit) - 13, p. 1.
Jaarverslag 1941-1942 (Smit) - 14, p. 21-22.
Jaarverslag 1 Juli 1942 - 1 Januari 1946 (Smit) - 16, p. 36-37.
Jaarverslag 1946 (Smit) - 17, p. 47.
Jaarverslag 1947 (Smit) - 18, p. 40-41.
Jaarverslag 1948 (Smit) - 19, p. 49-50.
Jaarverslag 1949 (Smit) - 20, p. 54.
Jaarverslag van den secretaris over 1932-33 (Oort) - 5, p. 12-13.
Jaarverslag van den secretaris over 1933-'34 (Oort) 6, p. 3-5
Jaarverslag van den secretaris (1934-35) (Oort) - 7, p. 2-3.
Jaarverslag van den secretaris over 1935-1936 (Oort) - 8, p. 7-9.
Jaarverslag van den secretaris over het jaar 1936-1937 - 9, p. 1-2.

Jaarverslag van den secretaris over het jaar 1937-'38 (Oort) - 10 p 1-2
Jaarverslag van den secretaris 1938-39 (Oort) - 11, p. 2.
Ledenvergadering, Agenda - 5, p. 86-87; 6, p. 76-77.
Ledenvergadering, Agenda algemeene - 8, p. 58.
Ledenvergadering, Agenda algemeene (Smit) - 17, p. 29' 18 p. 25 19 p 13; 20 p. 35
Ledenvergadering in Juli, De algemeene - 2, p. 1-3.
Ledenvergadering op 9 Juli te Utrecht, Kort verslag over de algemeene - 4 p. 17-18.
Ledenvergadering op 14 Juli 1934 te Utrecht, Kort verslag van de algemeene - 6, p. 5-7
Ledenvergadering op 3 Juli (1935) te Utrecht, Verslag van de algemeene (Oort) - 7, p. 3-4
Ledenvergadering op 21 Sept. 1940 te Apeldoorn, Verslag van de (Smit) 12, p. 1-2.
Ledenvergadering op 27 Sept. 1941 te Baarn, Verslag van de algemeene (Smit) - 13, p. 17-18.
Ledenvergadering op 26 Sept. 1942 te Lunteren, Verslag van de algemene (Smit) - 14, p. 22-23.
Ledenvergadering 1946, Algemene (Smit) - 16, p. 48-50.
Ledenvergadering op 13 December 1947 te Utrecht, Verslag van de (Smit) 18, p. 9-10.
Ledenvergadering op 24 Juli 1948 te Utrecht, Verslag van de algemene (Smit) - 18, p. 40.
Ledenvergadering op 16 Juli te Utrecht, Verslag van de algemene (Smit) 19, p. 50.
Ledenvergadering, Verslag van de algemeene (Oort) - 8, p. 9.
Mededelingen van het Bestuur - 1e aankondig no. p. 14-15, 2e aankondig no 12-14; 1, p. 14-16, 28, 40, 58, 68, 75-76; 2, p. 14-15, 31, 46-47, 67-68, 82-84; 3, p. 13-15, 34-36, 50-51, 67-68; 4, p. 18, 34, 78; 5, p. 18, 74-75; 7, p. 36; 8, p. 1-2, 10, 32, 44, 56; 9, p. 31-32; 11, p. 15; 12, p. 51; 13, p. 15-16, 38-39, 57-58, 14, p. 18-19, 37-38, 62, 63, 70; 15, p. 24, 32; 16, p. 25-26, 40, 50, 51; 17, p. 16, 57; 18, p. 10, 41; 19, p. 11, 52, 67; 20, p. 53-54, 72.
Ons tweede periodiek (Meulenhoff en Vuyck) - 1e aankondig no p. 2
Programma der excursies Ned. Myc. Ver. te Eindhoven op 12 en 13 October 1946 (Smit) - 16, p. 40-41.
Programma excursie Ned. Mycol. Ver., 14-16 Oct. 1939 te Winterswijk - 11, p. 1
Programma (concept) weekend excursie omgeving Oisterwijk op 25 26 Oct 1947 (Smit) - 17, p. 54.
Rede van de voorzitter ter gelegenheid van de opening der tentoonstelling - 18, p. 59-62.

Vergadering, Algemeene - 11, p. 65-66.
Verslag secretaris van de redactie der Mededelingen - 16 p 39
Verslag van den penningmeester over de periode 1 Juli 1942 - 31 December 1945 (Van Eyndhoven) - 16, p. 37-38.
Verslag van de penningmeester over het boekjaar 1949 20 p 55
Verslag van de penningmeester over het jaar 1946 (Van Eyndhoven) 17. p. 48.
Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1933-34 (Schweers) - 7, p. 4-5.
Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1934-35 (Schweers) - 7, p. 5.
Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1935/36 (Schweers) - 8, p. 9-10.
Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1936-1937 (Müller) - 9, p. 2.

VII. BOEKBESPREKINGEN

Acta Phaenologica (Fabius) - 3, p. 28-30.
Anker, Jean & Dahl, Svend, Leven en wetenschap. 3000 jaren biologie (Zaneveld) - 16, p. 10.
Betrem, Dr J.G., De Iepenziekte en de iepenspintkevers (R.) - 1, p. 63-64.
Boedijn, K.B., en Steinmann, A., Les espèces des genres Helicobasidium et Septobasidium des Indes Néerlandaises (Donk) - 3, p. 82.
Broekhuizen, Dr S., Het raadsel der iepenziekte. Libellenserie no 134 (Oort) - 8, p. 43.
Cool, Cath. en Lek, Dr H.A.A. van der, Paddenstoelenboek (de V.) - 7 p. 32-33.
Cool, Cath. en Lek, Dr H.A.A. van der, Paddenstoelenboek, deel 1, derde druk bewerkt door Lek, Dr H.A.A. van der (Oort) - 8, p. 42-43
Crawshay, R., Spore ornamentation of the Russulas - 2, p. 57-58
Die Pilze Mitteleuropas Bd. I. 8 Lief. Kallenbach, Fr., Die Röhrlinge (M.) - 1, p. 45.
Die Pilze Mitteleuropas Bd. I, Lief. 12, Kallenbach, Fr., Die Röhrlinge - 5, p. 76.
Die Pilze Mitteleuropas Bd. II. Lief. 1 Neuhoff, W., Die Gallert-pilze (Tremellineae) - 6, p. 73-74.
Dujarric de la Rivière, R., Le poison des Amanites mortelles (M.) - 5 p 90.
Favre, J., Les associations fongiques des Hauts-Marais Jurassiens et de quelques régions voisines (Huijsman) - 20, p. 19-20.
Friedrich, Karl, Untersuchungen zur Ökologie der höheren Pilze (Hueck) - 17, p. 53-54.
Friesia, Nordisk Mykologisk Tidskrift (v d. Lek) - 6, p. 15-17, 36-37.
Gilbert, E.J., Les Bolets (Donk) - 3, p. 62-63
Hana, K., Onze paddenstoelen. Libellenserie no 84 (de V.) - 7, p. 33
Heim, R., Le genre Inocybe (Huijsman) - 4, p. 16.
Hintikka, T.J., Sieni Kirja (Daams) - 19, p. 66.
Höfler, Karl, Pilzsoziologie (Hueck) - 17, p. 53
Josserand, M. et Konrad, P., Note sur deux Collybia du groupe clusilis (Donk) - 3 p. 82
Kallenbach, Merulius lacrymans plaat en Merkblatt (R.) 4 p 28
Kallenbach, M. & F., Wandtafelserie essbarer und giftiger Pilze Tafel 1. Der grüne Knollenblatterpilz (Amanita phalloides) in verschiedener Färbung und in allen Entwicklungs-stufen (F.) - 2, p. 40-42.

Kavina, Prof. Dr C. et Pilát, Dr A., Atlas des champignons de l Europe (Meulenhoff) - 5, p. 89-90.

Kavina, Prof. Dr C. et Pilát, Dr A., Atlas des Champignons de l Europe Fasc. 1-5, 1934, Amanita (van der Lek) - 7, p. 15-17.

Kavina, Prof. Dr C. et Pilát, Dr A., Atlas des champignons de l Europe Fasc. 6, Pleurotus - 6, p. 74.

Konrad, P., Notes critiques sur quelques Champignons de Jura - 2, p. 57

Konrad, P. et Maublanc, A., Agaricaceae (Huijsman) - 20 p. 18 19.

Konrad, P et Maublanc, A., Icones selectae Fungorum fasc. IV (M.) -1, p. 45

Konrad, P. et Maublanc, A., Icones selectae Fungorum fasc. VIII (Meulenhoff) - 5, p. 88 89.

Kruseman, M en Wittop Koning, Martine, Paddestoelen zoeken en eten (Boetje) - 7, p. 50-51.

Lange, Jakob E , Flora agaricina Danica (Meulenhoff) - 5 p 88-89.

Lange, Jakob E., Flora agaricina Danica - 6, p. 58

Lange, Jakob E., Flora Agaricina Danica, vol. 1 (de V.) - 7, p. 33.

Lange, Jakob E , Studies in the Agarics of Denmark part VII (M) 1 p 45

Lange, Jakob E., Studies in the Agarics of Denmark no IX (Meulenhoff) 5, p. 88-89.

Lindeberg, Gosta, Uber die Physiologie Ligninabbauender Boden Hymenomyzeten (Hueck) - 16, p. 35

Martin-Sans, Dr E., L Empoisonnement par les Champignons et particulièrement les intoxications dues aux Agaricacées du groupe des Clitocybe et du groupe des Cortinarius (M.) - 1, p. 14

Modesz, Oskar, Zur Kenntnisse der Mykorrhiza bildner von Kiefer und Fichte (Hueck) - 16, p. 35

Nannfeldt, Prof. J.A., Svampar in Svenska Växter onder redactie van Björn Ursing (Daams) - 19, p. 65.

Naveau, R., Bijdrage tot de kennis van Pholiota - 2, p. 57.

Naveau, R., Nieuwe zwammen voor de Antwerpse Kempen - 2, p. 56-57

Neuhoff, Dr W., Kritische Gallertpilze II (Donk) - 3, p. 82-83.

Oort, A J P., The sexuality of Coprinus fimetarius (R.) - 1, p. 64, 74.

Paddenstoelenkalender (Boetje-v R.) - 1, p. 44-45

Petch, T., Cordyceps militaris and Isaria farinosa (Schweers) 18, p. 44.

Pilzmerkblatt, Ausgabe 28 (M.) - 2, p. 40.

Rautavaraa, T., Suomen Sienisato, Studies on the mushroom crop in Finland and its utilisation (Daams) - 19, p. 46-48.

Ray, W.W., Some mushrooms, edible and poisonous (van der Lek) - 10, p. 12-13.

"Revue de Mycologie", een nieuw Frans tijdschrift (de Veye) - 7, p. 61-64.

"Revue de Mycologie" (vervolg) (de Veye) - 7, p. 78-79.

Roelfsema, E.J.D., De champignoncultuur (van der Lek) - 8, p 31-32
Ruys, Joh., De champignoncultuur - 5, p. 76.
Schierbeek, Dr A., De wonderwereld van het mikroskoop (R) - 2e aankondig no, p. 8.
Swanenburg de Veye, G.D., Paddenstoelen in woord en beeld (Reijnders) - 5 p. 37.
Takewo Hemm', Studies on some wood-destroying Fungi attacking Conifers in Japan (van der Lek) - 6. p. 35-36.
Transactions British Mycological Society vol. 15, parts 1 en 2 (R) 3 p. 8-10.
Ullstein Sonderheft no 12 Pilze,und Pilzgerichte (M) 1. p. 23-24
Verkade's Paddenstoelen-album (Boetje-v.R.) - 1. p. 42-44.
Vuillemin, P., Les champignons parasites et les mycoses de l homme (Meulenhoff) - 4, p. 28.

VIII. DETERMINATIETABELLEN

Agaricaceae (Lütjeharms) - 9, p. 21-23.
Agaricaceae, gekleurdsporige (van Eyndhoven) - 15, p. 19-22.
Agaricaceae, witsporige (van Eyndhoven) - 14, p. 15-17.
Boleten, Overzicht der in Nederland voorkomende of te verwachten (Huijsman) - 18, p. 17-23.
Boletus (Joman) - 6, p. 46-48, 62-63, 82-84.
Boletus scaber-groep (Maas Geesteranus) - 16, p. 29.
Russula (Immler) - 20, p. 27-32.

IX. EXCURSIES, TENTOONSTELLINGEN, VOORDRACHTEN

Chronologische volgorde der algemene ledenexcursies

1929, 28-29 Sept., Delden - 1, p. 29-30.
1930, ...
1931, 10-12 Oct., Nunspeet - 3, p. 34, 37-39.
1932, 1-3 Oct., Ruurlo - 4, p. 25-27.
1933, 9 Oct., Overveen, "Elswout" - 5, p. 37-39.
1934, 6-7 Oct., Nijmegen en Kleef - 6, p. 2, 22-24.
1934, 14 Oct., Baarn - 6, p. 2-3, 24-25.
1934, 28 Oct., Heelsum, "Buunderkamp" - 6, p. 25, 73.
1935, 5-7 Oct., Gorssel - 7, p. 21-25.
1936, 26-27 Sept., Heeze - 8, p. 19-20.
1936, 24-25-Oct., Wageningen - 8, p. 17-19.
1937, 2-3 Oct., Enschede - 9, p. 17-19.
1938, 24-25 Sept., Roermond en Valkenburg - 10, p. 27-30.
1939, 14-15 Oct., Winterswijk - 11, p. 17-19.
1940, 21-22 Sept., Apeldoorn - 12, p. 2-5.
1940, 12-13 Oct., Gorssel - 12, p. 19-21.
1941, 19 Oct., Hilversum-Baarn - 13, p. 18-19.
1941, 25-26 Oct., Heelsum, "Kievitsdel" - 13, p. 19.
1942, 26-27 Oct., Lunteren - 14, p. 25-27.
1943, ...
1944, ...
1945, ...
1946, 12-13 Oct., Eindhoven - 17, p. 7-9.
1947, 25-26 Oct., Oisterwijk - 17, p. 54.
1948, 25-26 Sept., Ruurlo - 18, p. 39.
1949, 8-9 Oct., Breda - 19, p. 50.
1949, 22-23 Oct., Bergen - 19, p. 50.
1950, 30 Sept.-1 Oct., Denekamp - niet gepubliceerd !
1950, 29 Oct., Castricum - niet gepubliceerd !

Chronologische volgorde der tentoonstellingen

1930, 1-3 Nov., Nijmegen - 2, p. 20-22, 47-48, 49-50, 69.
1933, 7-9 Oct., Haarlem - 5, p. 6-10, 20-27, 44-50.
1937, 16-18 Oct., Arnhem - 9, p. 15-17.
1948, 16-18 Oct., Amsterdam - 18, p. 63-72.

Excursie "Elswout" (Boting) - 5, p. 37-39.

Excursie in de omstreken van Apeldoorn, 21-22 Sept. 1940, Met de N.M.V. op (de Veye) - 12, p. 2-5.
Excursie in de omstreken van Delden, Onze - 1, p. 29-30.
Excursie in de omstreken van Enschede, Met de Mycologische op (de Veye) - 9, p. 17-19.
Excursie naar Baarn op 14 Oct. j.l., Onze (Oort) - 6, p. 24-25.
Excursie naar "Elswout" (van Eyndhoven) - 4, p. 47.
Excursie naar Ruurlo op 9 en 10 Sept. j.l., Verslag van de (Oort) - 7, p. 13-14
Excursie Ned. Myc. Vereniging op 14 en 15 October 1939, Verslag (Middelhoek) - 11, p. 17-19.
Excursie Ned. Mycol. Ver. te Ruurlo op 1-3 Oct. 1932, Verslag van de (Swanenburg de Veye) - 4, p. 25-27.
Excursieprogramma's - zijn te vinden onder de rubriek Bestuursmededelingen.
Excursies gehouden door district III, Verslag van de (G.A. de Vries) - 19, p. 67.
Excursies in België, Mycologische - 17, p. 15-16.
Excursies, Onze - 6, p. 2-3.
Excursies op 25 en 26 Oct. 1941 in de omgeving van Kievitsdel, Verslag van de (Smit) - 13, p. 19.
Excursies van de Nederl. Mycologische Vereniging op 12 en 13 October in de omgeving van Eindhoven (Siteur) - 17, p. 7-9.
Excursies van district III, Kort verslag der (G.A de Vries) - 14, p 77
Excursies van district V, Zuid-Holland, gehouden op 3 en 17 Oct. 1943, Kort verslag van de (de Lint, de Graaf en Weverling) - 14, p. 77-78.
Excursies, Verslag van de in 1947 door district V (Zuid-Holland) gehouden (Weverling) - 18, p. 8-9.
Excursie te Lunteren op 26 en 27 Oct. j.l., Kort verslag van de (Middelhoek) - 14, p. 25-27.
Excursie te Spa, De afgebroken (Huijsman) - 10, p. 30-32.
Excursie, Verslag van de in 1948 door district V (Zuid-Holland) gehouden (de Lint, de Graaf, en Weverling) - 18, p. 75-76.
Jubileumtentoonstelling Ned. Mycol. Ver. ter gelegenheid 40-jarig bestaan, 16-18 Oct. in Artis te Amsterdam, Verslag van de (Reijnders) - 18, p. 63-72.
Jubileumtentoonstelling 1948 - 18, p. 26.
Jubileumtentoonstelling. Terugblik Onze (Schoevers) - 5, p. 20-26.
Korte verslagen - 1, p. 24. 54-58, 68, 74; 2, p. 65-66; 3, p. 13, 48-50, 65-67; 4, p. 33-34; 47-48; 5, p. 10, 39-42, 59-60, 76; 6, p. 37-40, 57, 73; 7, p. 34-35.

Ledenexcursie der N.M.V., Kort verslag van de op 26 en 27 Sept. j.l. te Heeze gehouden algemeene (de Veye) - 8, p. 19-20.
Ledenexcursie der N.M.V. te Gorssel op 5, 6 en 7 Oct. j.l., De algemeene (de Veye) - 7, p. 21-25.
Ledenexcursie der N.M.V. te Gorssel op 12 en 13 Oct. 1940, Algemeene (Smits) - 12, p. 19-20.
Ledenexcursie op 24 en 25 Oct. 1936 in de omgeving Wageningen, Verslag van de algemeene (Smits) - 8, p. 17-19.
Ledenexcursie op 19 Oct. 1941 tussen Hilversum en Baarn, Verslag van een (Smit) - 13, p. 18-19.
Ledenexcursies op 6 en 7 Oct. 1934 in de omgeving van Nijmegen en Kleef, Verslag van de algemeene (de Veye) - 6, p. 22-24.
Ledenexcursie te Gorssel op 5 en 6 October a.s., De algemeene (de V.) - 7, p. 1-2.
Lezingen over paddestoelen voor de Volksuniversiteit te A'dam, Een vijftal (de V.) - 9, p. 14.
Lezing voor de flora-commissie, Verslag van een (Uffelie) - 18, p. 35-37.
Mededeelingen van de tentoonstellingscommissie - 2, p. 15-16 47-48 69.
Nederl. Mycologische Vereeniging naar Zuid-Limburg, Met de (van Eyndhoven) - 10, p. 27-30.
Paddenstoelententoonstelling gehouden op 16, 17 en 18 Oct., 1937 te Arnhem, Verslag van de 16e (Oort) - 9, p. 15-17.
Paddenstoelen-tentoonstelling, Onze 14e - 2, p. 49-50.
Paddenstoelententoonstelling te Haarlem op 7-9 Oct., Onze 15e (Schoevers) - 5, p. 6-10.
Paddenstoelententoonstelling, Verslag van de vijftiende (Lütjeharms) - 5, p. 44-51.
Programma van excursies - zie Bestuursmededelingen.
Propaganda-excursie op 4 Oct. '36 op het terrein van Meer en Bosch, Verslag der (Akke de Vries) - 8, p. 29-30.
Propaganda-excursie op 1 Nov. 1936 te Lage Vuursche, Verslag van de (Akke de Vries) - 8, p. 30-31.
Propaganda-excursies 1938, Onze (Akke de Vries) - 10, p. 40-41.
Propaganda-excursies Baarn, "Groeneveld", Wolfheze, "Buunderkamp", Bergen en Schoorl, Telegrafisch verslag van de (de V.) - 9, p. 28-29.
Tentoonstelling in het Koloniaal Instituut (Oort) - 7, p. 13.

X. FIGUREN en FOTO'S

(Afbeeldingen van fungi zijn in de soortenlijst verwerkt)

Agsteribbe, E. (met G.L. van Eyndhoven en W.F. Smits Jr.) - 18, p. 71
Bestuur Nederl. Mycol. Ver. - 5, tegenover p. 28
Excursiefoto's - 7, p. 22; 9, p. 29; 10, p. 28; 12, p. 4; 14, p. 26.
Eyndhoven, G.L. van (met E. Agsteribbe en W.F. Smits Jr.) - 18, p. 71.
Fabius, G.C.A. (en face; met J. Valckenier Suringar) - 3, p. 69.
Heideplas, Milieufoto - 12, p. 8.
Kleijn, H. - 18, p. 65.
Lint, Suze de - 19; p. 22.
Meulemeester, P.J.A.J. - 7, p. 14.
Meulenhoff, J.S. - 7, p. 65.
Schematische tekeningen. Aantastingen van bomen door dennenmoorder en zwavelkopje - 20, p. 3; ascus - 3, p. 6; basidium - 9, p. 6; hymenium - 9, p. 6; kern- en celdelingsproces - 15 p. 18. osmose - 16, p. 3; plasmolyse - 16, p. 3; sporentypen - 15 p. 19; verband tussen bodemtemperatuur en bodemvochtigheid en het optreden van paddestoelen - 17, p. 19.
Schoevers, T.A.C. - 7, p. 14; 16, p. 11.
Schweers, A.C.S. 18, p. 69.
Smit, Mej. J.P.S. (met G.D. Swanenburg de Veye) - 18, p. 67.
Smits Jr., W.F. (met E. Agsteribbe en G.L. van Eyndhoven) - 18, p. 71.
Sporoscoop, constructietekening - 7, p. 71.
Swanenburg de Veye, G.D. (met Mej. J.P.S. Smit) - 18, p. 67.
Tekenvoorbeelden (Middelhoek) - 9, p. 42, 53, 71.
Tondeldozen - 10, p. 45, 46.
Valckenier Suringar, J. (en profiel; met G.C.A. Fabius) - 3, p. 69.

XI. IN MEMORIAM

Boellaard, In memoriam E.J.A. (Reijnders) - 19, p. 66
Boting, In memoriam H. (de V.) - 7, p. 21.
Bouwman, In memoriam B.E. (de V.) - 7, p. 1.
Brakman, In memoriam C. (Meulemeester) - 10, p. 43.
Bresadola †, Dr Giacomo - 2e aankondig.no, p. 16.
Fabius, In memoriam G.C.A. (Meulenhoff) - 3, p. 70-72.
Hanel †, Josef (Schweers) - 13, p. 28.
Joman, In memoriam A. (de V.) - 6, p. 75.
Koningin Emma, In memoriam H.M. - 5, p. 63.
Kontad †, Paul (Huijsman) - 19, p. 1.
Meulemeester, In memoriam P.J.A.J. (Swanenburg de Veye) - 20, p. 38-39.
Meulenhoff, eerelid van de Ned. Mycol. Ver., In memoriam Dr J.S. (Meulemeester) - 7, p. 65-66.
Schoevers, In memoriam T.A.C. (van der Lek) - 16, p. 11-12.
Thijsse, 25 Juli 1865 - 8 Januari 1945, In memoriam Dr Jac. P. (van Eyndhoven) - 16, p. 1-2.
Valckenier Suringar, In memoriam Prof. Dr J. (Red.) - 4, p. 19.
Vuyck, In memoriam Dr L. (Meulenhoff) - 3, p. 53-54.
Wilhadus †, Frater (Meulemeester) - 18, p. 39.

XII. REDACTIONEEL

Bij het begin van den eersten jaargang - 1, p. 1.
Bij 't begin van den nieuwen jaargang - 4, p. 1-2.
Een laatste woord van den redacteur (de Veye) - 14, p. 78.
Laatste bericht uit het redactiebureau (Zaneveld) - 18, p. 38.
Mededelingen van de redactie - 2e aankondig. no. p. 15, 1, p. 16, 40, 58; 2, p. 16, 32, 48, 69-70, 84-85; 3, p. 15-16, 36, 51-52, 84; 4, p. 34, 48; 5, p. 61-62, 77, 95-96; 6, p. 58, 90; 7, p. 18, 36, 64, 80; 8, p. 16, 32, 44, 56, 68; 9, p. 14, 32, 46, 60, 76; 10, p. 14, 26, 42, 54, 66; 11, p. 15-16, 28, 48, 66; 12, p. 18, 32, 52, 66, 80; 13, p. 16, 30, 39-40, 59; 14, p. 38, 52, 62, 70; 15, p. 16, 24, 32; 16, p. 10, 26, 41, 50; 17, p. 16, 40, 56, 68; 18, p. 12, 24, 58, 76; 20, p. 36, 72.
Onderling hulpbetoon (Red.) - 18, p. 54-55.
Ons terrein (Fabius en Reijnders) - 1e aankondig. no., p. 3-4.
Uit het nieuwe redactiebureau (Zaneveld) - 15, p. 8.
Van de redacteur (Daams) - 19, p. 52.

XIII. VONDSTEN IN DE PERS

Aardsterren in Zeist - 2, p. 61.
Amanita virosa en Mycena Seynii - 1, p. 35-36.
Antiquarische boeken - 3, p. 61.
Artikels over paddenstoelen - 1, p. 48; 2, p. 29, 61, 63; 3, p. 44-45.
Baldadigheid en paddenstoelen - 1, p. 71.
Berichten uit couranten en tijdschriften - 4, p. 32.
Berkenzwam op levend hout - 1, p. 62.
Bestrijding van dennenroest - 3, p. 81.
Catalogus mycologische werken - 2, p. 78.
Cath. Cool-fonds - 1, p. 10-11.
De eerste microscopische vergrooting van een schimmel, - 1, p. 20
De groene knolzwam - 2, p. 43.
De Nederlandsche jeugd en de natuur - 3, p. 61-62.
De paddenstoelen van Twente - 2, p. 62.
De sport van het paddenstoelenzoeken - 3, p. 43.
De Valsche Zwavelboleet - 2, p. 62.
De wetenschap stiefkind - 1, p. 50.
Die Sexualität von Coprinus fimetarius - 1, p. 74.
Dr L. Vuyck † - 3, p. 59.
Een antieke in steen gebeitelde paddenstoel - 1, p. 13.
Een suikerbietenschimmel - 1, p. 49.
Fungilore - 2, p. 78.
Gekleurde afbeeldingen - 1, p. 72.
Gekleurde transparantjes - 1e aankondig.no. p. 11.
Gevaren voor niet-leden - 3, p. 43-44.
Giftige paddenstoelen - 1, p. 73-74.
Giftige paddenstoelen en dubbelgangers - 2, p. 29.
Gistsoorten - 1, p. 51.
Glimmerinktzwam - 1, p. 11.
Heksenbezems - 1e aankondig.no. p. 11; 2e aankondig.no. p. 10; 1, p. 66.
2, p. 61.
Heksenkring van veenpluis - 2, p. 63.
Hygrophorus lacmus - 2, p. 76.
Iepenziekte - 1, p. 36, 66.
Invloed van schimmels op bouw-stijl - 1, p. 34-35.
Jagershoed van tonderzwam - 1, p. 49.
Kleurstoffen in paddenstoelen - 2, p. 29.
Lagere organismen in dienst van de biologie - 2, p. 60.
Leiderskamp voor Natuurstudie - 2e aankondig.no. p. 9.

Levensduur van roestzwamsporen - 1, p. 52.
Litho-kalender van Jan Voerman Jr. - 3, p. 60.
Meeldauw, bestrijding en immuniteit - 1, p. 66-67.
Merkwaardig gevormd eekhoorntjesbrood - 1, p. 11-12.
Moederkoorn - 2, p. 77-78.
Moeilijkheden bij determineeren van boleten - 1, p. 49.
Mycologische persberichten - 6, p. 57.
Mycorrhiza - 1, p. 21; 3, p. 45.
Naphtaline voor planten - 3, p. 80.
Natuurbescherming - 1e aankondig.no. p. 9-10.
Natuurindrukken - 1e aankondig.no. p. 9.
Nieuwe reincultuur methoden voor ascomyceten op mest - 1, p. 51-52.
Orchideeën en mycorrhiza - 2e aankondig.no. p. 9-10.
Paddenstoelen-album van Verkade - 1, p. 47-48.
Paddenstoelen en gezondheid - 3, p. 30-31.
Paddenstoelen eten en vergiftigingen - 2, p. 61.
Paddenstoelenexcursie - 1e aankondig.no. p. 10.
Paddenstoelen-foto's in "De Wandelaar" - 3, p. 59-60.
Paddenstoelengerechten - 1, p. 12.
Paddenstoelenjaar 1928 en Mycorrhiza - 1e aankondig.no. p. 10-11.
Paddenstoelennummer van Natura - 1, p. 48.
Paddenstoelen-phaenologie - 3, p 45.
Paddenstoelententoonstelling - 1e aankondig.no. p. 10.
Paddenstoelen van de Dommelkampen - 3, p. 61.
Paddenstoelenvergift en kanker - 2, p. 28.
Paddenstoelenvergiftigingen - 1, p. 47, 72-73; 2, p. 28, 43.
Parasitische zwammen op Weymouthsden en Juniperus - 1, p. 33.
Peziza rutilans - 1, p. 33.
Phaenologische waarnemingen - 1, p. 67, 74; 2, p. 61.
Phalloidesvergiftiging, Therapeutische ingreep bij - 4, p. 31-32; rectificatie 4, p. 48.
Psathyra disseminatus en Mycena Seynii - 3, p. 44.
Rapport Iepenziekte - 1, p. 46-47.
Regenval en paddenstoelen - 3, p. 30.
Regenval in dezen zomer - 2, p. 29.
Roestzwammen - 1, p. 33-34.
Schilder van paddenstoelen - 2e aankondig.no. p. 10.
Schimmelplaag bestrijding met sluipwespjes - 1, p. 12-13.
Schimmels en asthma - 2, p. 30.
Schimmels en visscherij - 1, p. 50-51.
Schouwen in Augustus - 2, p. 78.

Sexualiteit bij Basidiomyceten - 1, p. 50.
Spiraalgroei bij een cel - 2, p. 78.
Sporen en zwamdraden duizenden jaren oud - 2, p. 62.
Sporen in de ijskoude wereldruimte ? - 3, p. 60-61.
Sprekers op mycologisch gebied - 1, p. 47; 3, p. 46.
Steltstuifbal (Battarea phalloides) - 2, p. 77.
Sterkop-stinkzwam - 2, p. 76.
Stinkzwammen - 3, p. 45-46.
Truffels - 2e aankondig.no. p. 9; 2, p. 13.
Uilen op honingdauw van moederkoorn - 3, p. 10-11.
Varia - 5, p. 42, 60-61.
Vergiftiging door paddenstoelen - 3, p. 60.
Verslag paddenstoelentochten Nunspeet - 3, p. 43.
Vitaminen in gist - 1, p. 51.
Vitaminen in paddenstoelen - 2, p. 75-76.
Voordracht - 3, p. 83.
Voordracht zwammen - 1e aankondig.no. p. 10.
Werking in de grond van schimmels - 1e aankondig.no. p. 11.
Wonderlijke paddenstoelen te Batavia - 3, p. 80.
Zwammen in de Biesbosch - 3, p. 11.
Zwammen in de duinen - 2, p. 63.
Zwammen voor tonder - 1, p. 71.

XIV. WAARNEMINGEN

Aardsterren - 1, p. 63.
Berkenzwam - 2, p. 79.
Champignons in verdedigingswerken (Kam) - 16, p. 24.
De kleine stinkzwam (Van de Wouw) - 3, p. 32.
De nieuwe boleet B. pseudo-sulphureus Kallenbach (Bouwman) 1, p. 62
De ruwsporige Psilocybe foenisecii (Pers.) (de Veye) - 4, p 15 16.
Een nieuwe vezelkop - 2, p. 44.
Fluweelpootje groeiende tusschen het gras (Clerx) - 3, p. 64 65.
Giftigheid Claviceps purpurea sclerotiën (Klein) - 4, p. 47.
Glinsteringen des jaars - 2, p. 64.
Heksenkringen van Clitocybe vibecina (Clerx) - 3, p. 65.
Jeugdlichaam van de Peperbus (Myxostoma coliformis) - 2 p 44.
Lentinus suavissimus (Fr.) (R.) - 4, p. 31.
Lepiota Friesii (Lasch) - Lep acutesquamosa Weinm (R) - 4 p 30-31
Leptonia sarcita (Fr.) (de Veye) - 4, p. 30
Lysurus australiensis weer gevonden (W J L.) - 4 p. 16.
Mycena arcangeliana Bres. (Bakker) - 4, p. 46.
Nieuwe vindplaats Inocybe ammophila (Atk.) - 3, p. 47.
Nog eens de Zeeden-Mycena (Oort) - 4, p. 15.
Nogmaals Coprinus comatus - 5, p. 75-76.
Nomenclatuur (A. de Vries) - 3, p. 83.
Opwekking om aan te teekenen - 2, p. 79.
Phaenologie en Boletus rufus - 2, p. 63-64.
Phaenologische waarnemingen (Andriesse) - 4, p. 14.
Psalliota echinata (Boting) - 4, p. 29-30.
Psalliota echinata (de'Veye) - 4, p. 30.
Satansboleet ? (Bredius) - 3, p. 31.
Sterkop-stinkzwam - 2, p. 64-65.
Stinkzwammen - 3, p. 32.
Tricholoma personatum (Bakker) - 4, p. 46.
Tricholoma personatum var. anserina (Boting) - 3, p. 64.
Truffelknotszwam en Hertentruffel (R.) - 1, p. 62.
Voorjaar 1933 (van Eyndhoven) - 5, p. 1 8.
Vroege vondsten en waarnemingen voorjaar 1934 (de Lint Boting, van Eyndhoven, Oort) - 5, p. 92-93.
Waarnemingen (Bakker) - 1, p 30 31 61, 78 16 p. 9, 17, p. 26 27. 40 46-47.
Waarnemingen (van den Bergh) - 19, p. 23.

Waarnemingen (Boetje-van Ruyven) - 14, p. 51.
Waarnemingen (Brouwer) - 12, p. 79.
Waarnemingen (Daams) - 14, p. 60.
Waarnemingen (van Dijk) - 17, p. 46.
Waarnemingen (van Eyndhoven) - 12, p. 65. 14. p. 61 15, p. 6. 32 16 p. 9
Waarnemingen (Klein) - 4, p. 47; 12, p. 47-48.
Waarnemingen (van Kregten) - 14, p. 32-33; 15, p. 6, 15; 17, p. 10
Waarnemingen (van der Laan) - 14, p. 31-32, 52, 60-61.
Waarnemingen (Ligtenberg) - 15, p. 23.
Waarnemingen (de Lint) - 12, p. 49; 13, p. 56; 14, p. 33-34; 16, p. 48.
Waarnemingen (Maas-van der Meulen) - 14, p. 17-18.
Waarnemingen (van der Meulen) - 14, p. 31.
Waarnemingen (Middelhoek) - 13, p. 38; 14, p. 51.
Waarnemingen (Neijtzel de Wilde) - 17, p. 46.
Waarnemingen (van Ooststroom) - 12, p. 49.
Waarnemingen (Schweers) - 12, p. 30-31 48-49, 79; 13, p. 28-30, 37-38, 14, p. 52; 18, p. 35
Waarnemingen (Smit) - 12, p. 31; 17, p. 10.
Waarnemingen (Smith) - 12, p. 49.
Waarnemingen (de Veye) - 12, p. 31.
Waarnemingen (Weverling) - 12, p. 66, 79-80; 13, p. 56-57; 17 p. 65.
Waarnemingen (Wiersma) - 18, p. 34-35.
Waarnemingen (Wildervanck) - 17, p. 65; 18, p. 34.
Waarnemingen (van Wijk) - 17, p. 65.
Wanneer begint de stinkzwam te stinken ? (Fabius) - 3, p. 32-33
Was het paddenstoelenjaar '32 overal in ons land en in alle opzichten gunstig ? (de Veye) - 4, p. 45.
Zeedenappel mycena (Boting) - 3, p. 83.

XV. SOORTENLIJST

(Synoniemen zijn cursief gedrukt. Voorzover niet apart vermeld, zijn afbeeldingen van fungi aangeduid door een sterretje bij het paginanummer. Van oudsher bekende geografische namen in oude spelling, buitenplaatsen e.d. tussen aanhalingstekens.)

Zoveel hoofden, zoveel zinnen.

Acanthocystis algidus (Fr.) Kühner (*Pleurotus algidus*): omstreken Haarlem - 6, p. 39.

Acanthocystis applicatus (Batsch ex Fr.) Kuhner (*Pleurotus applicatus*): Bergen - Schoorl - 9, p. 29; Ruurlo, "Medler" - 4, p. 27; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.

Acanthocystis atro-caeruleus (Fr.) Sing. (*Pleurotus atro-caeruleus*): Bloemendaal, "Elswout" - 6, p. 13; Renkum, "Oranje-Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; Roermond, "Ahrwinkel" en/of Munnicksbosch - 10, p. 29; Ruurlo, "Medler" - 4, p. 27.

Acanthocystis auriscalpium (Maire) Konr. et Maubl. (*Pleurotus auriscalpium*): Delden, "Twickel" - 12, p. 48.

Acanthocystis carbonarius (Alb. et Schw. ex Fr.) Konr. et Maubl. (*Cantharellus carbonarius*): Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) - 13, p. 10; Bennekom - 19, p. 23; Epse, Epser bos - 7, p. 9, 22; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; Mook, omgev. St. Jansberg - 12, p. 6.

Acanthocystis petaloides (Bull. ex Fr.) Kühner (*Pleurotus petaloides*): beschrijving - 12, p. 63; Amsterdam, N.O. Begraafplaats - 12, p. 62, Mook, Mookerheide - 11, p. 40, 43; 12, p. 48*; Velp, "Roozendaal" - 12, p. 21; Wageningen, plantenkas - 12, p. 21, 22*.

Acanthocystis serotinus (Schrad. ex Fr.) Konr. et Maubl. (*Pleurotus serotinus*): Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 59*; 20, p. 47; Slochteren, Slochterbos - 7, p. 34.

Acetabula sulcata: zie Paxina sulcata.

Acetabula spec. - 8, p. 38; blijkt te zijn Paxina compressa, zie daar.

Agaricaceae: determinatietabel - 9, p. 21-23; tabel witsporigen - 14, p. 15-17; tabel rosesporigen - 15, p. 20; tabel bruinsporigen - 15, p. 20-21; tabel purpersporigen - 15, p. 21-22; tabel zwartsporigen - 15, p. 22.

Agaricaceae teratologicum - 4, p. 35*.

Agaricus arvensis Schaeff. ex Fr. *(Psalliota arvensis)*: kenmerken - 2e aankondig.no, p. 6; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; omgev. Arnhem (nadere informatie) - 18, p. 35; Texel - 6, p. 54; Ulvenhout - 2, p. 30.
Agaricus bernardii (Quél.) Sacc. *(Psalliota bernardii)*: Oostkapelle omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29.
Agaricus campester L. ex Fr. *(Psalliota campestris)* (N.B. waar standplaats straat tussen huizen, daar vrijwel zeker Ag. edulis (Vitt.) Møller et J.Schaeff.): champignoncultuur - 3, p. 76-77; kweekproef - 3, p. 6; sporenproductie - 10, p. 65; standplaats - 3, p. 79, Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 69; Eempolder (nadere informatie) - 13, p. 10; omgev. Haarlem - 5, p. 93; Texel - 6, p. 54; Ulvenhout - Chaam, "Honsdonck" 15 p. 23; Vlissingen, Scheldestraat - 9 p. 9; omgev. Wageningen - 5 p. 93.
Agaricus campester L. ex Fr. *(Psalliota campestris)* var. Champignoncultuur - 3, p. 3-5; begeleidende en parasitische fungi - 8, p. 46-49.
Agaricus comtulus Fr. *(Stropharia comtula)* Overveen, "Elswout" - 5 p. 38.
Agaricus edulis (Vitt.) Møller et J.Schaeff.: zie opm. onder Agaricus campester.
Agaricus haemorrhoidarius Schulz. et Kalchbr. *(Psalliota haemorrhoidaria)*: Amsterdam, Zuidelijke wandelweg - 8, p. 67; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 6, p. 38; Haarlem - 2e aankondig.no, p. 6; Heerde, Wapenvelde - 2e aankondig.no, p. 6; Ulvenhout - 2e aankondig.no, p. 6; 2, p. 45; 3, p. 32 74; de Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30; Wassenaar (Meiendel ?) - 1, p. 55; Zwolle, Spoolderberg - 2e aankondig.no, p. 6.
Agaricus purpurascens Cooke *(Psalliota purpurascens)*: Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28.
Agaricus rusiophyllus Lasch *(Psalliota rusiophylla)*: Hooge Vuursche, Blauwe Koepel - 6, p. 25; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25.
Agaricus silvaticus Schaeff. ex Secr. *(Psalliota silvatica/sylvatica)*: habitusfoto - 20, p. 37; Amsterdam, tuin Kol. Mus. en Sted. Mus. (onzeker) - 7, p. 60; Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; Bloemendaal(?) - 5, p. 93; Bloemendaal, Kraantjelek - 17, p. 25; Heilo - 15, p. 32; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 13, p. 12, Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Texel, staatsbossen - 6, p. 55, Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.
Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc. *(Psalliota silvicola)*: 's-Gravenhage - Delft (onzeker) - 10, p. 66.
Agaricus villaticus Brondeau *(Psalliota campestris* var. *vaporaria)* champignoncultuur - 3, p. 76-77; Rijswijk, Hoornbrug - 5, p. 94.
Agaricus xanthodermus Genevier *(?Psalliota cretacea*, zie opm. aldaar), Bergen-Schoorl - 5, p. 60.
Agaricus xanthodermus Genevier var. ammophilus (Menier) Maire *(Psalliota ammophila)* Oostkapelle, "Westhoven" (nadere informatie) - 8, p. 29.

Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod *(Pholiota cylindracea)*: omgev Veere - 8 p. 28; Walcheren (waar?) - 5, p. 31.
Agrocybe arvalis (Fr. sensu W G.Smith) Sing *(Naucoria arvalis)*: microscop. kenmerken - 14, p. 55*-56; verschil t.o. Naucoria myosotis - 6, p. 64. verschil t.o. Naucoria semiorbicularis - 14, p. 55; Amersfoort - 18, p. 46; Baarn, "Pijnenburg" - 18, p. 46.
Agrocybe dura (Bolt. ex Fr.) Sing *(Pholiota dura)*: verschil t.o Agrocybe praecox - 17, p. 45; Reeuwijk - 12, p. 79; Sybecarspel - 3, p. 75; omg. Velsen - 17, p. 25; Waalre (nadere informatie) - 17, p. 45; Wieringermeerpolder - 5, p. 72.
Agrocybe erebia (Fr.) Kühner *(Pholiota erebia)*: vermoedelijk omgev Dene kamp (nadere informatie) - 6; p. 34 Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) 8, p. 28; Overveen, 'Elswout' - 5 p. 38 Wasse naar, "Raaphorst" - 11, p. 65 18 p. 9.
Agrocybe ombrophila (Fr) Konr et Maubl. *(Pholiota ombrophila)*: omgev. Haarlem - 6, p. 39; Wassenaar, "Raaphorst" - 18, p. 9.
Agrocybe pediades (Pers ex Fr) Fayod *(Naucoria pediades)* Noordoostpolder - 14, p. 66.
Agrocybe praecox (Pers. ex Fr.) Fayod *(Pholiota praecox)*. verschil t.o. Agrocybe dura - 17, p. 45; Aalst (nadere informatie) - 17, p. 44; Bloemendaal(?) - 5, p. 93 Bloemendaal, Kraantjelek - 17, p. 25; s-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 13, p. 56; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61. Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 92, omgev. Maarsbergen - 17, p. 25; omgev. Wageningen (nadere informatie) - 9, p. 56; Wieringermeerpolder - 5, p. 72.
Agrocybe semiorbicularis (Bull. ex Fr.) Fayod *(Naucoria semiorbicularis)*: verschil t.o. Naucoria arvalis - 14, p. 55; Rijswijk - 9, p. 46; Wieringermeerpolder - 5 p. 72; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 59.
Agrocybe sphaleromorpha (Bull. ex Fr.) Fayod *(Pholiota praecox* subsp. *sphaleromorpha)*: Schoorl - 7, p. 55.
Aleuria aurantiaca: zie Peziza aurantia.
Aleuria cerea (Sow. ex Fr.) Boud.: Loosduinen - 3, p. 77.
Aleuria praetervisa: zie Galactinia praetervisa.
Aleuria sepiatra (Cooke) Boud.: Noordoostpolder - 15, p. 11.
Aleuria sylvestris Boud.: Enghuizen - 18, p. 34.
Aleuria vesiculosa (Bull. ex Fr.) Boud. *(Peziza, Plicaria, Pustularia vesvesiculosa)* begeleider champignoncultuur - 8, p. 47; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Bennekom (nadere informatie) - 18, p. 34; Dwingelo (nadere informatie) - 16; p. 46; Haarlem, stadstuin - 3, p; 12; Loosduinen - 3, p. 77; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Tilburg - 11, p. 62; omgev. Veendam - 8, p. 45*.

Alnicola amarescens (Quél) Romagn. *(Naucoria amarescens)*. Epse, Epserbos - 7, p. 56.

Alnicola bohemica (Vel.) Sing. *(Naucoria bohemica, Naucoria scorpioides* sensu Lange): Hatert, Hatertse broek - 9, p. 39; Wijster, biol. station - 12, p. 59-60.

Alnicola escharoides (Fr.) Romagn. *(Naucoria escharoides)*: Winterswijk, steengroeve - 11, p. 19.

Alnicola luteolofibrillosa Kühner *(Naucoria conspersa* sensu Lange): Mook Plasmolen, Groene Water en Sprengen - 13, p. 34; 20, p. 48; Wassenaar "Voor-Linden" - 18, p. 75.

Alnicola scolecina (Fr. sensu Lange) Romagn. *(Naucoria scolecina)* omgev Winterswijk - 11, p. 19.

Alnicola scolecina (Fr. sensu Lange) Romagn. f. gracillima (Lange) Konr. et Maubl. *(Naucoria scolecina f. gracillima)*: Barneveld, Haanschotergat - 13, p. 6.

Alnicola submelinoides Kühner *(Naucoria macrospora* Lange): Gennep, Genneperveen - 13, p. 34; 20, p. 49.

Alphitomyces schrötteri Reissek: parasitisch op Polyporus soort - 1e aankondig.no, p. 16.

Amanita aspera (Vitt.) Quél.: Nieuwersluis, Over-Holland" - 19, p. 67, Zoelen - 6, p. 9.

Amanita citrina (Schaeff. ex) S.F.Gray *(Amanita mappa)*: omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Ulvenhout - 3, p. 74; Wasseñaar, Meiendel - 12, p. 47.

Amanita eliae Quél.: Castricum, Geversduin - 6, p. 57, 86.

Amanita excelsa (Fr.) Quél. (N.B. moet waarschijnlijk met Amanita spissa verenigd worden): Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; Scheveningen, Nieuwe Scheveningsche Boschjes - 1, p. 57.

Amanita gemmata (Fr.) Gill. *(Amanita junquillea)*. Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; Beekhuizen - 5, p. 40; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25, Zeist - 6, p. 71.

Amanita inaurata Secr. *(Amanita, Amanitopsis strangulata)*. habitustekening - 13, p 11; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 13, p. 12; 19, p. 67; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p 28; omgev. Wageningen - 5, p. 93; 6, p. 6.

Amanita junquillea: zie Amanita gemmata.

Amanita mappa: zie Amanita citrina.

Amanita muscaria (L. ex Fr.) Pers. ex S.F.Gray: omgev. Amersfoort - 2, p. 11; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; Lunteren - Ede - 12, p. 31; Overveen "Elswout" - 5 p. 38; Texel, staatsbossen 6, p. 55, Wouwsche Plantage - 1, p. 53.

Amanita pantherina (D.C. ex Fr.) Secr.: 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47, omgev. Hilversum - 13, p. 11; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38, Texel, staatsbossen - 6 p. 55, Vaals, Drielandenpunt - 8, p. 27; Wassenaar,

Meiendel - 12, p. 47.

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr.: habitustekening - 2, p. 42; Bergen, Verbrande Pan - 2, p. 64; Bilthoven, De Pan - 18, p. 8; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Wassenaar, Meiendel - 12, p. 47; Zoelen - 6, p. 9.

Amanita phalloides var. *verna*: zie Amanita verna.

Amanita plumbea: zie Amanita vaginata.

Amanita porphyria (Alb. et Schw. ex Fr.) Secr.: Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; omgev. De Bilt - 6, p. 40; Lunteren, "De Leperkoen" - 14, p. 27; omgev. Nijmegen - 6, p. 22; Olterterp - 6, p. 38.

Amanita rubescens (Pers ex Fr.) S.F.Gray afb. teratologicum - 9, p. 75; habitusfoto - 17, p. 8; omgev. Amersfoort - 2, p. 11, 14; Gieten - 9, p. 12; Gorssel - 7, p. 77; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; Haarlem, stadstuin - 3, p. 11; omgev. Haarlem - 6, p. 12; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25; Noordbroek - 6, p. 32; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; De Steeg, "Middachten" - 10, p. 25; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.

Amanita solitaria (Bull. ex Fr.) Secr. *(Amanita strobiliformis)*: Delden, "Twickel" - 9, p. 18; omgev. Ruurlo - 4, p. 27; Walcheren (waar?) - 8, p. 29.

Amanita spissa (Fr.) Quél. *(Amanita valida)* (N.B. moet waarschijnlijk met Amanita excelsa verenigd worden): habitustekening - 9, p. 71; Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; Roermond, "Ahrwinckel" en/of "Munni cksbosch" - 10, p. 29; Ulvenhout - 2, p. 45; Wolfheze, "Buunderkamp" - 6, p. 39; omgev. Wageningen - 8, p. 19.

Amanita strangulata: zie Amanita inaurata.

Amanita strobiliformis: zie Amanita solitaria.

Amanita vaginata (Bull ex Fr.) Quél. *(Amanita vaginata* var. *plumbea, Amanitopsis plumbea, Amanitopsis vaginata)* (N.B. niet onmogelijk hebben sommige citaten eerder betrekking op var. fulva): omgev. Amersfoort - 2, p. 14; Eindhoven-Best - 7, p. 46; De Lutte - 9, p. 10; omgev. Maarsbergen 17, p. 26; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; 6, p. 13; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28; omgev. Wageningen - 10, p. 12;

Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) Quél. var. fulva (Schaeff. ex Fr.) Gilbert (soms abusievelijk als Amanita of Amanitopsis vaginata): Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28.

Amanita vaginata var. *plumbea*: zie Amanita vaginata.

Amanita valida: zie Amanita spissa.

Amanita verna (Lam. ex Fr.) Pers. ex Vitt. sensu Maire, Heim, etc. *(Amanita phalloides* var. *verna)*: Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 93; Roermond, "Ahrwinckel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Zoelen - 6, p. 9.

Amanita virosa (Fr.) Quél.: afb. spiraalgroei steel - 14, p. 31; omgev. De Bilt (onzeker) - 6, p. 40; Schoorl - 1, p. 35.
Amanitopsis strangulata: zie Amanita inaurata.
Amanitopsis plumbea: zie Amanita vaginata.
Amanitopsis vaginata: zie Amanita vaginata.
Amoeba met parasitaire schimmel - 11, p. 60*.
Anellaria gracilipes Pat. (*"Annellaria separatus* var. *gracilipes"*) (dubieuze soort, misschien een Psathyrella?): Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66.
Anellaria semiovata (Sow. ex Fr.) Pearson et Dennis (*Panaeolus separatus, Anellaria, Stropharia separata*): omgev. Bergen - 9, p. 68; Dokkumer Nieuwe Zijlen (nadere informatie) - 18, p. 34; Hengelo, stadstuin - 13, p. 13*, 14; Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29; Peize-Paterswolde - 18, p. 34.
Anellaria separata: zie Anellaria semiovata.
Annellaria separatus var. *gracilipes*: zie Anellaria gracilipes.
Anthracobia melaloma (Alb. et Schw. ex Fr.) Boud.: Epse - 12, p. 25.
Anthurus australiensis: zie Lysurus australiensis.
Arachnopeziza aurelia (Pers. ex Fr.) Fuck.: beschrijving & afb. - 18, p. 4-6; omgev. Renkum - 18, p. 4; Wolfheze, Wodanseiken - 18, p. 4.
Armillaria mellea: zie Armillariella mellea.
Armillaria mucida: zie Oudemansiella mucida.
Armillaria ramentacea: zie Tricholoma ramentaceum.
Armillariella mellea (Vahl ex Fr.) Karst. (*Armillaria mellea*). aantastingsbeeld van Pinus silvestris - 8, p. 20; afb. rhizomorphen en culturen - 8 p. 21-23; lichtend mycelium - 2, p. 37-39; 3, p. 40-42; onderzoek parasitaire gedrag - 8, p. 20-23; Amsterdam, v.Baerlestr. - 7, p. 60; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; 7, p. 60; Breda, Mastbosch, Princenhage - 3 p. 65; omgev. Delden - 1, p. 30, 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; omgev. Haarlem - 2 p. 63; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19 p. 11; Ulvenhout - 2 p. 30, 39; 3, p. 41, 75; Vogelenzang - 5, p. 66.
Arthrobotrys oligospora Fresen.: Nematoden-vangend apparaat - 17, p. 59*.
Ascobolus furfuraceus Pers. ex Fr (*Ascobolus stercorarius*): korte beschrijving & afb. - 17, p. 33; Enschede - 12, p. 25; Wageningen, kas - 17, p. 33.
Ascobolus stercorarius: zie Ascobolus furfuraceus.
Ascobolus viridis Curreÿ : Hatert, Haterse broek - 15, p. 11.
Ascophanus granulatus (Bull. ex Fr.) Speg.: Enschede - 12, p. 25; Nijmegen, stadstuin - 11, p. 43; 12, p. 25.
Aspergillus oryzae (Ahlb.) Cohn.: habitustekening - 15, p. 27.
Aspidella vittadinii (Mor.) Gilbert (*Lepidella, Lepiota vittadinii*): Delft, tuin Lab. Techn. Bot. - 13, p. 54*; 17, p. 27; Delft, stadsplantsoenen - 16, p. 9; 17, p. 27, 47.

Asterophora lycoperdoides (Bull. ex) Ditmar ex S.F.Gray *(Nyctalis asterophora)*: anatomie en gemmenvorming & afb. - 9, p. 33-37; parasiet op Russula nigricans, R. adusta, Lactarius piperatus, L. vellereus, Collybia fusipes - 5, p. 84, 85; saprophyt en parasiet - 6, p. 9-10; Boxtel, Best, Veldersbosch - 7, p. 47, omgev. Bussum - 5, p. 40, omgev. Chaam - 6, p. 34*-35; Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 7; Gieten - 9, p. 12; Ulvenhout - 2, p. 45.

Asterophora parasitica (Bull. ex Fr.) Sing. *(Nyctalis parasitica)*: anatomie en gemmenvorming & afb. - 9, p. 33-37; parasiet op Russula adusta, R. foetens, R. chloroides, R. delica, R. nigricans, Lactarius blennius, L. vellereus - 5, p. 85; Delden "Twickel" - 9, p. 18; Paterswolde, "De Braak" (vermoede lijk, nadere informatie) - 7, p. 34.

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg. *(Geaster hygrometricus)*: Amersfoort - 2, p. 12; Heilo, Heiloër bos - 17, p. 30.

Auricularia auricula-judae (Fr.) Berk. *(Hirneola auricula judae)*: bijzondere gastheer keuze: Acer negundo - 11, p. 3, Euonymus europaeus - 11, p. 3; Fagus - 5, p. 39; 11, p. 3; Quercus - 5, p. 66; 11, p. 3; Ulmus - 6, p. 39; 9, p. 41; 11, p. 3; Overveen, "Elswout" - 5, p. 39; Paterswolde, "De Braak" - 6, p. 56; Rozenburg, De Beer - 2, p. 65; Vogelenzang - 5, p. 66.

Auricularia mesenterica (Fr.) Pers.: habitusfoto - 9, p. 41; Aerdenhout - 16, p. 9; Beesd, "Mariënweerd" - 19, p. 64; Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28.

Auriscalpium vulgare Karst. *(Hydnum, Pleurodon auriscalpium)*: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7; Gorssel, "t Amelte" - 12, p. 20; Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77.

Barlaea carbonaria (Fuck.) Sacc.: Epse, Epser bos - 12, p. 20, 24, 75.

Barlaea cinnabarina (Fuck.) Sacc.: Epse, Epser bos - 9, p. 40.

Barlaea constellatio: zie Pulvinula constellatio.

Barlaea convexella: zie Pulvinula haemastigma.

Barlaea persoonii (Crouan) Sacc.: Hatert, Hatertse broek - 15, p. 11.

Belonioscypha campanula (Nees ex Fr.) Rehm: beschrijving & afb. - 20, p. 9-10; Wageningen, Dorskamp - 20, p. 9.

Belonioscypha ciliatospora: zie Helotium ciliatosporum.

Belonioscypha vexata (De Not.) Rehm: afb. paraphysen en sporen - 20, p. 9.

Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) Karst. *(Polyporus adustus)*: Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75; Wekerom, Harskamp (nadere informatie) - 18, p. 34.

Bjerkandera fumosa (Pers. ex Fr.) Karst. *(Polyporus fumosus, P. fumosus* var. *fragrans)*: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; omgev.

Oisterwijk - 11, p. 62; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Wassenaar "Voor-Linden" - 18, p. 75.
Bolbitius conocephalus (Bull. ex Fr.) Ricken (N.B. is vermoedelijk een Conocybe): omgev. Valkenswaard - 3, p. 48.
Bolbitius fragilis (L. ex) Fr. *(Bolbitius titubans)* (N.B. waarschijnlijk onbetekenende vorm van Bolbitius vitellinus): Walcheren (waar?) - 8, p. 29.
Bolbitius hydrophilus: zie Psathyrella hydrophila.
Bolbitius reticulatus (Pers. ex Fr.) Ricken *(Pluteolus aleuriatus)*: Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 56.
Bolbitius titubans: zie Bolbitius fragilis.
Bolbitius vitellinus (Pers. ex) Fr.: obligaat mestbewoner - 8, p. 39; Best-Boxtel, "Veldenbosch" - 7, p. 46-47; Hengelo-Delden, Twente-Rijnkanaal - 17, p. 43*.
Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr *(Boletus cavipes)*. diagnose - 18, p. 18; Anlo (nadere informatie) - 16, p. 46; Chaam, "Honsdonck" - 6, p. 35; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; 12, p. 16; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Gieten (nadere informatie) - 16, p. 46; Heeze - 19, p. 63; De Lutte - 9, p. 10; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; Norg (nadere informatie) - 16, p. 46.
Boletus determinatietabel - 6, p. 46-48; determinatietabel scaber-groep - 16, p. 29; overzicht der in Nederland voorkomende of te verwachten boleten - 18, p. 17-23.
Boletus aereus Bull. ex Fr.: diagnose - 18, p. 20.
Boletus aestivalis zie Boletus appendiculatus subsp. pallescens.
Boletus albidus Roques *(Boletus radicans* Pers. ex Fr., non sensu Kbch.) diagnose - 18, p. 19, 20; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67.
Boletus appendiculatus Schaeff. ex Fr.: diagnose - 18, p. 19, 20.
Boletus appendiculatus Schaeff. ex Fr subsp. pallescens Konr *(Boletus aestivalis)*: diagnose - 18, p. 19, 20.
Boletus armeniacus Quél. (wellicht vorm van Boletus subtomentosus). diagnose - 18, p. 23.
Boletus aurantiacus Bull. ex Pers *(Boletus rufus*. ten dele): diagnose - 16 p. 30; 18, p. 22; verschil t.o. Boletus rufescens - 16, p. 17; Bergen, "Duinvermaak" - 16, p. 17; Vogelenzang, "Vinkenduin" - 16, p. 17.
Boletus auriporus Peck: zie Boletus cramesinus.
Boletus badius (Fr.) Fr.: diagnose - 18, p. 23; verschil t.o. Boletus pulverulentus - 8, p. 11 omgev. Amersfoort - 2 p. 11 14; De Bilt "Beerschoten" - 18, p. 7 Hilversum-Baarn - 13 p. 18 Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Ulvenhout - 1, p. 53.
Boletus bellini Inzenga: diagnose - 18, p. 21
Boletus boudieri: zie Boletus placidus.

Boletus bovinus L. ex Fr.: diagnose - 18, p. 21; associatie met Gomphidius roseus - 3, p. 79; 5, p. 60; voorkomen op Pinus silvestris - 14, p. 33; microfoto buisjeslaag - 8, p. 60; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; 3, p. 79; Baarn, "Buitenzorg" - 6, p. 24; Bergen-Schoorl - 5, p. 60; Bloemendaal - 4, p. 24-25; Borger - 6, p. 88*-89*; Eoe - 14, p. 33; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; Lunteren-Ede 12, p. 31; Norg (teratolog.) - 19, p. 16; omgev. Rijssen - 12, p. 14; omgev. Stroe (morchelloide vorm) - 14, p. 64; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.

Boletus calopus Pers. ex Fr.: diagnose - 18, p. 20; Hilversum-Baarn - 13, p. 18.

Boletus carpini (R. Schulz) Pearson *(Boletus pseudo-scaber* Kbch., *Boletus scaber* sensu Gilbert, Maire, Quélet, etc.): diagnose - 16, p. 29; 18, p. 22.

Boletus castaneus: zie Gyroporus castaneus.

Boletus cavipes: zie Boletinus cavipes.

Boletus chrysenteron Bull. ex Fr.: diagnose - 18, p. 23; Best-Boxtel, "Veldersbosch" (nadere informatie) - 17, p. 45; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12.

Boletus cramesinus Secr. *(Boletus auriporus)*: diagnose - 18, p. 23; beschrijving & afb. - 7, p. 27-29; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 11, p. 23; 15, p. 6; Gorssel - 7, p. 24; 11, p. 23; omgev. Haarlem - 6, p. 39; 7, p. 27; 11, p. 23; Mook, Plasmolen - 9, p. 39; 20, p. 47; Santpoort, "Neethof" - 7, p. 30; 11, p. 23.

Boletus cyanescens: zie Gyroporus cyanescens.

Boletus dupainii Boud.: diagnose - 18, p. 21.

Boletus duriusculus Kalchbr. et Schulz.: diagnose - 16, p. 30; 18, p. 22; omgev. Bussum - 5, p. 40.

Boletus edulis Bull. ex Fr.: diagnose - 18, p. 19-20; verschil t.o. Boletus impolitus - 5, p. 29; teratologicum - 1, p. 11; omgev. Amersfoort - 2, p. 11, 14; Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) - 13, p. 10; Best-Boxtel, "Veldersbosch" (nadere informatie) - 17, p. 45; omgev. Delden - 1, p. 29; Eindhoven, "Wielewaal" (nadere informatie) - 17, p. 45; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Noordbroek - 6, p. 32; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Ulvenhout - 1, p. 53; De Vuursche - 13, p. 10.

Boletus edulis Bull. ex Fr. subsp. pinicola (Vitt.) Konr. et Maubl.: diagnose - 18, p. 19-20.

Boletus edulis Bull. ex Fr. subsp. reticulatus (Schaeff. ex Boud.) Konr. et Maubl. *(Boletus reticulatus)*: diagnose - 18, p. 19-20; Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 8, p. 29.

Boletus elegans: zie Boletus flavus.
Boletus erythropus (Fr. ex Fr.) Krombh. (non Pers.) *(Boletus miniatoporus)*: diagnose - 18, p. 19-20; verschil t.o. Boletus queletii - 8, p. 11; Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) - 13, p. 10; omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17, p. 45; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Ulvenhout - 3, p. 75.
Boletus erythropus Pers. (non Fr.): zie Boletus queletii.
Boletus felleus: zie Tylopilus felleus.
Boletus flavidus Fr.: diagnose - 18, p. 21; beschrijving - 12, p. 20; Gorssel, "'t Amelte" - 12, p. 20.
Boletus flavus With. ex Fr. *(Boletus elegans,* vermoedelijk): diagnose - 18, p. 21; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17, p. 45; 's-Gravenhage, "Clingendaal" - 11, p. 65; omgev. Ruurlo (teratologicum) - 19, p. 15*-16; Valkenswaard-Heeze (nadere informatie) - 14, p. 60; Zoelen - 6, p. 9.
Boletus fragrans Vitt.: diagnose - 18, p. 19-20.
Boletus granulatus L. ex Fr.: diagnose - 18, p. 21; omgev. De Bilt - 6, p. 40; Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
Boletus holopus Rostk. *(Boletus niveus)*: diagnose - 16, p. 30, 18, p. 22; omgev. Bussum - 5, p. 40.
Boletus impolitus Fr.: diagnose - 18, p. 23; beschrijving & afb. - 5, p. 28-29; verschil t.o. Boletus edulis - 5, p. 29; Bunnik - 5, p. 29; Hemmen - 5, p. 29; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 18, p. 46; 19, p. 67; Wageningen - 5, p. 29.
Boletus junquilleus: zie Boletus pseudosulphureus.
Boletus leucophaeus sensu Maire, etc.: zie Boletus scaber Bull. ex Fr.
Boletus leucophaeus Pers.: dubieuze soort, niet goed bekend.
Boletus luridus Schaeff. ex Fr.: diagnose - 18, p. 19-20; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25; Oostkapelle, "Zeeduin" - 8, p. 11; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Wageningen, Laantje van Duivendaal - 9, p. 9.
Boletus luteus L. ex Fr.: diagnose - 18, p. 21. groeiwijze - 3, p. 79; omgev. Amersfoort - 3, p. 79. Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Eindhoven - 7, p. 46; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; omgev. Rijssen - 1, p. 53; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; De Vuursche-Hollandsche Rading - 8, p. 31.
Boletus miniatoporus. zie Boletus erythropus (non Pers.).
Boletus niveus: zie Boletus holopus.
Boletus pachypus (N.B. identiteit onzeker ! of Boletus albidus, of Boletus calopus): Amerongen - 7, p. 35; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26.
Boletus parasiticus Bull. ex Fr.: diagnose - 18, p. 22; biologie - 3, p.

39 40 parasiet op Scleroderma aurantium en S verrucosum 5 p. 85, Boxtel Best "Veldersbosch" - 17 p 8* Breda Mastbosch - 3, p 39, Loosduinen, 'Ockenburg' 11 p 64 Roermond Ahrwinckel en/of "Munnincksbosch" - 10, p. 29; omgev. Stadskanaal - 6, p. 10, 11*,

Boletus piperatus Bull. ex Fr. diagnose 18 p. 21 omgev. Amersfoort 2 p 11 Doorn-Maarn - 19 p 11 Eindhoven, Eckart en Oirschotsche dijk (nadere informatie) - 17, p. 45 .Hilversum-Baarn - 13, p. 18

Boletus placidus Bon (*Boletus boudieri*) diagnose - 18 p 21, beschrijving & afb. - 13, p. 8-9. Amersfoort-Woudenberg; De Treek - 13, p. 8; Apeldoorn - 13 p. 9-10; Apeldoorn, "Klarenbeek" - 7, p. 22; Baarn 13, p. 9-10; Driebergen - 13, p. 9-10; Lochem - 13, p. 9-10; Oosterbeek 13, p. 9-10; Putten - 13, p. 9-10. Zeist - 13, p. 9-10.

Boletus pseudo-scaber Kbch: zie Boletus carpini

Boletus pseudo-sulphureus Kbch (*Boletus junquilleus*) diagnose - 18 p. 19-20; Bilthoven - 1, p. 53, 62; omgev. Hilversum - 13, p. 11. Hondsrug (waar?) - 6, p. 6.

Boletus pulverulentus Opat. diagnose 18 p 23 verschil t.o Boletus badius - 8 p 11 Bergen (op tentoonstelling nieuw voor de flora) 6, p. 57; Best - 19, p. 63; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 34, 42. Oostkapelle 'Berkenbosch' en 'Westhoven' (nadere informatie) 8 p 29; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.

Boletus purpureus Fr. (*Boletus rhodoxanthus*) diagnose - 18, p. 19-20 beschrijving 5 p 34; Aerdenhout 'Naaldenveld - 5 p. 33; Bathmen, 'Bannink" - 7, p. 24*, 77; omgev. Haarlem - 5, p. 33; Oostkapelle, "Zeeduin" - 8, p. 11; Wassenaar, "Raaphorst" - 12, p. 47.

Boletus queletii Schulz (*Boletus erythropus* Pers.): diagnose - 18 p. 19, 20-21; verschil t.o. Boletus erythropus Fr. (non Pers.) - 8, p. 11; Oostkapelle, "Zeeduin" - 8, p. 11, 28 (nadere informatie).

Boletus radicans (non sensu Kbch.): zie Boletus albides.

Boletus regius Krombh. diagnose - 18, p. 19-20; Delden, "Twickel" - 5. p. 41.

Boletus reticulatus: zie Boletus edulis subsp. reticulatus.

Boletus rhodoxanthus: zie Boletus purpureus.

Boletus rufescens (Secr.) Konr (*Boletus rufus*, ten dele): diagnose - 16, p. 30; 18, p. 22; beschrijving & afb. - 15, p. 10-11; verschil t.o. Boletus aurantiacus - 16, p. 17; habitusfoto - 17, p. 8.

Boletus rufus (N.B dubieuze naam; niet meer na te gaan of bedoeld B. aurantiacus dan wel B. rufescens): teratologicum - 1, p. 12. noot; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; omgev. Haarlem (?) - 2, p. 64; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; Ulvenhout - 1. p. 53.

Boletus satanas Lenz : diagnose - 18, p. 19-20; Kennemerland (Bloemendaal?)

- 4, p. 25; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 13; p. 12; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; 6, p. 13; Zoelen - 6, p. 8-9.
Boletus scaber Bull. ex Fr. (non sensu Quél., etc) (*Boletus leucophaeus* sensu Maire): diagnose - 16, p. 30; 18, p. 22; kweekproef - 3, p. 6; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Eefde - 3, p. 6; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Texel, staatsbossen - 6, p. 55
Boletus scaber sensu Gilbert, Maire, Quel., etc., zie Boletus carpini
Boletus subtomentosus L. ex Fr.: diagnose - 18, p. 23; omgev Amersfoort - 2, p. 11; Gorssel - 7, p. 77; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
Boletus subtomentosus L. ex Fr. subsp spadiceus (Fr.) Konr. et Maubl.: diagnose - 18, p. 23.
Boletus sulphureus Fr.: diagnose - 18, p 21-22; Bussum - 1, p 62; Enschede - 1, p. 62.
Boletus tessellatus Gill. (bijgeval synoniem van Boletus nigrescens Rich. et Roze?): diagnose - 16, p. 30; 18, p. 22.
Boletus torosus Fr.: diagnose - 18, p. 19-20.
Boletus tridentinus Bres.: diagnose - 18, p. 21.
Boletus variegatus Sw. ex Fr.: diagnose - 18. p. 21-22; groeiwijze - 3, p. 79; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; 3, p. 79; Hilversum-Baarn - 13, p. 18.
Boletus versicolor (Rostk.) Massee: diagnose - 18. p. 23; Baarn. "Groene veld" - 13, p. 10; Beekhuizen - 5, p. 40; Best (nadere informatie) - 17, p. 45; Chaam, "Valkenberg" - 1, p. 25; omgev. Denekamp (vermoedelijk nadere informatie) - 6, p. 33; Dwingelo, Brink (nadere informatie) - 16. p. 46. Eindhoven, Oirschotse dijk (nadere informatie) - 17, p. 45 Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28; Overveen, "Elswout" - 5. p. 38; De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18; Ulvenhout - 1, p. 26; 2, p. 46; 3 p 75; Walcheren (waar?) - 5, p. 31. Wolfheze, "Buunderkamp" - 8. p. 17.
Boletus viscidus L. ex Fr.: diagnose - 18, p. 21; Hilversum, Spanderswoud - 7, p. 35; Rotterdam, Kralinger Hout - 16, p. 18; Zoelen - 6, p. 9.
Boletus spec.: afb. teratologicum - 6, p. 54.
Botryosporium pulchrum Corda beschrijving - 18, p. 30; Amsterdam, A'damse bos - 18, p. 30.
Botrytis gemella (Bon.) Sacc.: omgev. Rijswijk (onzeker) - 11, p. 25.
Bovista gigantea: zie Calvatia gigantea.
Bovista nigrescens Pers. ex Pers.: 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 13, p. 56; Loosduinen, "Ockenburg" - 5. p. 93.
Bovista plumbea Pers. ex Pers.: Egmond aan Zee - 5, p. 61.
Brefeldia maxima (Fr.) Rost. (Myxomycetes): De Steeg, "Middachten" - 8 p. 18; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.
Bulgaria inquinans: zie Phaeobulgaria inquinans.

Calocera cornea (Batsch ex Fr.) Fr.: habitustekening - 10, p. 22; Wassenaar, Meiendel - 2, p. 66.

Calvatia bovista (Pers. ex Pers.) Th. Fr. Jr. *(Lycoperdon bovista, Lycoperdon caelatum)*: 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 13, p. 56; omgev. Haarlem - 5, p. 93; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.

Calvatia excipuliformis (Scop. ex Pers.) Perdeck *(Lycoperdon excipuliforme, Lycoperdon saccatum)*: Gorssel - 7, p. 77, De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.

Calvatia gigantea (Batsch ex Pers.) Lloyd *(Bovista gigantea, Lycoperdon giganteum)* sporenproductie - 10, p. 65; Alkmaar, Centraal Ziekenhuis - 6 p. 52, Amsterdam Vondelpark - 7, p. 59; 's-Gravenhage, Zuiderpark - 10, p. 66; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; omgev. Schagen - 6, p. 30*; 11, p. 23.

Camarophyllus irrigatus (Pers. ex Fr.) Karst *(Hygrophorus irrigatus)*: Ulvenhout - 2, p. 45

Camarophyllus niveus (Scop. ex Fr.) Karst. *(Hygrophorus niveus)*. Beekhuizen - 5, p. 40; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 47; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46, Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" (onzeker) - 20, p. 67; Heelsum, omgev. Heelsumsche beek - 13, p. 19; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.

Camarophyllus pratensis (Pers. ex Fr.) Karst. *(Hygrophorus pratensis)*: Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67.

Camarophyllus russocoriaceus (Berk. et Miller) Lange *(Hygrophorus russocoriaceus)*: omgev. Bussum - 14, p. 77; Haren, Hortus "De Wolf"-20 p.67.

Camarophyllus subradiatus (Schum. ex Fr.) Karst. *(Hygrophorus subradiatus)*: habitustekening - 19 p. 5; Delden, "Backenhage" (nadere informatie) - 18, p. 53; Gorssel "'t Joppe" - 12, p. 20.

Camarophyllus virgineus (Wulf. ex Fr.) Karst *(Hygrophorus virgineus)*. Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.

Cantharellus aurantiacus: zie Clitocybe aurantiaca.

Cantharellus carbonarius: zie Acanthocystis carbonarius.

Cantharellus cibarius Fr. habitusfoto - 20 p. 21, gastheer van Leptonia - parasitica - 5, p. 85; standplaats - 3 p. 79; omgev. Amersfoort - 2, p. 11, 14, 3, p. 79; Beekhuizen - 5, p. 40; Ede, Hoekelom - 5, p. 42; Emmen, Emmerdennen - 14, p. 32; Goor-Markelo - 12, p. 14; Gorssel - 7, p. 77; Heeze - 7 p. 76; Hengelo (foutief als Cantharellus friesii) - 9 p. 27; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25; Oldenzaal-Denekamp (kleurvariaties) - 10, p. 39; omgev. Ruurlo (teratologicum) - 19, p. 14; Ulvenhout - 3, p. 74; Texel, staatsbossen-6, p. 55.

Cantharellus friesii: onjuiste determinatie, zie onder C. cibarius.

Cantharellus infundibuliformis: zie Craterellus tubaeformis.

Cantharellus lutescens: zie Craterellus lutescens.

Cantharellus olidus: zie Clitocybe olida.
Cantharellus pallidus Cooke: zie Clitocybe aurantiaca.
Cantharellus tubaeformis: zie Craterellus tubaeformis.
Cantharellus umbonatus: zie Clitocybe umbonata.
Cantharellus spec.: afb. teratologicum - 11, p. 45.
Ceratostomella ulmi (Schwarz) Buisman *(Graphium ulmi)*: biologie - 7, p. 39-41; geslachtelijke vorm van Graphium ulmi - 3, p. 77-78; verwekker iepenziekte - 1, p. 36, 63.
Ceriomyces albus (Corda) Sacc. *(Ptychogaster albus)* (jeugdstadium van Polyporus trabeus (??): bedoeld P. borealis, maar ook dat onbewezen): zie Tyromyces ptychogaster.
Champignoncultuur: afb. kweekbed - 3, p. 4.
Chlorosplenium aeruginosum (Oeder) De Not.: veroorzaker groenrot - 1, p. 9; Bergen - 2, p. 30; Loosduinen, "Ockenburg" - 1, p. 57: Prinsenhage, Liesbosch - 1, p. 9; Ulvenhout - 1, p. 28; 3, p. 32; Wassenaar, "Raaphorst" - 11, p. 65: Wassenaar, "Rust en Vreugd" (abusievelijk "Rust en Vrede") - 1, p. 9.
Ciboria batschiana (Zopf) Buchw. *(Sclerotinia pseudo-tuberosa)*: Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 12, p. 42; omgev. Eindhoven - 15, p. 32: Wassenaar, Meiendel - 9, p. 40; Wassenaar, "Raaphorst" - 12 p.47.
Ciboria pygmaea (Fr.) Rehm (N.B. hoort niet in Ciboria thuis, nog onbeslist waar wel): Hengelo - 12, p. 25; Vierlingsbeek - 9, p. 40; 12, p. 25.
Ciboria pyriformis (Hedw.) Rehm (N.B. hoort niet in Ciboria thuis, nog onbeslist waar wel): Beugen - 12, p. 42.
Ciboria sydowiana: zie Rutstroemia sydowiana.
Ciliaria fleischeriana (P.Henn.) v. Ov.: afb. sporen - 9, p. 3.
Clathrus cancellatus: zie Clathrus ruber.
Clathrus ruber Mich. ex Pers. *(Clathrus cancellatus)*: habitustekening 13 p. 22: Amsterdam-Haarlem - 11, p. 30; Bergh, Wijnbergen - 13, p.35 Bloemendaal - 13, p. 19; Leiden, Hortus Bot - 13, p. 21: Roermond - 13, p. 21.
Claudopus byssisedus (Pers. ex Fr.) Gill.: parasiet op Hymenogaster tener, Inocybe godeyi Pachyphlaeus citrinus, Tuber rufum - 14 p. 10; Doetinchem, "Slangenburg" - 10, p 37; Valkenburg, Vogelsbosch - 10 p.29.
Claudopus depluens (Batsch ex Fr.) Gill - Eindhoven(?) - 7, p. 47.
Claudopus parasiticus (Quél.) Ricken *(Claudopus subdepluens, Leptonia parasitica)*: parasiet op Cantharellus cibarius - 5, p 85; 14, p. 10, parasiet op Coriolus versicolor en Polyporus perennis - 5, p. 85-86*; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49; 5, p. 86-87.
Claudopus subdepluens: zie Claudopus parasiticus.

Claudopus variabilis: zie Dochmiopus variabilis.
Clavaria abietina: zie Ramaria ochraceo-virens
Clavaria abietina f. *flaccida*: zie Ramaria flaccida.
Clavaria acuta Sow. ex Fr *(Clavaria falcata)*: omgev. Ruurlo - 4, p. 27
Clavaria affinis Pat. et Doass.: Ooij - 15, p. 11
Clavaria argillacea Pers. ex Fr.: Schoorl staatsterreinen - 3, p 66.
Clavaria asterospora: zie Clavulinopsis asterospora.
Clavaria aurea: zie Ramaria aurea.
Clavaria botrytis: zie Ramaria botrytis
Clavaria corniculata: zie Clavulinopsis corniculata.
Clavaria falcata: zie Clavaria acuta.
Clavaria fistulosa: zie Clavariadelphus fistulosus.
Clavaria inaequalis: zie Clavulinopsis helvola.
Clavaria juncea: zie Clavariadelphus junceus.
Clavaria juncea var. *vivipara*: zie Clavariadelphus junceus.
Clavaria pallida: zie Ramaria mairei.
Clavaria pistillaris: zie Clavariadelphus pistillaris.
Clavaria rosea Dalman (N.B wordt niet vermeld in Donk Corner etc.) Venraay, Oostrum - 14, p. 66.
Clavaria rugosa: zie Clavulina rugosa.
Clavaria subtilis: zie Clavulinopsis subtilis.
Clavaria vernalis: zie Clavulinopsis vernalis.
Clavariadelphus fistulosus (Holmskj. ex Fr.) Corner *(Clavaria fistulosa)* Baarn, "Groeneveld" - 18, p. 47; Olterterp - 6, p. 38; omgev. Oosterwolde - 5, p. 41; Vogelenzang - 5, p. 68.
Clavariadelphus junceus (Alb. et Schw. ex Fr.) Corner *(Clavaria juncea* et var. *vivipara, Typhula juncea)* Amersfoort - 2, p. 12; Baarn, "Groeneveld" - 18, p 47; Drouwen, Drouwenerzand - 5, p. 67-68*; Epse, Epserbos - 10, p. 41; Gorssel, "'t Joppe" - 12 p. 20; Slochteren, Slochterbos - 6, p. 38; Vogelenzang - 5, p. 67.
Clavariadelphus pistillaris (L ex Fr.) Donk *(Clavaria pistillaris)*: omgev. Deventer - 7, p. 31*.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul.: Ommen - 1, p. 52.
Clavulina cristata (Holmskj. ex Fr.) Schroet. *(Ramaria cristata)*. Vaals, Drielandenpunt - 8, p. 27.
Clavulina rugosa (Bull. ex Fr.) Schroet *(Clavaria rugosa)*: Amersfoort - 2, p. 12.
Clavulinopsis asterospora (Pat.) Corner *(Clavaria asterospora)*: Hatert - 10, p. 37.
Clavulinopsis corniculata (Schaeff. ex Fr.) Corner *(Clavaria corniculata)*: Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20.

Clavulinopsis helvola (Pers. ex Fr.) Corner *(Clavaria inaequalis*, zie echter vooral Corner, p. 343!): Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67.
Clavulinopsis subtilis (Pers. ex Fr.) Corner *(Clavaria subtilis)*: Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 55.
Clavulinopsis vernalis (Schw.) Corner *(Clavaria vernalis)*: Bergeyk - 17, p. 35; Esbeek - 17, p. 35; Gennep, Genneperveen - 11, p. 42-43; 20, p. 48; Hengelo - 11, p. 42; Lheebroek, Lheebroekerzand - 11, p. 42-43; Limmel - 17, p. 35; Valkenswaard - 17, p. 35.
Clitocybe alexandri (Gill.) Konr.: Velsen, "Velserbeek" - 14, p. 61.
Clitocybe aurantiaca (Wulf. ex Fr.) Studer *(Cantharellus aurantiacus, Cantharellus "pallidus")*: Amsterdam(?), kas - 11, p. 24; Bergen-Schoorl - 5, p. 60; Breda, Mastbosch - 1, p. 53; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Ulvenhout - 1, p. 53; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77; Wassenaar, Meiendel (onzeker) - 6, p. 68.
Clitocybe brumalis (Fr.) Quél.: Vogelenzang - 5, p. 66.
Clitocybe cerussata (Fr.) Quél.: Beekhuizen (onzeker) - 5, p. 40; Wassenaar, (Meiendel?) - 1, p. 55; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.
Clitocybe clavipes (Pers. ex Fr.) Quél.: veldkenmerk blauwzuurgeur - 18, p. 74; gastheer van Volvaria loveiana - 5, p. 85; Hilversum-Baarn, 13, p. 18-19.
Clitocybe connata (Schum. ex Fr.) Gill.: Enschede, "Smalenbroek" - 9, p. 17*-18; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77.
Clitocybe cyathiformis (Bull. ex Fr.) Quél. (N.B hetgeen Schweers Cl. tarda noemt is "zwarte, grote varieteit" van Cl. cyathiformis, beschreven in weinig bekend werk van Frans auteur (Dunant??), nadere informatie): Winterswijk (Het Woold?) - 11, p. 19.
Clitocybe dealbata (Sow. ex Fr.) Gill.: 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 6, p. 38.
Clitocybe ericetorum (Bull. ex Fr.) Quél.: Texel, staatsbossen - 7, p. 49.
Clitocybe flaccida: zie Lepista inversa.
Clitocybe gangraenosa: zie Lyophyllum leucophaeatum.
Clitocybe geotropa (Bull. ex Fr.) Quél.. Walcheren (waar?) - 8, p. 29.
Clitocybe gigantea (Sow. ex Fr.) Quél.: ontwikkeling heksenkring - 7, p. 10-11; Walcheren (waar?) - 8, p. 29.
Clitocybe gyrans (Paulet) Gill.: Wouwsche Plantage (onzeker) - 1, p. 53.
Clitocybe hydrogramma (Bull. ex Fr.) Sing. *(Omphalia hydrogramma)*: veldkenmerk geur van kippenhok - 18, p. 75.
Clitocybe infundibuliformis (Schaeff. ex Fr.) Quél.: omgev. Maarsbergen - 17, p. 26.
Clitocybe inversa: zie Lepista inversa.

Clitocybe laccata: zie Laccaria laccata
Clitocybe nebularis (Batsch ex Fr.) Quél. gastheer van Volvaria loveiana 5, p. 85; Amersfoort - 2, p. 12; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Oosterhout, "Oosterhout" - 13 p. 34. 42' Overveen, "Elswout" - 4, p. 47. Vogelenzang - 5, p. 66
Clitocybe obbata (Fr.) Quél.: Amersfoort 2, p. 12
Clitocybe obsoleta (Batsch ex Fr.) Quél. Renkum Oranje Nassau Oord of Wolfheze "Buunderkamp" - 11, p. 47 omgev. Winterswijk - 11, p. 19
Clitocybe odora (Bull. ex Fr.) Quél. omgev. Chaam - 6 p. 34 Hilversum Baarn - 13, p. 19: De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10' Overveen, "Elswout" - 4, p. 47: 5, p. 38
Clitocybe olearia (D.C. ex Fr.) Maire *(Pleurotus olearius)* beschrijving & afb. - 11, p. 54-57; omgev. Wilp - 11, p. 19 (abusievelijk opgegeven Deventer), 53.
Clitocybe olida (Quél.) Konr. *(Cantharellus olidus)* beschrijving & afb 6, p. 26; Wolfheze, "Buunderkamp" - 6, p. 25. 39
Clitocybe pachyphylla (Fr.) Gill veldkenmerken - 12, p. 49 Wolfheze "Buunderkamp" - 8, p. 17: 12, p. 49
Clitocybe phyllophila (Fr.) Quél. De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30
Clitocybe rivulosa (Pers. ex Fr.) Quél. Noordbroek - 6, p. 32; Overveen "Elswout" - 5, p. 38; Vogelenzang - 5, p. 66.
Clitocybe splendens: zie Lepista gilva.
Clitocybe suaveolens (Schum. ex Fr.) Quél. Hilversum-Baarn 13 p. 19. omgev. Rijssen - 12, p. 15; Vogelenzang - 5, p. 66.
Clitocybe tarda: zie Clitocybe cyathiformis.
Clitocybe tornata (Fr.) Quél.: Ede-Bennekom - 14, p. 61.
Clitocybe umbonata (Gmel. ex Fr.) Konr. *(Cantharellus umbonatus)*. Waalre 19, p. 64; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77.
Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. Breda, Mastbosch - 3 p. 65 Norg (onzeker, teratologicum) - 19, p. 16; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38: Renkum "Oranje-Nassau Oord" of Wolfheze "Buunderkamp" - 11 p. 47.
Clitocybe spec. beschrijving - 14 p. 64-65, omgev. Stroe - 14, p. 64
Clitopilopsis mundulus (Lasch) Kühner *(Rhodopaxillus mundulus)* Wassenaar, Meiendel - 13, p. 14.
Clitopilus cretatus (Berk. et Br.) Sacc.: verschil t.o. Pleurotus mutilus - 8, p. 47-48; begeleider champignoncultuur - 8, p. 48.
Clitopilus pinsitus (Fr.) Joss. *(Pleurotus passeckerianus*, vermoedelijk) beschrijving & afb. - 12, p. 61, opgevat als cultuurvorm van Pleurotus mutilus - 8, p. 48, noot; Wijster, "Klencke" - 12, p. 61-62.
Clitopilus prunulus (Scop. ex Fr.) Quél.: Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28; omgev. Rijssen - 12, p. 15; De Vuursche

- Hollandsche Rading - 8, p 31; Wageningen, Laantje van Duivendaal - 9, p. 9.

Cnazonaria erythropus: zie Typhula erythropus.

Coccomyces coronatus (Schum.) De Not : korte beschrijving & afb. - 17 p.5

Coleosporium melampyri (Reb.) Kleb., uredin., telium Bennekom - 19, p. 40; Wageningen - 19, p. 40

Coleosporium senecionis (Pers.) Fr. aecid stad hiervan waarschijnlijk Peridermium oblongisporium Rostr 19 p. 40 Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 30; uredin., telium; Wageningen, Binnenhaven en Eng - 19, p. 40.

Coleosporium sonchi (-arvensis) (Pers.) Lév - uredin , telium Wageningen, Binnenveld - 19, p. 40

Collybia acervata (Fr.) Gill (N B zie opm bij Marasmius erythropus) Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5.

Collybia ambusta (Fr.) Quél.: Bergen, staatsbossen - 11, p. 42

Collybia atrata (Fr.) Quel *(Tephrophana atrata)* Amsterdam Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Epse, Epser bos - 7, p. 9, 22; 10, p. 41; Epse, Epser bos of Gorssel, " 't Hassink" - 12, p. 20; Heeze (nadere informatie) - 17, p. 45; Valkenswaard, Beuven en visvijvers (nadere informatie) - 17, p. 45; De Vuursche-Hollandsche Rading - 8, p. 31; Wageningen - 20, p. 33; Wassenaar, Meiendel - 13, p. 15.

Collybia butyracea (Bull ex Fr.) Quél. Terschelling omgev. Hoorn - 20, p 18

Collybia cirrhata (Schum. ex Fr.) Quél.: Doorn-Maarn - 19, p. 11.

Collybia clusilis (Fr.) Gill.: Hatert, Uiversnest - 17, p. 6

Collybia collina (Scop. ex Fr.) Quél.: omgev. Gorssel - 7, p. 73.

Collybia conigena sensu Fr Gill Sacc Lange zie Collybia myosura

Collybia coracina (Fr.) Gill.: Oosterhout, "Oosterhout" - 10, p. 37; 13 p. 42.

Collybia dryophila (Bull ex Fr.) Quél afb teratologica 6 p. 45 46. Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39, Heeze - 7, p. 76; omgev Maarsbergen - 17, p. 25

Collybia erosa: zie Collybia tesquorum.

Collybia funicularis (Bull. ex Fr.) Konr. et Maubl.: Heeze - 7, p. 76

Collybia fusipes (Bull ex Fr) Quél. : gastheer van Nyctalis asterophora 5, p. 85; Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; Roermond, "Ahrwinkel" en/of Munnicksbosch" 10, p 29 De Steeg, "Middachten" - 5 p 60. Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28; Vijlen, Vijlener bos - 10, p. 30

Collybia inolens (Fr.) Quél.: Wassenaar, Meiendel - 5, p. 87

Collybia laccata: zie Laccaria laccata.

Collybia laxipes (Fr.) Quél - omgev Denekamp (vermoedelijk nadere informatie) - 6, p. 33

Collybia leucomyosotis: zie Collybia palustris.
Collybia longipes: zie Xerula pudens.
Collybia maculata (Alb et Schw. ex Fr.) Quél.: droogtevormen - 6, p. 33*; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; omgev. Chaam - 6, p. 35, Texel, staatsbossen - 6, p. 55; 7, p. 49; Zeist - 6, p. 71.
Collybia mephitica (Fr.) Karst. Mook Plasmolen St Jansberg - 14 p 66; 20, p. 49
Collybia misera (Fr.) Sacc onduidelijk verschil t.o. Collybia leucomyosotis - 12, p. 9; Wassenaar, Meiendel - 5, p. 88.
Collybia myosura (Fr.) Quél. *(Collybia conigena)* Oosterhout 'Oosterhout' - 13, p. 42; Texel, staatsbossen - 7, p. 35, 49, 56; Wolfheze, "Buunderkamp - 8 p. 17
Collybia obstans Britzelm Hatert Hatertse vennen - 14 p. 66.
Collybia palustris Peck *(Collybia leucomyosotis, Tephrophana palustris)* onduidelijk verschil t.o. Collybia misera - 12 p. 9, omgev. Eindhoven - 17, p. 35; Gennep - 9, p. 39; 20, p. 47, omgev. Krommenie (nadere informatie) - 17, p. 43, omgev. Wijster - 12, p. 8, 9*.
Collybia platyphylla (Pers. ex Fr.) Quél. Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25; Ruurlo, "Kleine Meene" - 12, p. 76; De Vuursche-Hollandsche Rading - 8, p. 31
Collybia protracta (Fr.) Gill.: Winterswijk, Ratum - 11, p. 43.
Collybia radicata: zie Oudemansiella radicata.
Collybia tenacella: zie Marasmius tenacellus.
Collybia tesquorum (Fr.) Gill. *(Collybia erosa)* beschrijving - 7 p 50. Gennep, Genneper veen - 13, p. 34; 20, p. 48; Nistelrode - 7, p. 50; Schoorl, IJsbeer - 11, p. 43; Texel, staatsterrein - 7, p. 35, 49, 56
Collybia tuberosa (Bull ex Fr.) Quél. parasiet op Russula adusta, R. nigricans, Lactarius vellereus Polyporus squamosus, Hydnum soorten 5, p. 85; omgev. Chaam - 6, p. 34*-35
Collybia velutipes (Curt ex Fr.) Quél vegetatiefoto - 6, p. 59 grondbewonend en wortelend - 14, p. 61; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8 p 39 Breda Wilhelminapark 3 p 64, Breda-Terheyden 3, p. 65, Haarlem Haarlemmer Hout - 20 p 18; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25 Nieuw Beerta 6 p 15, 34 Rijswijk - 9 p. 46 Rijswijk Hoornbrug 5, p 94 Terschelling, omgev. Hoorn - 20 p 18 omgev Wageningen - 20, p. 33.
Collybia spec.: beschrijving & afb. sporen - 13 p 32-33, Amersfoort-Woudenberg, de Treek - 13, p. 32.
Coniophora puteana (Schum. ex Fr.) Karst.: Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; omgev. Valkenburg - 19, p. 29.

Conocybe appendiculata Lange et Kühner *(Galera ravida* sensu Ricken) Oosterhout, "Oosterhout" - 9, p. 39.
Conocybe blattaria (Fr. sensu Ricken) Kühner: Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42.
Conocybe coprophila Kühner: beschrijving - 14, p. 54-55; Oude Mirdum, Mirdumer Klif - 14, p. 54.
Conocybe lateritia (Fr.) Kühner *(Galera lateritia)*: Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
Conocybe leucopoda Kühner: beschrijving & afb. - 13, p. 7-8; Wijster, biol. station - 13, p. 8.
Conocybe pubescens (Pers. ex Fr.) Kühner *(Galera tenera* sensu Ricken, non Fr.): verschil t.o. Galera vittaeformis - 6, p. 65; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
Conocybe rickenii (J.Schaeff.) Kühner *(Galera pygmaeo-affinis* sensu Ricken, non Fr.): verschil 2- en 4-sporige vorm - 12, p. 44*-45; verschil t.o. Galera vittaeformis - 6, p. 65; Bilthoven, De Pan - 18, p. 8. Enschede Museum Grensland - 12 p. 45; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 59.
Conocybe spartea (Fr. sensu Ricken) Konr. et Maubl. *(Galera spartea)* verschil t.o. Galera vittaeformis - 6, p. 65.
Conocybe spicula (Lasch sensu Ricken) Kühner *(Galera spicula)*: verschil t.o. Galera vittaeformis - 6, p. 65; Hátert, Vogelbos - 16, p. 31.
Conocybe togularis (Bull. ex Fr sensu Ricken) Kühner *(Pholiota togularis)*: Amsterdam, Vondelpark - 8, p. 38.
Conocybe typhicola (P.Henn.) Schweers *(Naucoria typhicola)*: Overasselt - 10, p. 37, 51; 18, p. 1*, 3.
Conocybe spec. beschrijving & afb. - 14 p. 68-69; Vogelenzang, "Leyduin - 14, p. 67.
Coprinus angulatus (N.B. determinatie stellig onjuist nadere informatie misschien Coprinus lipophilus Heim et Romagn.?): 's-Gravenhage - 16, p. 48; 17, p. 10; Walcheren, omgev. Nieuw en St. Joosland - 8, p. 29.
Coprinus aquatilis Peck: Mook, Plasmolen - 10, p. 37; 20, p. 47.
Coprinus atramentarius (Bull. ex Fr.) Fr. *(Coprinus fuscescens)*: vegetatiefoto - 6, p. 72; gastheer van Stropharia epimyces - 5, p. 85; Amsterdam, Vondelpark - 5, p 69 Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Appingedam - 17, p. 24; Haarlem, stadstuin - 3, p. 11; Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28; Rotterdam, Kralinger Hout - 14, p. 48. Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72; IJzendoorn - 17, p. 25.
Coprinus boudieri Quél. (volgens M.Lange synoniem van Coprinus angulatus Peck): Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; Epse, Epser bos - 7, p. 10, 22, 10, p. 41; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20. Hilversum, Spanderswoud - 7, p. 35.

Coprinus cinereus: zie Coprinus fimetarius.
Coprinus comatus (Müller ex Fr.) S F Gray' habitustekening - 9 p 71 gastheer van Stropharia epimyces - 5, p. 85; kweekproef - 3, p. 6' sporenproductie - 10, p. 65; omgev. Amersfoort - 2. p. 11; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Eindhoven - 7. p. 46; 's-Graveland "Bantam" - 16, p. 47; 's-Gravenhage, stadsplantsoen - 17, p. 65; Haarlem, omgev. Haarlemmer Hout - 5, p. 56; omgev. Rijssen - 12, p. 14; Rijswijk, Hoornbrug - 5, p. 94; omgev. Wageningen - 5, p. 93; Wieringermeerpolder (waar?) 5. p 72; Winterswijk. Buskersbosch - 11 p 19.
Coprinus congregatus (Bull. ex) Fr ` begeleider champignon cultuur - 8. p. 46; Loosduinen, kassen - 3, p. 77.
Coprinus cordisporus: zie Coprinus patouillardii.
Coprinus deliquescens (Bull. ex Fr) Fr. Castricum, Geversduin - 6 p.57.
Coprinus dilectus sensu Lange zie Coprinus erythrocephalus
Coprinus disseminatus (Pers. ex Fr) S.F Gray *(Psathyrella disseminata)*' vegetatiefoto - 7, p. 13' Appingedam - 17 p 24; Loosduinen. "Ockenburg" - 5, p. 93. Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p 40 Wageningen plantenkas - 12 p. 21 Walcheren(waar?) - 8, p. 29.
Coprinus ephemeroides (Bull ex Fr) Fr sensu Lange Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 9, p. 39; 20, p. 47.
Coprinus ephemerus (Bull ex Fr) Fr sensu Locq. begeleider champignon cultuur - 8, p. 46; Loosduinen, kassen - 3, p. 77.
Coprinus erythrocephalus Lév *(Coprinus dilectus* sensu Lange) Amsterdam. Artis, plantenkas - 14, p. 75
Coprinus fimetarius (L ex Fr *(Coprinus cinereus)* begeleider champignon cultuur - 8, p. 46. Loosduinen, kassen - 3, p. 77; Wekerom (onzeker, nadere informatie) - 18 p. 34.
Coprinus friesii Quél beschrijving & afb standplaats - 8 p 14 15 Oosterhout Oosterhout (nadere informatie) 18 p 3. Walcheren (waar?) - 8, p. 29.
Coprinus fuscescens weinig belangrijke vorm van Coprinus atramentarius
Coprinus hemerobius. zie Coprinus plicatilis.
Coprinus impatiens (Fr) Quel Mook Plasmolen, St Jansberg - 11 p 43 20, p. 48.
Coprinus lagopus (Fr) Fr. habitustekening 10 p. 22. Aerdenhout 'Naaldenveld' - 5, p. 41; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38. Wassenaar, "Raaphorst" - 18, p. 9
Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr.: gebruik als voedsel - 1, p. 11; Amsterdam. Vondelpark - 5. p 70, Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8 p 39. s-Gravenhage Meer en Bosch' 13, p 56, Haarlem, stadstuin

3,-p 11; Hengelo - 17, p. 42; Nieuw Beerta (onzeker) - 6, p. 15; Vogelenzang - 5, p. 93.

Coprinus niveus (Pers. ex Fr.) Fr. Rotterdam, Kralinger Hout - 16, p. 18, omgev. Rijswijk - 11, p. 25.

Coprinus patouillardii Quel *(Coprinus cordisporus)* Walcheren (waar?) 5, p. 32.

Coprinus phaeosporus Karst.: Walcheren (waar?) - 5, p. 32.

Coprinus picaceus (Bull ex Fr.) Fr. Deventer Lochem, omgev. t Joppe - 7, p. 23; Epse, Epser bos - 10, p. 41; Gorssel, "'t Amelte" en t Joppe - 12, p. 20

Coprinus plicatilis (Curt. ex Fr ; Fr *(Coprinus hemerobius)* Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Haarlem, stadstuin - 3, p. 11; De Vuursche - 13, p. 10.

Coprinus radians Desmaz.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.

Coprinus stercorarius (Bull ex Fr) Fr begeleider champignon cultuur 8, p. 46; Eindhoven, kas - 19, p. 63.

Coprinus subtilis (Fr) sensu Ricken Oosterhout, Oosterhout 13 p 34

Corpinus tergiversans (Fr.) Fr.: omgev. Bussum - 14, p. 77.

Cordyceps capitata (Holmskj. ex Fr ; Link Dwingelo 16 p 46*, Gieten - 12, p. 17; Norg - 16, p. 46.

Cordyceps militaris (L ex Fr) Link: conidieënvorm is Cephalosporium spec , niet Isaria farinosa - 18, p. 44; parasiet op pop van Agrotis pronuba - 7, p. 30; omgev. Amersfoort - 2, p. 9-10; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; Maarn - 6, p. 37; omgev. Rijswijk 11, p. 25; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.

Cordyceps ophioglossoides (Ehrh ex Fr) Link verschil t o Geoglossum ophioglossoides - 6, p. 84 85 parasiet op Elaphomyces granulatus - 1 p 62 parasiet op Elaphomyces cervinus en variegatus 6 p 85, omgev. Amersfoort - 1, p. 63; Bloemendaal, "Wildhoef" - 1, p. 62, Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; Dwingelo - 16, p. 46*; omgev. Eindhoven - 15, p. 32; Gasselte - 6, p. 84; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; Norg - 16, p. 46; Oisterwijk, vennengebied - 7, p. 47; Ulvenhout - 2, p. 45; Wassenaar, "Raaphorst" - 11, p. 65

Cordyceps ouwensii v.Hohn.: vliegenparasiet - 7, p. 30.

Cordyceps unilateralis (Tul.) Sacc.: mierenparasiet - 7, p. 30

Corethromyces stilici Thaxter: Hengelo - 16, p. 7*-8.

Coriolus pubescens (Schum ex Fr) Quel. *(Polyporus pubescens)* Bergen staatsbossen - 11, p. 42, Schoorl, staatsbossen (onzeker) 8 p 38

Coriolus versicolor (L ex Fr)/*(Polyporus versicolor)* gastheer van Quél. Claudopus subdepluens - 5, p 86' Amsterdam, Vondelpark - 5 p 70 Amsterdam Zuidelijke Wandelweg 8 p 39 Haarlem stadstuin 3 p 12 Wassenaar, Meiendel 3, p 49 5 p. 87, Wassenaar 'Voor-Linden

- 18, p. 75.
Corticium giganteum: zie Peniophora gigantea.
Cortinarius (Inoloma) albo-violaceus (Pers ex Fr.) Fr : Overveen "Elswout"-5, p. 38.
Cortinarius (Dermocybe) anomalus (Fr. ex Fr) Fr : morchelloide vorm - 11 p. 45*; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; omgev. Winterswijk - 11, p. 45
Cortinarius (Dermocybe) anthracinus (Fr.) Fr. Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4.
Cortinarius (Telamonia) armillatus (Fr) Fr : Heelsum-Doorwerth - 13 p 19; Lochem-Almen, "De Flesch" - 12, p. 19.
Cortinarius (Telamonia) bibulus Quél *(Cortinarius pulchellus)* Heeze - 8 p. 37; 12, p. 31; 18, p. 2; Mook, Plasmolen, Groene Water - 12, p. 31; 18, p. 2; 20 p. 47; Mook, Plasmolen, Sprengen - 12, p. 31.
Cortinarius (Telamonia) bivelus (Fr. ex Fr.) Fr.: Overveen, "Elswout" - 5 p. 38.
Cortinarius (Inoloma) bolaris (Pers. ex Fr.) Fr.: Amersfoort - 2, p. 12; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Ulvenhout - 2, p. 45
Cortinarius (Telamonia) bovinus Fr omgev. Hilversum - 9 p. 44; Utrecht, Maliebaan - 17, p. 39.
Cortinarius (Dermocybe) caninus (Fr.) Fr.: Heelsum-Doorwerth - 13 p. 19; Putten "Schovenhorst" (morchelloide vorm) - 6 p. 60-61* omgev. Stroe (morchelloide vorm) - 14, p. 64.
Cortinarius (Hydrocybe) castaneus (Bull ex Fr.) Fr. Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19.
Cortinarius (Phlegmacium) cedretorum Maire Doorwerth "De Zalmen" - 13, p. 19, 34; 17, p. 37.
Cortinarius (Dermocybe) cinnabarinus Fr Heelsum-Doorwerth - 13 p. 19; Wassenaar, "Duinrel" - 11, p. 65.
Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeus (L. ex Fr.) Fr. verschil t.o C cinnamomeus var. croceus - 18, p. 47; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeus (L ex Fr) Fr. var. croceus (Schaeff. ex Fr.) Fr.: verschil t.o. C. cinnamomeus - 18, p. 47; Bilthoven - 18, p. 47; Zeist - 18, p. 47.
Cortinarius (Inoloma) cotoneus Fr Doetinchem, "Slangenburg" - 7. p. 56.
Cortinarius (Phlegmacium) cristallinus Fr : Apeldoorn "Het Loo" - 12, p. 5; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33.
Cortinarius (Phlegmacium) croceo-caeruleus (Pers ex Fr.) Fr. verschil t.o Cortinarius porphyropus - 6 p 48 Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Oldeberkoop (nadere informatie) - 7, p. 34; Olterterp - 6, p. 38; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
Cortinarius (Inoloma) cyanites Fr.: verschil t o Cortinarius violaceus - 6, p. 52

Cortinarius (Phlegmacium) decolorans (Pers. ex Fr.) Fr.: verschil t.o. Cortinarius delibutus - 6, p. 51; verschil t.o. Cortinarius porphyropus - 6, p. 48.

Cortinarius (Myxacium) delibutus Fr.: beschrijving & afb. - 6, p. 50-51; verschil t.o. Cortinarius decolorans, illibatus, pluvius, vibratilis - 6, p. 51; Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5; Bergen, Uilenvangersweg - 6, p. 50; Castricum, Geversduin - 6, p. 57; Gieten - 6, p. 50; 9, p. 12; 12, p. 17; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.

Cortinarius (Myxacium) elatior Fr.: Gieten - 9, p. 12.

Cortinarius (Phlegmacium) emollitus Fr.: Hatert - 10, p. 37.

Cortinarius (Phlegmacium) fulmineus (Fr.) Fr. omgev. Bilthoven - 10, p. 40.

Cortinarius (Telamonia) hemitrichus (Pers. ex Fr.) Fr.: Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19.

Cortinarius (Phlegmacium) herpeticus Fr.: verschil t.o. Cortinarius scaurus - 6, p. 50.

Cortinarius (Myxacium) illibatus Fr. verschil t.o. Cortinarius delibutus - 6, p. 51.

Cortinarius (Phlegmacium) infractus (Pers. ex Fr.) Fr.: verschil t.o. Cortinarius scaurus - 6, p. 50; omgev. Amersfoort - 11, p. 48; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.

Cortinarius (Myxacium) mucosus (Bull. ex Fr.) Cooke: Heilo, Heiloër bosch - 17, p. 30.

Cortinarius (Phlegmacium) multiformis (Fr. ex) Fr.: Baarn, Groeneveld - 19, p. 67; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.

Cortinarius (Phlegmacium) nemorensis (Fr.) Lange: Enschede, Hooge Boekel - 14, p. 9.

Cortinarius (Dermocybe) orellanus Fr.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19; Oosterbeek-Laag - 13, p. 34.

Cortinarius (Telamonia) paleaceus Fr.: Bilthoven, De Pan - 18, p. 7.

Cortinarius (Dermocybe) phoeniceus (Bull. ex) Maire: verschil t.o. Cortinarius semisanguineus - 14, p. 9; Enschede, "Hof Espelo" - 14, p. 9.

Cortinarius (Inoloma) pholideus (Fr. ex Fr.) Fr.: Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19.

Cortinarius (Myxacium) pluvius (Fr.) Fr.: verschil t.o. Cortinarius delibutus - 6, p. 51.

Cortinarius (Phlegmacium) porphyropus (Alb. et Schw. ex) Fr.: beschrijving - 6, p. 48; verschil t.o. Cortinarius croceo-caeruleus, decolorans, purpurascens, subpurpurascens: 6, p. 48-49; Zuidlaren - 6, p. 48.

Cortinarius (Myxacium) pseudo-salor Lange Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.

Cortinarius pulchellus Lange: zie Cortinarius bibulus

Cortinarius (Phlegmacium) purpurascens (Fr. ex) Fr *(C. purpurascens* var *subpurpurascens, C. subpurpurascens)* verschil t o Cortinarius porphyropus - 6, p. 49; Garderen - 7, p. 56

Cortinarius purpurascens var. *subpurpurascens* zie Cortinarius purpurascens.

Cortinarius (Myxacium) salor Fr.: Doorwerth - 13, p. 34.

Cortinarius (Phlegmacium) scaurus (Fr. ex Fr) Fr. beschrijving & afb. 6, p. 49; verschil t.o. Cortinarius infractus, herpeticus - 6, p. 50; Anloo, Kniphorst - 6, p. 50; Olterterp - 6, p. 38, 50.

Cortinarius (Dermocybe) semisanguineus (Fr.) Gill. verschil t.o. Cortinarius phoeniceus - 14, p. 9; Dwingelo (teratologica) - 19, p. 13-14*; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Maarn (teratologica) - 6, p. 37*; Texel staatsbossen - 6, p. 55.

Cortinarius subpurpurascens: zie Cortinarius purpurascens.

Cortinarius (Inoloma) tophaceus Fr. Ter Apel - 2, p. 53

Cortinarius (Telamonia) torvus (Fr ex Fr) Fr. Epse Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; Ulvenhout - 2, p. 45.

Cortinarius (Phlegmacium) triumphans Fr Walcheren (waar?) - 5, p. 31.

Cortinarius (Myxacium) vibratilis (Fr) Fr. verschil t.o. Cortinarius delibutus - 6, p. 51 Olterterp - 6 p. 38 Roermond "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.

Cortinarius (Inoloma) violaceus (L ex Fr) Fr. beschrijving - 6, p. 51; verschil t.o. Cortinarius cyanites - 6, p. 52; Appelsga - 6, p. 51.

Coryne sarcoides (Jacq ex Fr.) Tul omgev. Aalst - 14, p. 60 Wassenaar "Duinrel" - 12, p. 48; 14, p. 32.

Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers. omgev. Amersfoort(?) - 2, p 12; omgev. Denekamp 4, p. 76 omgev Denekamp (vermoedelijk nadere informatie) - 6, p. 33; Gieten - 6, p. 56; 7, p. 34 (nadere informatie); 9, p. 11*; 12, p. 17; Heerde, Wapenvelde - 4, p. 76; Mook, Plasmolen, St Jansberg 13 p 29 34; 20, p. 48; Putten, Solsche Gat 12 p 31

Craterellus lutescens (Pers. ex Fr.) Fr *(Cantharellus lutescens)*. Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5; Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 7.

Craterellus sinuosus (Fr) Fr Boxtel Best "Veldersbosch" 17 p 8, Eindhoven, Oirschotse dijk 19 p 63 Epse, Epser bos of Gorssel "'t Hassink" - 12, p. 20; Gieten - 9, p. 11; 12, p. 17; omgev. De Lutte - 10, p. 36; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10.

Craterellus tubaeformis (Fr) Quél. *(Cantharellus infundibuliformis, Cantharellus tubaeformis)*. omgev Amersfoort - 2, p 12 Beekhuizen 5

p. 40* omgev Chaam - 6, p. 35; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; omgev. De Lutte - 10, p. 36; De Lutte omgev. Paasberg en Hakenberg - 19 p 11; omgev. Nijmegen - 6, p. 22; Olterterp - 7, p. 35.
Crepidotus calolepis (Fr.) Karst Druten, Leuven - 9 p. 39
Crepidotus mollis (Bull. ex Fr.) Quél. Wassenaar 'Duinrel' - 12 p 48
Crepidotus phillipsii (Berk. et Br.) Sacc. Beuningen (nadere informatie) - 6, p. 57.
Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat. *(Marasmius stipitarius)* voorkomen op Ammophila arenaria en Festuca rubra - 15, p. 15; voorkomen op andere substraten - 16, p. 34; Wassenaar Duinrel - 15 p. 15 Wassenaar Meiendel - 14, p. 78; 15, p. 15.
Cronartium ribicola Diet. uredin. telium Wageningen Binnenveld 19 p. 40.
Crucibulum vulgare Tul. Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8 p. 39. Over veen. Elswout - 4. p 47 Rozenburg, De Beer - 2: p. 65 De Vuursche Lage Vuursche - 8, p. 31.
Cudoniella aquatica (Lib.) Sacc (N.B. waarschijnlijk identiek met Ombrophila clavus): Mook, Plasmolen - 10, p. 37; 20, p. 47.
Cyathicula coronata (Bull. ex Karst.) De Not.: Velp - 12. p. 42
Cyathicula lepidula March *(Peristomialis lepidula)*. Mook Plasmolen Hellekuil - 12 p. 43 13 p. 34. 20 p. 48 Mook Plasmolen Sprengen 13, p. 34.
Cyathicula marchantiae (Sommerf.) Sacc. *(Peristomialis marchantiae)* Mook, Plasmolen - 12, p. 7, 43; 13, p. 34; 17, p. 36; 20 p. 48, Venraay - 17. p. 36
Cyathipodia corium: zie Paxina corium.
Cyathus olla (Batsch ex) Pers habitustekening 10 p 22 Amsterdam Zuidelijke Wandelweg 8 p 67 De Vuursche Lage Vuursche 8 p 30 Zuid-Beveland, Kaloot - 20, p. 71
Cyathus striatus Willd ex Pers De Vuursche Lage Vuursche 8 p 30
Cylindrium flavo virens (Ditm.) Bon. Warmond Huis te Warmond 2 p 66
Cylindrocolla urticae (Pers.) Bon. beschrijving 18 p 30 Wageningen - 18, p. 30
Cyphella ampla: zie Cytidia flocculenta.
Cyphella capula (Holmskj ex) Fr waardplanten 9 p 54 Haren Hortus Bot. - 9, p. 54-55*; Hengelo (nadere informatie) - 14, p. 9; omgev Rijswijk - 11, p. 25.
Cyphella muscigena Fr sensu Burt omgev Nijmegen 6 p 22
Cystoderma amianthinum (Scop. ex Fr.) Fayod *(Lepiota amianthina)* s Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30; Hilversum Baarn - 13, p. 19.
Cystoderma amianthinum (Scop ex Fr.) Fayod var longisporum (Kühner) Smith

et Sing *(Lepiota amianthina* var *longispora)* Wouwsche Plantage - 9, p 51.
Cystoderma carcharias (Pers ex Secr) Fayod *(Lepiota carcharias)* Gieten (nadere informatie) 7 p 34 Gorssel t Amelte 12 p 20 Hooge Vuursche Blauwe Koepel (onzeker) 6 p 25 Maarn - 6 p 37 De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
Cystoderma cinnabarinum (Alb et Schw ex Secr) Fayod *(Lepiota cinnabarina)*: Gorssel, 't Joppe" - 12, p. 20; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Paterswolde De Braak (vermoedelijk nadere informatie) 7 p 34.
Cystoderma granulosum (Batsch ex Fr) Fayod var adnatifolium (Peck) Smith et Sing. *(Lepiota adnatifolia)*: vindpl. niet meer bekend (nadere informatie) - 9, p. 51.
Cytidia flocculenta (Fr.) v.H. et L. *(Cyphella ampla)*: voorkomen op dode populierentakken - 9, p 55*-56; 19, p 24 duinen A'damse Waterleiding - 5 p 41 Vogelenzang A.W.duinen (nadere informatie) 9, p. 56; Voorne, duinen bij Rockanje - 19, p. 24.
Dactylaria brochopaga: zie Dactylella brochopaga.
Dactylella brochopaga (Drechsler) Drechsler *(Dactylaria brochopaga)*: Nematode-vangend apparaat - 17, p. 59*
Dactylella ellipsospora (Preuss) Grove: Nematode-vangend apparaat - 17, p. 59*.
Daedalea biennis: zie Heteroporus biennis.
Daedalea poetschii: zie Gloeophyllum trabeum.
Daedalea quercina (L ex) Fr.: verschil t.o. Trametes gibbosa - 8, p. 41*; voorkomen op eiken dwarsliggers - 6, p 44 omgev Aalst - 14, p, 60; Wekerom-Harskamp (nadere informatie) - 18, p. 34.
Daedaleopsis confragosa (Bolt, ex Fr.) Schroet.: habitustekening - 10, p. 10.
Daedaleopsis confragosa (Bolt, ex Fr.) Schroet f. rubescens (Alb. et Schw ex Fr.) Donk: omgev. Tilburg - 11, p. 62.
Daldinia concentrica (Bolt ex Fr.) Ces. et De Not.: beschrijving & afb, - 16, p 5-6 verschil t.o. Daldinia vernicosa - 16, p. 5, diverse waardplanten - 16 p. 5; Bennekom - 19, p. 23; Epen - 17 p 64, Heemstede 16 p 4 Heeze-Someren Beuven - 17, p. 64; Oisterwijk Campinaheide 19 p 64; Rijswijk, Rijswijkse bos - 16, p. 4; omgev. Valkenswaard - 3, p. 48; Wormerveer - 16, p. 4.
Daldinia vernicosa (Schw.) Ces et De Not. verschil t.o Daldinia concentrica - 16, p. 5.
Darluca filum (Biv.) Cast. parasiet op Puccinia magnusiana - 20, p ,51*; Wageningen, Grift - 20, p. 51.
Deconica bullacea (Bull ex Fr) Karst *(Psilocybe bullacea)*: De Steeg "Middachten" - 8, p. 40.

Deconica coprophila (Bull. ex Fr.) Karst. *(Psilocybe coprophila)*: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30,40.
Deconica crobula (Fr.) Romagn. *(Naucoria crobula)*: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7-8.
Deconica physaloides (Bull. ex Fr.) Karst. *(Psilocybe physaloides)*: Domburg (nadere informatie) - 8, p. 29; Ginneken - 12, p. 47; Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 93; Oostkapelle (nadere informatie) - 8, p. 29.
Delicatula(?) gibba (Alb. et Schw. ex) Pat. *(Omphalia gibba)*: Naardermeer (nadere informatie) - 18, p. 3.
Delicatula integrella (Pers. ex Fr.) Pat. *(Omphalia integrella)*: Breukelen, Weersloot - 19, p. 23; Mook, Plasmolen, Hellekuil (nadere informatie): - 18, p. 3.
Dermocybe: subgenus van Cortinarius.
Desmazierella acicola Lib.: korte beschrijving - 19, p. 32; conidiale stadium is Verticicladium cf. acuum Oudem. - 19, p. 34-35; omgev. Eindhoven - 17, p. 35; 19, p. 64 (nadere informatie); Gilze (nadere informatie) - 19, p. 64; Hatert, Hatertse vennen - 12, p. 75; 13, p. 34; 19, p. 32; Nunhem (nadere informatie) - 19, p. 64; Oirschot - 19, p. 32; Overasselt - 14, p. 52; Overasselt, "Diervoort" - 12, p. 74; 13, p. 38. Rhenen - 12, p. 74; 19, p. 32; Tegelen - 13, p. 34; 19, p. 32; Veere - 12, p. 74; 19, p. 32; Venraay - 13, p. 34; 19, p. 32; Wageningen - 19, p. 32.
Dichomyces princeps Thaxter habitustekeningen - 12 p. 77, 14, p. 58.
Dichomyces vulgatus Thaxter: habitustekening - 14, p. 58.
Dictyolus lobatus (Pers. ex Fr.) Quel. Overasselt - 10 p. 37. vindplaats onbekend, nieuw voor de flora - 6, p. 7.
Dictyolus retirugus (Bull. ex Fr.) Quél. 's-Gravenhage duinstreek - 13 p. 14; Staverden (onzeker) - 13, p. 14.
Dictyophora duplicata (Bosc) Ed. Fischer beschrijving - 10 p. 48-49*; 11, p. 46; ontwikkeling in ei-stadium - 11, p. 49-53; Bergen (vrij onzeker) - 11, p. 34; 's-Gravenhage - 11, p. 33, 34; 's-Gravenhage, omgev. "Clingendaal" - 11, p. 46; Loosduinen, "Ockenburg" - 11, p. 8-9*, 32; IJmuiden, 1e sluis (vrij zeker) - 11, p. 33-34.
Discina radiculata var. *percevali*: zie Sarcoscypha radiculata var percevalii.
Discina venosa: zie Disciotis venosa.
Discina venosa var. *reticulata*: ouderdomsvorm van Disciotis venosa.
Disciotis venosa (Pers. ex Fr.) Boud. *(Discina venosa* en var. *reticulata)* Gronsveld, Schöne Grub - 20 p. 1*; Oosterhout, "Oosterhout" - 11, p. 43; 13, p. 42; Valkenburg, Sibbergroeve - 13, p. 34.
Disciseda bovista (Klotsch) Kambly *(Disciseda cervina)*: beschrijving & afb

· 10, p. 56-57; Wassenaar, Meiendel - 10, p. 55; 18, p. 8*-9; Wassenaar Meiendel Kijfhoek - 18 p. 9 Wassenaar, "Voor-Linden - 18, p. 9. 76.

Disciceda cervina: zie Disciceda bovista.

Dochmiopus variabilis (Pers ex Fr.) Pat. *(Claudopus variabilis)* verschil t.o. Pleurotus mitis - 5, p. 73; Tilburg - 11, p. 62.

Dothidella uimi (Duv.) Wint. ascospore vorm van Piggotia astroidea - 19, p. 9*.

Drosella irrorata (Quél.) Kühner et Maire *(Lepiota irrorata)* Deventer - Lochem, omgev. "'t Joppe" - 7, p. 23; Gorssel - 9, p. 51; Oostkapelle, "Westhoven" - 5, p. 31; 8, p. 29 (nadere informatie); 9, p. 51 (nadere informatie).

Dryodon erinaceus: zie Hericium erinaceum.

Eccilia cancrina (Fr.) Ricken *(Rhodophyllus cancrinus)* beschrijving - 20, p. 69-70; Zuid-Beveland, Kaloot - 20, p. 69 Zwolle Spoolderpark - 20, p. 69.

Eccilia carneo-alba (With. ex Fr.) Ricken: Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39; 20, p. 47; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28.

Eccilia griseo-rubella (Lasch) Quél. Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Rotterdam, Kralingerhout - 16, p. 18.

Eccilia nigella Quél. (N.B. nigrella is onjuiste verandering) *(Rhodophyllus nigellus)*: beschrijving & afb. - 8, p. 13-14; Middelburg," Veldzicht" - 8, p. 13.

Eccilia rhodocylix (Lasch) Gill. *(Rhodophyllus rhodocylix;* N.B. rhodocalyx is een verschrijving) Apeldoorn, Berg en Bosch - 12 p. 4 Assen, Asser bos - 13, p. 6-7*; Olterterp - 6, p. 38.

Eccilia undata (Fr.) Big. et Guill. *(Rhodophyllus undatus)* - Oostkapelle, "Berkenbosch" - 8, p. 14*; 8, p. 29 (nadere informatie)

Eccilia vilis (Fr.) Ricken *(Rhodophyllus vilis)* Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 55; Lunteren - 14, p. 66.

Elaphomyces cervinus: zie Elaphomyces leucocarpus.

Elaphomyces granulatus: zie Elaphomyces leucocarpus.

Elaphomyces leucocarpus Vitt. *(Elaphomyces cervinus E. granulatus)* gastheer van Cordyceps capitata - 16 p. 46 gastheer van Cordyceps ophioglossoides - 1, p. 62; 6, p. 85; Bloemendaal, "Wildhoef" - 1, p. 62; omgev. Eindhoven - 15, p 32 Eindhoven Oirschotse dijk - 17, p 54 Norg - 16, p. 46; Oisterwijk, vennengebied - 7, p. 47.

Elaphomyces muricatus: zie Elaphomyces variegatus.

Elaphomyces variegatus Vitt *(Elaphomyces muricatus)*: gastheer van Cordyceps capitata - 16, p. 46, gastheer van Cordyceps ophioglossoides - 2, p. 45; 6, p. 85; Dwingelo - 16, p. 46; Ulvenhout - 2, p. 45.

Empusa muscae: zie Entomophtora muscae.

Empusa spec.: habitus en microscop. tekeningen - 10, p. 58.

Entoloma ameides (Berk. en Br.) Sacc.: Bergen - 7, p. 56; omgev. Hilversum - 9, p. 44.
Entoloma clypeatum (L. ex Fr.) Quél.: Aerdenhout - 5, p. 18; Amsterdam, Hortus Botanicus - 17, p. 25; Bloemendaal, Kraantjelek - 17, p. 25; omgev. Haarlem - 5, p. 18, 93, Hooge Vuursche, Blauwe Koepel - 6, p. 25; Wassenaar, Meiendel - 12, p. 79.
Entoloma costatum (Fr.) Gill.: Loosduinen, Kleiweg (nadere informatie) - 6, p. 68.
Entoloma jubatum (Fr.) Karst. *(Rhodophyllus jubatus)*: Ametsfoort-Woudenberg, De Treek - 14, p. 54*-55.
Entoloma lividum (Bull. ex Fr.) Quél.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46; Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 56.
Entoloma nidorosum (Fr.) Quél. Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
Entoloma nitidum Quél. Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 40; Gieten - 9, p. 12; 12, p. 17; Olterterp - 6, p. 38.
Entoloma porphyrophaeum (Fr.) Karst. *(Rhodophyllus porphyrophaeus)*: Eindhoven, Kanunnekes ven - 19, p. 64.
Entoloma rhodopolium (Fr.) Quél. *(Rhodophyllus rhodopolium)*: Amsterdam Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.
Entoloma sericeum (Bull. ex Fr.) Quél. Kennemerland (Bloemendaal ?) - 4, p. 61, Hooge Vuursche, Blauwe Koepel - 6, p. 24; Wassenaar, "Duinrel" - 7, p. 78.
Entoloma speculum (Fr.) Quél.: omgev. Heeze - 8, p. 37.
Entoloma sphagneti Naveau *(Rhodophyllus sphagneti)*: beschrijving & afb. - 18, p. 51-52 (als Entoloma spec.); Hatert, Hatertse vennen - 15, p. 11 (als Entoloma spec.); ; 18, p. 34; 18, p. 51 (als Entoloma spec.); 19, p. 10.
Entomo phtora muscae (Cohn) Fresen. *(Empusa muscae)*: beschrijving & afb. - 10, p. 59-60.
Erinella nylanderi Rehm. beschrijving & afb. - 18, p. 27-28.
Euzodiomyces lathrobii Thaxter: habitustekening - 14, p. 71.
Exidia glandulosa Fr.: Amersfoort - 2, p. 12; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 32; Wassenaar, Meiendel - 2, p. 66.
Exidia saccharina Fr. *(Ulocolla saccharina)*. Zeist, Zeister bos - 6, p. 57.
Exidia truncata Fr.: Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 6, p. 22.
Fistulina hepatica (Huds. ex) Fr. histologie & afb. 8, p 58-63 invloed op kernhout van eiken - 10, p. 19-21 omgev. Amersfoort - 2, p. 11; 's-Gravenhage "Clingendaal" - 11, p. 65; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 78.
Flammula astragalina (Fr.) Quél.: Anloo (nadere informatie) - 7, p. 34; Olterterp - 6, p. 38; omgev. Oosterwolde - 5, p. 41.

Flammula carbonaria (Fr.) Quél.: veldkenmerk splijting van lamel - 13, p. 38; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7; Epse, Epser bos - 7, p. 9, 22; 10, p. 41; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; Haren, Hortus Bot. - 10, p. 39; Heeze (nadere informatie) - 17, p. 45; Hilversum, Spanderswoud - 7, p. 35; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Valkenswaard, Beuven en visvijvers (nadere informatie) - 17, p. 45 Wassenaar Meindel - 13, p. 15

Flammula conissans (Fr.) Gill.: Amerongen - 7, p. 35.

Flammula flavida (Schaeff. ex Fr.) Quél. Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Delden, "Twickel" - 9, p. 18-19*; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.

Flammula fulgens (Favre et Maire) Kühner *(Naucoria fulgens)* beschrijving - 19, p. 63; Eindhoven, Kanunnekesven - 19, p. 64; Hatert, Hatertse vennen - 10, p. 63, 11 p. 43

Flammula gummosa (Lasch) Quél.: verschil t.o. Flammula ochrochlora - 2 p. 52 Amsterdam Vondelpark - 7 p. 60 Amsterdam Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Ter Apel - 2, p. 52; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 6, p. 22; Olterterp - 6 p. 38; Paterswolde 'De Braak' (vermoedelijk nadere informatie) - 7, p. 34; Rijswijk - 9, p. 46; omgev. Winterswijk - 11, p. 17.

Flammula gymnopodia (Bull. ex Fr.) Quél.: omgev. Amersfoort 11 p. 18.

Flammula henningsii Bres. beschrijving & afb. 19 p. 30-31 oecologische gegevens - 19, p. 31, omgev. Eindhoven - 19, p. 31; Eindhoven Kanunnekesven - 19, p. 63; Vinkeveen, Botshol (vermoedelijk) - 19, p. 31.

Flammula hybrida (Fr. ex Fr.) Gill.: Texel, staatsbossen - 6, p. 55 Wassenaar, Meiendel - 5, p. 87.

Flammula lenta (Pers. ex Fr.) Gill.: Delden, "Twickel" - 5, p. 41; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; Olterterp - 6, p. 38; omgev. Oosterwolde - 5, p. 41; Roermond, 'Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23; Wassenaar, "Rust en Vreugd" - 7, p. 35.

Flammula liquiritiae (Pers. ex Fr.) Quél. habitustekening - 10, p. 22

Flammula lubrica (Pers. ex Fr.) Quél. (non Ricken, nec Bres. = F. lenta): Epse, Epser bos (onzeker) - 10, p. 41.

Flammula lupina (Fr.) Ricken: Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.

Flammula muricella (Fr.) Quél. *(?Naucoria pityrodes)*: Geldermalsen - 10, p. 37; 18, p. 3.

Flammula ochrochlora (Fr.) Sacc. beschrijving - 2, p. 52; Verschil t.o. Flammula gummosa - 2, p. 52; Ter Apel - 2, p. 52.

Flammula penetrans (Fr.) Quél. sensu Lange (non Bres. = F. hybrida), Delden, "Twickel" - 5, p. 41.

Flammula sapinea (Fr.) sensu Quél.: Bilthoven, De Pan - 18, p. 7.
Flammula scamba (Fr.) Sacc.: Heelsum, omgev. Heelsumsche beek - 13, p. 19.
Flammula spumosa (Fr.) Karst.: Nijmegen, emplacement - 12, p. 30, Wassenaar (misschien Meiendel) - 1, p. 35.
Fomes annosus (Fr.) Cooke: gastheren & parasitaire invloed - 7, p. 25.
Fomes applanatus: zie Ganoderma applanatum.
Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Gill. *(Polyporus fomentarius)*: vegetatie-foto - 10, p. 33, 35; gebruik & economische betekenis - 10, p. 32-35, 45-48; sporenproductie - 10, p. 65; Eefde - 3, p. 48; 10, p. 46; De Steeg, "Middachten" - 5, p. 60; 10, p. 46; Wekerom (onjuiste determinatie, zie Ganoderma applanatum, nadere informatie) - 18, p. 34.
Fomes lucidus: zie Ganoderma lucidum.
Fomes obliquus: zie Inonotus obliquus.
Fomes pinicola (Sw. ex Fr.) Cooke *(Polyporus ungulatus)*: Delden "Twickel" - 12, p. 32; Ruurlo(?) - 12, p. 32; Utrecht, Gronekan - 12, p. 32.
Fomes robustus, duindoornvorm: zie Ochroporus robustus f. hippophaës
Fuligo septica (L.) Gmel. (Myxomycetes) Wageningen, Wageningsche berg - 5, p. 91.
Galactinia ampelina (Quél.) Boud.: Beesd, Mariënweerd - 19, p. 64; Gronsveld, Schöne Grub - 19, p. 63.
Galactinia badia (Pers. ex Fr.) Boud. *(Peziza badia)*: Anloo, Kniphorst (nadere informatie) - 6, p. 21*; omgev. Chaam - 6, p. 35; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46.
Galactinia brunneo-atra (Desmaz.) Boud. *(Peziza brunneo-atra)*: omgev. Eindhoven - 18, p. 34.
Galactinia ionella (Quél.) Boud. *(? Peziza gerardi* Cooke): Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 56; 12, p. 43.
Galactinia limosa (Grelet) Le Gal et Romagn.: Best - 19, p. 64; Geldermalsen - 18, p. 4.
Galactinia plebeia Le Gal: Doetinchem, "Slangenburg" - 15, p. 11; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.
Galactinia praetervisa (Bres.) Boud. *(Aleuria praetervisa)*: Epse, Epser bos - 7, p. 56.
Galactinia succosella Le Gal et Romagn.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.
Gallen: afb. 15, p. 31; schimmel in inwendige - 18, p. 32.
Galera graminea: zie Galerina graminea.
Galera hypnorum: zie Galerina hypnorum.
Galera hypnorum f. *calyptrospora*: zie Galerina hypnorum f. calyptrospora.
Galera lateritia: zie Conocybe lateritia.
Galera mycenopsis: zie Galerina mycenopsis.
Galera paludosa: zie Galerina paludosa.

Galera pygmaeo-affinis waarschijnlijk is alles wat als zodanig werd ge determineerd Conocybe rickenii
Galera ravida. zie Conocybe appendiculata
Galera spartea; zie Conocybe spartea.
Galera sphagnorum: zie Galerina sphagnorum
Galera spicula: zie Conocybe spicula.
Galera tenera vermoedelijk bedoeld sensu Ricken zie Conocybe pubescens
Galera vittaeformis: zie Galerina rubiginosa
Galerina camerina (Fr sensu Quél) Kühner (of beter Galerina pseudo camerina Sing ?) verschil t o Galera hypnorum 13 p 6 7* Assen, Asser bosch - 13. p. 6.
Galerina graminea (Vel) Kühner *(Galera graminea)* Renkum "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47
Galerina hypnorum (Schrank ex Fr.) Kühner *(Galera hypnorum)* verschil t o Galera vittaeformis 6 p 65 verschil t o. Galerina camerina 13, p. 6-7; omgev. Maarsbergen - 17 p. 25.
Galerina hypnorum (Schrank ex Fr) Kühner f calyptrospora (Kühner) Kühner *(Galera hypnorum* f *calyptrospora)* omgev Wijster biol. station - 12, p. 60
Galerina marginata (Batsch ex Fr) Kühner *(Pholiota marginata)* beschrijving & afb. - 12, p. 28-30 Gorssel, "'t Amelte" - 12 p. 20; Mook, 11, p. 40.
Galerina muricellospora (Atk.) Kühner (2-sporige vorm van Galerina rubiginosa?); Overasselt - 10, p 37.
Galerina mycenoides (Fr sensu Jaap) Kühner *(Pholiota mycenoides)* Beugen, kruispunt - 9, p. 39; omgev. Eindhoven - 19, p. 64; Epse, Epserbos - 10, p. 41 Hondsrug (waar?) - 6, p. 6-7; omgev. Wijster, biol. station - 12 p. 59
Galerina mycenopsis (Fr sensu Ricken) Kühner *(Galera mycenopsis)* Renkum "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.
Galerina nana (Petri) Kühner microscop kenmerken & afb 13 p 31-32 Baarn, "Groeneveld" - 13. p. 31-32 Hengelo, kas (nadere informatie) 13. p 38; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9. p. 39; 20, p. 47.
Galerina paludosa (Fr) Kühner *(Galera paludosa)* omgev. Krommenie (onzeker, nadere informatie) - 17 p. 43. omgev. Wijster - 12, p. 10
Galerina rubiginosa (Pers ex Fr) Kühner *(Galera vittaeformis* sensu Ricken) beschrijving & afb 6 p 64-66. verschil t o Galera pygmaeo affinis tenera spicula spartea hypnorum 6 p. 65 Gasselte, Drouwenerzand - 6, p. 64
Galerina sphagnorum (Pers ex Fr. sensu Atk) Kühner *(Galera sphagnorum)*: Heelsum omgev Heelsumsche beek 13 p. 19 omgev Krommenie (onzeker, nadere informatie) - 17, p. 43.

Galerina stagnina (Fr.) Kühner: Assel - 10, p. 37.
Galerina tibicystis (Atk.) Kühner: omgev. Wijster - 12, p. 9.
Galerina uncialis (Britz.) Kühner: Oosterhout - 10, p. 37.
Galerina unicolor (Vahl ex Fr.) Sing. (*Pholiota unicolor*): Texel staats bossen - 7, p. 49
Ganoderma applanatum (Pers. ex Wahlr.) Pat. (*Polyporus applanatus*) ve getatiefoto - 10, p. 47; sporenproductie - 10, p. 65; Aerdenhout "Naaldenveld" - 6, p. 38; Heere, Kasteellaan - 14, p. 33, Ruurlo "Kleine Meene" - 12, p. 76; Wekerom (foutief als Fomes fomentarius nadere informatie) - 18, p. 34.
Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. (*Polyporus lucidus*) Ruurlo, "Kleine Meene" - 12, p. 76; Tilburg - 11, p. 62
Ganoderma resinaceum Boud.: beschrijving & afb. 16 p. 32 33. Nigte vecht - 16, p. 32.
Gautieria graveolens Vitt. Baarn "Pijnenburg" 18, p. 47 omgev. Bilt hoven - 10, p. 40
Geaster: zie Geastrum.
Geaster hygrometricus: zie Astraeus hygrometricus.
Geastrum badium Pers.: Wassenaar Meiendel - 10, p. 55.
Geastrum coronatum Pers.: verschil t.o. Geastrum schaefferi - 12 p. 11 12; oecologie - 6, p. 86; Amsterdam, Tuindorp - Watergraafsmeer - 12 p. 78
Geastrum minimum Schw. (non Chev.): Oecologie - 6, p. 86, Kennemerland (Bloemendaal?) - 4 p. 61; Terschelling omgev. Hoorn - 20, p. 18.
Geastrum nanum Pers. afwijking met 2 peristomen - 14 p. 49 afwijking met triplex-kraag - 7, p. 57*; Huizen haven - 10, p. 40; omgev. Oisterwijk - 11, p. 62. Vogelenzang - 5 p. 67; Vogelenzang, A.W. duinen 7 p. 57; Wassenaar, Meiendel - 10, p. 55; Wassenaar, Meiendel Kijfhoek - 14, p. 49.
Geastrum pectinatum Pers.: oecologie - 6 p. 86.
Geastrum quadrifidum Pers.: oecologie - 6, p. 86
Geastrum rufescens Pers. oecologie - 6 p. 86 afwijking met pseudo peristomen - 7, p. 57*-58; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; Voorne, duinen Rockanje - 19, p. 24; Wijk aan Zee, "Rooswijk" - 7, p. 57.
Geastrum saccatum Fr.: oecologie - 6 p. 86; Aerdenhout - 4 p. 47; Vogelenzang - 4, p. 47, 5, p. 67.
Geastrum schaefferi Vitt. verschil t.o. Geastrum coronatum en G. triplex - 12 p. 11-12; Bergen - 12, p. 11
Geastrum striatum D.C. oecologie 6 p. 86 Amsterdam Kruislaan, Tuindorp Watergraafsmeer Zuidelijke Wandelweg 12 p. 78, omgev. Haarlem, duinen 6 p. 86 Nieuwer Amstel 12 p. 78 Voorne, duinen Rockanje - 19, p. 24

Geastrum triplex Jungh.: maten en bijzonderheden - 6, p. 12; verschil t o. Geastrum schaefferi - 12, p. 11; oecologie - 6, p. 86; afwijking met dubbel peristoom - 7, p. 7-8*, afwijking met langwerpig peristoom - 11, p. 26; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 11, p. 26; Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats, Tuindorp-Watergraafsmeer, Zuidelijke Wandelweg - 12, p. 78; Amsterdamse Waterleidingduinen - 6, p. 12; 7, p. 7; Bilthoven, Panbos - 19, p. 23; Haarlem, duinen - 7, p. 8; Nieuwer Amstel - 12, p. 78; Olterterp - 6, p. 38, 56; 7, p. 35; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 41; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; Vogelenzang - 5, p. 67; 10, p. 24; Voorne, duinen Rockanje - 19, p. 24.

Geoglossum affine (Dur.) Lloyd *(Gloeoglossum affine)*: beschrijving & afb. - 20, p. 68-69; Hatert, "Diervoort" - 19, p. 18 (als Geoglossum spec.); 20, p. 68.

Geoglossum cookeianum Nannf.: abusievelijk gebruikt: G. ophioglossoides is synoniem van G. glabrum, niet van G. cookeinanum - 20, p. 67.

Geoglossum glabrum Pers. ex Fr. *(Geoglossum ophioglossoides)*: verschil t o. Cordyceps ophioglossoides - 6, p. 84*-85; Eindhoven - 7, p. 46; omgev. Eindhoven - 15, p. 32; Gasselte - 6, p. 84; Gorssel, "'t Amelte" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hatert - 19, p. 18; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18; Naardermeer - 12, p. 39.

Geoglossum glutinosum Pers. ex Fr.: Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hatert - 19, p. 18; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.

Geoglossum hirsutum: zie Trichoglossum hirsutum.

Geoglossum ophioglossoides: zie Geoglossum glabrum.

Geoglossum viride: zie Microglossum viride.

Geoglossum spec.: blijkt te zijn Geoglossum affine - 19, p. 18; 20, p. 68-69.

Geopyxis ammophila (Dur. et Lév.) Sacc.: beschrijving & afb. - 5, p. 64-65; Egmond aan Zee - 5, p. 64; Noord-Oostpolder - 18, p. 34; Texel, De Koog - 5, p. 64; Voorne, duinen Rockanje - 19, p. 24; Wassenaar, Meiendel - 5, p. 64; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 9.

Geopyxis carbonaria (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Epse, Epser bos - 7, p. 10, 22.

Geopyxis cupularis (L. ex Fr.) Sacc.: omgev. Rijswijk (onzeker) - 11, p. 25.

Gloeoglossum affine: zie Geoglossum affine.

Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex Fr.) Karst. *(Lenzites sepiaria)*: Nieuw-Beerta - 6, p. 32; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.

Gloeophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murr. *(Daedalea poetschii)*: Kootwijk - 9, p. 39.

Gomphidius glutinosus (Schaeff. ex Fr.) Fr.: Dwingelo (nadere informatie)

- 16, p. 46; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; omgev. Rijssen - 12, p. 14; Wassenaar, "Raaphorst" - 11, p. 65; Wouwsche Plantage - 1, p. 53.

Gomphidius roseus (Fr.) Karst.: groeiwijze - 3, p. 79; associatie met Boletus bovinus - 3, p. 79; 5, p. 60; omgev. Amersfoort - 3, p. 79; Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Baarn, "Buitenzorg" - 6, p. 24. Bergen-Schoorl - 5, p. 60; 9, p. 29; Borger - 6, p. 88*-89; omgev. Bussum - 5, p. 40; omgev. Chaam - 6, p. 35; Lheebroek, Lheebroekerzand (nadere informatie) - 16, p. 46; Lunteren-Ede - 12, p. 31; Maarn - 6, p. 37; omgev. Rijssen - 12, p. 14; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.

Gomphidius rutilus (Schaeff. ex Fr.) Lundell et Nannf. *(Gomphidius viscidus)*: Gorssel, "'t Amelte" - 12, p. 20; omgev. Rijssen - 12, p. 14.

Gomphidius viscidus: zie Gomphidius rutilus

Graphium ulmi Schwartz: ongeslachtelijke vorm van Ceratostomella ulmi - 3, p. 77-78.

Gyrodon lividus (Bull. ex Fr.) Sacc.: diagnose - 18, p. 18; Best-19, p. 63.

Gyromitra esculenta (Pers. ex Fr.) Fr. *(Helvella esculenta)*: verschil t.o. Gyromitra gigas - 5, p. 91; omgev. Deventer - 12, p. 75; Diepenveen - 12, p. 75; Nunhem (nadere informatie) - 17, p. 44; Nunhem, Leubeek - 15, p. 31.

Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke: verschil t.o. Gyromitra esculenta - 5, p. 91; Vogelenzang, duinen - 5, p. 91, 93.

Gyromitra infula (Schaeff. ex Fr.) Quél. *(Helvella infula)*: habitusteke ning & microscop. gegevens - 14, p. 64-65; Amersfoort - 14, p. 66; Bilthoven - 14, p. 66; Eindhoven, puinstort - 19, p. 64; Zwolle - 14, p. 66.

Gyrophana lacrymans (Wulf. ex Fr.) Pat. *(Merulius domesticus, Merulius lacrymans)* mycelium op anthraciet - 11 p. 11* Amsterdam, turngebouw - 5, p. 94*; Rijswijk (Mycelium) - 16, p. 23*

Gyroporus castaneus (Bull. ex Fr.) Quél. *(Boletus Suillus castaneus)*: diagnose - 18, p. 18; Bathmen, "Bannink" - 7, p. 77, Bergen-Schoorl 9, p. 29; Chaam - 6, p. 35; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; vorige vondst herroepen - 5, p. 59; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 6, p. 38; Vogelenzang - 5, p. 66.

Gyroporus cyanescens (Bull. ex Fr.) Quél. *(Boletus Suillus cyanescens)* diagnose - 18, p. 18; omgev. De Bilt - 6, p. 40; Bloemendaal - 4, p. 25 Doorn-Maarn - 19, p. 11; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; omgev. Haarlem (Bloemendaal?) - 6, p. 12; omgev. Rijswijk - 11, p. 25 De Vuursche - 13, p. 10.

Hapalopilus nidulans (Fr.) Karst *(Phaeolus, Polyporus rutilans)*: Best - 19, p. 63; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13.

Hapalopilus schweinitzii (Fr.) Donk *(Polyporus schweinitzii)* omgev. Baarn - 14, p. 77; Beekhuizen - 5, p. 40; Bilthoven, De Pan - 18, p. 7; omgev. Chaam - 6, p. 34; Roermond "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.

Hebeloma anthracophilum Maire *(Hebeloma punctatum* sensu Ricken, non Fr.) Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 8, p. 67; Epse, Epser bos of Gorssel, 't Hassink" - 12, p. 20.

Hebeloma crustuliniforme (Bull. ex Fr.) Quél. teratologicum - 4, p. 52*; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 8, p. 67.

Hebeloma fusipes Bres.: Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.

Hebeloma longicaudum (Pers. ex Fr.) Quél. Wageningen (onzeker) - 10, p. 61.

Hebeloma punctatum sensu Ricken (non Fr.) zie Hebeloma anthracophilum.

Hebeloma radicosum (Bull. ex Fr.) Ricken *(Pholiota radicosa)* Epse, Epser bos - 10, p. 41; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 34; Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67; Ruurlo, "Medler" - 4, p. 27; De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18; omgev. Winterswijk - 11, p. 18*-19.

Hebeloma sacchariolens Quél., ongev. Acht (nadere informatie) - 19, p. 64; Eindhoven, "Eckart", Oirschotse dijk, "Wielewaal" (nadere informatie) - 19, p. 64; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77; 19, p. 67; Wageningen, omgev. Rijn - 10, p. 61; Zwolle, Engelsche Werk - 10, p. 62.

Hebeloma sinapizans (Fr.) Gill.: Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.

Hebeloma sinuosum (Fr.) Quél. Egmond aan de Hoef, De Franschman 5, p. 60; Enschede, Oldenzaalse weg (nadere informatie) - 14, p. 9.

Hebeloma subcollariatum (Berk. et Br.) Gill. Walcheren (waar?) - 5, p. 32.

Hebeloma truncatum (Fr.?) sensu Lange, beschrijving - 14, p. 56, verschil t.o. Rhodopaxillus truncatus - 14, p. 56.

Helotium ciliatosporum (Fuck.) Boud. *(Belonioscypha ciliatospora)* sporenmaten & afb. - 20, p. 11-12; Amsterdam, Bosplan - 20, p. 12; Bennekom, Diedenweg, Kraats - 20, p. 12; Doorwerth, Onderlangs - 20, p. 12; Grebbe, Kolkje - 20, p. 12; Nieuwersluis - 20, p. 12; Wageningen, Domeinweg, Dorskamp, Kleine Veer - 20, p. 12.

Helotium fagineum (Pers. ex Fr.) Fr. Oosterhout, "Oosterhout" - 15, p. 11.

Helotium fructigenum (Bull. ex Fr.) Karst. *(Peziza fructigena)* Amsterdam, Zuidelijke wandelweg 8, p. 67; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 12, p. 42.

Helotium herbarum (Pers. ex Fr.) Fr. beschrijving & afb. - 18, p. 27-28; omgev. Rijswijk - 11, p. 25*.

Helotium longisporum Schweers, Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 40; 10, p. 37; 12, p. 43; 20, p. 47; De Steeg, "Middachten" - 12, p. 43; 13, p. 34.

Helotium scutula (Pers. ex Fr.) Karst : Bennekom, Kraats - 20, p. 12; Doorwerth, "Zalmen" - 20, p. 12; Mook, Plasmolen - 20, p. 12; Renkum, "Oranje Nassau Oord" - 20, p. 12; Rhenen, station - 20, p. 12; Wageningen - 18, p. 29; Wageningen, Dorskamp - 20, p. 12.

Helvella atra König ex Fr.: Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7.

Helvella crispa (Scop. ex) Fr.: Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 39; Breda, Mastbosch - 1, p. 53; omgev. Eindhoven - 15, p. 31; omgev. Haarlem - 5, p. 18; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Tilburg - 11, p. 62; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23.

Helvella elastica Bull. ex Fr.: Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 39; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; omgev. Rijssen - 12, p. 14.

Helvella ephippium Lév.: zie Leptopodia ephippium.

Helvella esculenta: zie Gyromitra esculenta.

Helvella infula: zie Gyromitra infula.

Helvella lacunosa Afzel. ex Fr.: omgev. Eindhoven - 15, p. 31; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 13, p. 56; omgev. Haarlem - 5, p. 18; Overveen, "Elswout" - 6, p. 14.

Helvella macropus: zie Macropodia macropus.

Helvella queletii Bres.: beschrijving - 13, p. 24; Baarn-Bilthoven - 18, p. 47; Winterswijk-Bredevoort, Miste - 13, p. 24, 34.

Helvella sulcata Afzel ex Fr. (N.B. vermoedelijk identiek met en synoniem van Helvella lacunosa): Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42

Hemitrichia vesparium (Batsch) Macbr (Myxomycetes). De Steeg. "Middachten" - 8 p. 18.

Hericium coralloides (Fr.) Pers. *(Hydnum coralloides)*: omgev Chaam - 6 p. 35.

Hericium erinaceum (Bull ex Fr.) Pers. *(Dryodon erinaceus, Hydnum erinaceum)*. Baarn, Baarnse bos ('Groeneveld'?) - 6 p. 24; Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 40; 19, p. 67; De Steeg, "Middachten" - 9, p. 16

Heteroporus biennis (Bull. ex Fr.) Laz. *(Daedalea biennis, Polyporus rufescens)*: Heelsum, omgev. Heelsumsche beek - 13, p. 19; Maarn - 6, p. 37.

Hirneola auricula judae: zie Auricularia auricula-judae.

Hirschioporus abietinus (Dicks. ex Fr) Donk *(Polyporus abietinus)*: omgev Aalst - 14, p. 60.

Humaria applanata (Hedw. ex Fr.) Rehm: Mook, Plasmolen, St.Jansberg - 13 p. 34 20, p. 49.

Humaria araneosa (Bull. ex Fr.) Quél.: Amsterdam - 12, p. 24.

Humaria ithacaensis Rehm: zie Neottiella ithacaensis.

Humaria leucoloma (Hedw ex Fr.) Boud.: Epse, Epser bos 8 p. 38 Mook, Plasmolen, Groene Water - 12, p. 24; 20, p. 48; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.

Humaria leucolomoides Rehm: Bergen 12 p. 24, Hatert - 12 p. 24, Hatert, Hatertse vennen - 9, p. 40; omgev. Nijmegen - 8, p. 38.

Humaria leucomeloides: verschrijving voor Humaria leucolomoides.
Humaria macrospora (Wallr.) Fuck.: Wilp (nadere informatie) - 18, p. 34.
Humaria melalomoides: zie Lachnea intermixta.
Humaria pilifera (Cooke) Sacc. Mook, Plasmolen - 12, p. 24; 20, p. 48.
Humaria roumeguëri Karst.: Schoorl, Overval - 12, p. 24.
Humaria rutilans: zie Peziza rutilans.
Humaria subhirsuta (Schum. ex Fr.) Karst.: Hengelo - 12, p. 24.
Humaria theleboloides (Alb. et Schw. ex Fr.) Rehm *(Peziza theleboloides)*. Oosterhout, "Oosterhout" (onzeker, nadere informatie) - 8, p. 38; Walcheren, Dishoek (nadere informatie) - 12, p. 25.
Humaria tetraspora (Fuck.) Boud. *(Humarina tetraspora)*. Kootwijk - 10, p. 37; Noord-Oostpolder - 14, p. 66.
Humarina tetraspora: zie Humaria tetraspora.
Hydnellum acre (Quél.) Donk *(Hydnum acre)* omgev. Bilthoven 10, p. 39; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20.
Hydnellum ferrugineum (Fr.) Karst. *(Hydnum ferrugineum)*: Amersfoort - 2, p. 12; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; omgev. Stroe - 14, p. 63; Wolfheze, "Buunderkamp" - 6, p. 39.
Hydnellum scrobiculatum (Fr.) Karst. *(Hydnum scrobiculatum)*. Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46.
Hydnellum velutinum (Fr.) Banker *(Hydnum velutinum)*: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7.
Hydnellum zonatum (Batsch ex Fr.) Karst *(Hydnum zonatum)*: omgev. Bilthoven - 10, p. 40; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46.
Hydnotria tulasnei (Berk.) Berk et Br.: doorsnede vruchtli chaam & microscop. details - 16, p. 19; Baarn, "Groeneveld" - 13, p. 10; Eindhoven, Oirschotse dijk - 17, p. 64; 19, p. 64; omgev. Enschede - 16, p. 19.
Hydnum acre: zie Hydnellum acre.
Hydnum amicum: zie Phellodon amicus.
Hydnum auriscalpium: zie Auriscalpium vulgare.
Hydnum compactum (N.B. foute determinatie voor Hydnellum caeruleum?): Amersfoort - 2, p. 12.
Hydnum coralloides: zie Hericium coralloides.
Hydnum erinaceum: zie Hericium erinaceum.
Hydnum ferrugineo-album Britz.: omgev. Stroe - 14, p. 63.
Hydnum ferrugineum: zie Hydnellum ferrugineum.
Hydnum imbricatum: zie Sarcodon imbricatus.
Hydnum inopinatum: zie Sarcodon inopinatus.
Hydnum melaleucum: zie Phellodon melaleucus.
Hydnum molle: zie Sarcodon mollis.
Hydnum nigrum: zie Phellodon niger.

Hydnum repandum L. ex Fr.: omgev. Bilthoven - 10, p. 40; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46; 17, p. 7; omgev. Chaam - 6, p. 35; Ede, Hoekelom - 5, p. 42; Gieten - 12, p. 17.

Hydnum scabrosum: waarschijnlijk foute determinatie van Sarcodon fennicus.

Hydnum scrobiculatum: zie Hydnellum scrobiculatum.

Hydnum tomentosum: zie Phellodon tomentosus.

Hydnum velutinum: zie Hydnellum velutinum.

Hydnum zonatum: zie Hydnellum zonatum.

Hygrocybe ceracea (Wulf. ex Fr.) Karst. *(Hygrophorus ceraceus)*: omgev Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.

Hygrocybe chlorophana (Fr.) Karst. *(Hygrophorus chlorophanus)*: Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29.

Hygrocybe coccinea (Schaeff. ex Fr.) Karst. *(Hygrophorus coccineus)*: Beekhuizen - 5, p. 40; Bunnik, fort Vechten - 19, p. 23.

Hygrocybe conica (Scop. ex Fr.) Karst. *(Hygrophorus conicus)*: Amersfoort - 2, p. 12; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Beekhuizen - 5, p. 40; omgev. Bussum - 14, p. 77; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18; Markelo-Rijssen - 12, p. 14; Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29; Texel (waar?) - 6, p. 55

Hygrocybe laeta (Pers. ex Fr.) Karst. *(Hygrophorus laetus)*: Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Deventer-Lochem, omgev. "'t Joppe" - 7, p. 23; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.

Hygrocybe miniata (Scop. ex Fr.) Karst *(Hygrophorus "flammans", Hygrophorus miniatus)*: Amersfoort - 2, p. 12, Denekamp, Breklenkamp - 17, p. 43; Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.

Hygrocybe nitrata (Pers. ex Fr.) Karst. Haren, Hortus "De Wolf" - 20 p. 66.

Hygrocybe obrussea (Fr.) Karst. *(Hygrophorus obrusseus)*: omgev Bussum 14, p. 77.

Hygrocybe psittacina (Schaeff. ex Fr.) Karst. *(Hygrophorus psittacinus)* Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18; Noordbroek - 6, p. 32.

Hygrocybe turunda (Fr.) Karst *(Hygrophorus turundus)*: Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.

Hygrocybe unguinosa (Fr.) Karst. *(Hygrophorus unguinosus)*: Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.

Hygrophorus aureus: zie Hygrophorus hypothejus var. aureus.

Hygrophorus ceraceus: zie Hygrocybe ceracea.
Hygrophorus chlorophanus: zie Hygrocybe chlorophana.
Hygrophorus coccineus: zie Hygrocybe coccinea.
Hygrophorus conicus: zie Hygrocybe conica.
Hygrophorus eburneus (Bull ex Fr.) Fr. Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20, omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
Hygrophorus flammans foutief voor Hygrophorus flammeus, synoniem van Hygrocybe miniata.
Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. *(Limacium hypothejum)*: Amersfoort - 2, p. 12; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. var aureus (Arrh.) Imler *(Hygrophorus aureus)*: Heelsum, omgev. Heelsumsche beek - 13, p. 19.
Hygrophorus irrigatus: zie Camarophyllus irrigatus.
Hygrophorus laetus: zie Hygrocybe laeta.
Hygrophorus leucophaeus (Scop. ex Fr.) Gill. Mook, Plasmolen, St. Martensberg - 9, p. 39 20, p. 47.
Hygrophorus limacinus Scop ex Fr. *(Limacium limacinum)*: Wassenaar, Meiendel - 12, p. 47.
Hygrophorus miniatus: zie Hygrocybe miniata.
Hygrophorus nemoreus (Lasch) Fr.: omgev. Winterswijk ('t Woold?) - 11, p. 17.
Hygrophorus niveus: zie Camarophyllus niveus.
Hygrophorus obrusseus: zie Hygrocybe obrussea.
Hygrophorus pratensis: zie Camarophyllus pratensis.
Hygrophorus psittacinus: zie Hygrocybe psittacina.
Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr *(Limacium pudorinum)*. De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 31.
Hygrophorus pustulatus (Pers. ex Fr.) Fr. *(Limacium pustulatum)*: Oosterhout, "Oosterhout" - 9, p. 39; 13, p. 42.
Hygrophorus russocoriaceus zie Camarophyllus russocoriaceus.
Hygrophorus russula (Schaeff ex Fr.) Quél *(Tricholoma russula)* Bathmen, "Bannink" - 7, p. 24; Epse, Epser bos - 10, p. 41; Gorssel, "'t Hassink" - 7, p. 23; Winterswijk - 7, p. 23.
Hygrophorus subradiatus: zie Camarophyllus subradiatus.
Hygrophorus turundus: zie Hygrocybe turunda.
Hygrophorus unguinosus: zie Hygrocybe unguinosa.
Hygrophorus virgineus: zie Camarophyllus virgineus.
Hymenogaster tener Berk.: beschrijving - 11 p. 20, Barneveld Barneveldsche beek - 11, p. 20; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.
Hymenostilbe muscaria Petch: habitustekening - 18 p 45; Eindhoven Philipsbossen - 18, p. 45.
Hypholoma candolleanum: zie Psathyrella candolleana.

Hypholoma capnoides (Fr.) Quél.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46; omgev. Gorssel - 7, p. 46; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
Hypholoma caput-medusae: zie Psathyrella caput-medusae.
Hypholoma cascum: zie Psathyrella casca.
Hypholoma dispersum (Fr.) Quél.: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p 39; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46.
Hypholoma epixanthum (Fr.) Quél.: omgev. Lunteren - 12, p. 47; Wassenaar, Meiendel - 12, p. 47.
Hypholoma ericaeum (Pers. ex Fr. sensu Kühner) Kühner *(Psilocybe ericaea)*: standplaats - 12, p. 10; Castricum, Geversduin - 6, p. 57; omgev. Wijster - 12, p. 10.
Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Quél. Amsterdam, Sted. Museum - 7, p. 59; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; 7, p. 60; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Bloemendaal, Kraantjelek - 17, p. 25; omgev. Haarlem - 5, p. 93; Heiloo - 15, p. 32; Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 92; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; Tilburg - 11, p. 62; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30; omgev. Wageningen - 5, p. 93
Hypholoma hydrophilum: zie Psathyrella hydrophila.
Hypholoma lacrymabundum: zie Lacrymaria velutina.
Hypholoma melantinum: zie Psathyrella scobinacea.
Hypholoma pilulaeforme: zie Hypholoma piluliforme.
Hypholoma piluliforme (Bull. ex Fr.) Gill. Walcheren (waar?) - 5, p 32
Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken *(Nematoloma polytrichi)* omgev Maarn - 14, p. 77.
Hypholoma subericaeum (Fr. sensu Rea) Kühner: Best - 19, p. 63.
Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél. Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Bloemendaal - 5, p. 93; Ede (nadere informatie) - 18, p. 35; omgev. Haarlem - 5, p. 93; Rijswijk - 9, p. 46; Tilburg - 11, p. 62; Wageningen Haagsteeg (abnormaal exemplaar) - 8, p. 34*.
Hypomyces chrysospermus (Bull. ex Fr.) Tul. perithecieënvorm van Sepedonium chrysospernum - 12, p. 41.
Hypoxylon ferrugineum Otth.: Nieuwersluis, "Over-Holland" - 6 p 39; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29-30.
Inocybe abjecta: zie Inocybe flocculosa var. abjecta.
Inocybe acuta: zie Inocybe umbòninota.
Inocybe ammophila: zie Inocybe serotina.
Inocybe armoricana Heim: Bilthoven - 7, p. 6; Winterswijk - 7, p. 6
Inocybe asterospora Quél. Egmond aan de Hoef De Franschman - 5 p 60; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25-26. Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42
Inocybe bongardii sensu Cooke (non Heim nec Konr et Maubl.) (N.B. dubieuze soort): De Bilt, "Noord Houdringe" - 7, p. 6

Inocybe bongardii (Weinm.) Quél. sensu Heim: Doetinchem, 'Slangenburg' - 7, p. 55; Loenen - 7, p. 6; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 18, p. 46.
Inocybe bongardii var. *cervicolor*: zie Inocybe cervicolor.
Inocybe brunneo-atra: zie Inocybe descissa var. brunneo-atra.
Inocybe caesariata (Fr.) Karst. (*Inocybe delecta* Lange). Groesbeek - 14, p. 66; De Vuursche, "Pijnenburg" - 13, p. 10.
Inocybe calospora Quél. Bergeyk (nadere informatie) - 17, p. 45. Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.
Inocybe carpta (Scop. ex Fr.) Sacc. sensu Massee. Quél. (non Bres., nec Ricken): Hatert - 13, p. 34.
Inocybe casimiri Vel. (*Inocybe lanuginosa* var. *casimiri*): Bilthoven (nadere informatie) - 7, p. 6; Walcheren, Oostkapelle (nadere informatie) - 7, p. 6; Wouw (nadere informatie) - 7, p. 6.
Inocybe cervicolor (Pers. ex Quél.) Karst. (*Inocybe bongardii* var. *cervicolor*): Hengelo - 7, p. 6.
Inocybe cicatricata Ell. et Everh. (N.B. waarschijnlijk synoniem met Inocybe rennyi (Berk. et Br.) Sacc.): Hengelo - 7, p. 6; Venraay, Oostrum - 14, p. 66.
Inocybe confusa Karst. sensu Heim: Bergen - 7, p. 6.
Inocybe cookei Bres. (langstelige vorm): Alkmaar - 7, p. 6: Lonneker, Smalenbroek - 7, p. 6.
Inocybe corydalina Quél. omgev. Alkmaar (nadere informatie) - 7, p. 6.
Inocybe corydalina Quél. f. albidula (Britz.) Heim: Nieuwersluis, "Over-Holland" - 18, p. 46; omgev. Zeist (nadere informatie) - 7, p. 6.
Inocybe decipiens Bres. Bergen, duinen - 2, p. 64: Schoorl, staatsstereinen - 3, p. 66; IJmuiden, Heerenduin - 11, p. 20.
Inocybe deglubens (Fr.) Gill. var. trivialis Karst. (N.B. waarschijnlijk identiek met Inocybe deglubens) De Bilt, 'Noord Houdringe' - 7, p. 6
Inocybe delecta Lange: zie Inocybe caesariata.
Inocybe descissa (Fr.) Quél.: Bergeyk (nadere informatie) - 17, p. 45.
Inocybe descissa (Fr.) Quél. var. auricoma (Batsch ex Fr.) Heim. Doetinchem, "Slangenburg" (onzeker) - 7, p. 55.
Inocybe descissa (Fr.) Quél. var. brunneo-atra Heim: omgev. Doetinchem (nadere informatie) - 7, p. 6; omgev. Enschede (nadere informatie) - 7, p. 6.
Inocybe destricta: vorm van Inocybe jurana.
Inocybe dulcamara (Alb. et Schw. ex Fr.) Quél. (*Inocybe malençoni*): Ulvenhout - 7, p. 6.
Inocybe echinata: zie Lepiota echinata.
Inocybe eutheles (Berk. et Br.) Sacc.: IJmuiden, Heerenduin - 11, p. 20.
Inocybe eutheles (Berk. et Br.) Sacc. var. pallidipes (Ell. et Everh.) Heim (*Inocybe pallidipes*): kenmerken & afb. - 13, p. 44, 46; Ensche-

de (nadere informatie) - 13, p. 44, Oosterhout, "Oosterhout" - 13 p 42.
Inocybe fastigiata (Schaeff ex Fr) Quél Bilthoven Panbos 19 p 23; Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28; Utrecht, "Rhijnauwen" - 7, p. 7
Inocybe fastigiata (Schaeff ex Fr.) Quél f arenicola Heim Bergen duinen - 7, p. 6.
Inocybe fastigiata (Schaeff. ex Fr.) Quél var curreyi (Berk) Heim U trecht. Maliebaan - 7, p. 6.
Inocybe fastigiata var. *squamata*: zie Inocybe squamata.
Inocybe fastigiata (Schaeff. ex Fr.) Quél. var umbrinella (Bres) Heim Walcheren (geen nadere vindpl. bekend, nadere informatie) - 7, p. 6
Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc var abjecta (Karst.) Heim (*Inocybe abjecta*): Denekamp, Borchbosch - 14, p. 66.
Inocybe frumentacea: zie Inocybe jurana
Inocybe fulvida Bres. (N B. waarschijnlijk identiek met Inocybe queletii) beschrijving & afb. - 15, p. 2-3; Oosterhout, "Oosterhout" - 14,p. 66 15, p. 2.
Inocybe gaillardii Gill. Delden, "Twickel" - 9 p. 18; Doetinchem, "Slangenburg" - 11, p. 43
Inocybe geophylla (Sow. ex Fr.) Quél. Nieuwersluis "Over Holland" - 13 p. 12.
Inocybe globocystis Vel. Bilthoven (nadere informatie) 7 p. 6 Doetinchem (nadere informatie) - 7, p. 6; omgev. Enschede - 14, p. 51; Walcheren, Oostkapelle (nadere informatie) - 7, p. 6; Wouw - 7, p. 6.
Inocybe halophila Heim Bergen - 7 p 6 Lonneker Smalenbroek 7 p 6
Inocybe hirsuta (Lach) Quél.: Delden, "Twickel" - 9, p. 18
Inocybe inconcinna Karst.: De Bilt, "Noord Houdringe" - 7, p. 6.
Inocybe jurana (Pat.) Sacc (met als vormen *Inocybe destricta, frumentacea, rhodiola*): habitustekening & microscop. details (*rhodiola*) 13, p. 12; Delden, "Twickel" (*destricta*) - 5, p. 59; Nieuwersluis "Over Holland" (*rhodiola*) - 13, p. 12; Oostkapelle "Zeeduin" (*frumentacea*, nadere informatie) - 8, p. 28 Walcheren (*jurana*; waar?) - 5, p. 31; Walcheren (*frumentacea*; waar?) - 8, p. 29
Inocybe lacera (Fr.) Quél omgev Eindhoven (nadere informatie) 17 p. 45 omgev. Maarsbergen - 17, p. 25-26.
Inocybe langei Heim De Bilt, Noord Houdringe 7 p. 6. Eindhoven Philipsbossen - 17, p. 7.
Inocybe lanuginosa sensu Heim verzamelsoort misschien bedoeld Inocybe ovatocystis
Inocybe lanuginosa var. *casimiri*: zie Inocybe casimiri.
Inocybe lucifuga (Fr ex Fr.) Quél kenmerken & afb. 13, p 45-46. Amersfoort (nadere informatie) 13 p. 45 omgev. Bussum 14 p 77

Inocybe maculata Boud.: Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
Inocybe malençoni: zie Inocybe dulcamara.
Inocybe margaritispora (Berk.) Sacc.: Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Utrecht, "Rhijnauwen" - 7, p. 7.
Inocybe maritima (Fr.) Karst.: IJmuiden, Heerenduin - 11, p. 20.
Inocybe mixtilis: zie Inocybe praetervisa var. mixtilis.
Inocybe mucronata Heim: Delden - 7, p. 7.
Inocybe napipes Lange: verschil t.o. Inocybe acuta, umbrina - 8, p. 54-55*; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25-26.
Inocybe obscura (Pers. ex Fr.) Gill.: Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28.
Inocybe ovatocystis Bours. et Kühner *(Inocybe lanuginosa* sensu Heim): Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66; Wassenaar, "Raaphorst" - 15, p. 5.
Inocybe pallidipes: zie Inocybe eutheles var. pallidipes.
Inocybe pannosa (Fr.) Quél.: de Bilt, "Noord Houdringe" - 7, p. 7.
Inocybe patouillardii Bres.: 's-Gravenhage, Haagsche Bosch - 12, p. 79.
Inocybe perlata (Cooke) Sacc.: omgev. Amersfoort (niet zeker) - 13, p. 8.
Inocybe petiginosa (Fr.) Gill.: Bunnik, fort Vechten (onzeker) - 19, p. 23; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.
Inocybe posterula (Britz.) Sacc. sensu Lange: De Bilt (nadere informatie) - 7, p. 7; Heeze (nadere informatie) - 7, p. 7.
Inocybe poujolii Heim: Domburg - 7, p. 7; Mook, Plasmolen - 16, p. 31; 20, p. 49.
Inocybe praetervisa Quél.: verschil t.o. Inocybe mixtilis, xanthomelas - 8, p. 53*-54; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25-26.
Inocybe praetervisa Quél. var. mixtilis (Britz.) Konr. et Maubl. *(Inocybe mixtilis)*: verschil t.o. Inocybe praetervisa, xanthomelas - 8, p. 53*-54.
Inocybe queletii Maire et Konr. (misschien synoniem van Inocybe fulvida Bres.): Utrecht, Maliebaan - 7, p. 7.
Inocybe relicina (Fr.) Quél. sensu Heim (N.B. vorm van Inocybe hirsuta?): Domburg - 7, p. 7.
Inocybe rhodiola: vorm van Inocybe jurana.
Inocybe sambucina (Fr.) Quél.: Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Vijlen, Vijlener bos - 10, p. 30; Zeist, Zeister bos - 6, p. 57.
Inocybe scabella (Fr.) Quél. sensu Cooke: omgev. Bussum - 14, p. 77.
Inocybe serotina Peck *(Inocybe ammophila)*: Amsterdamse Waterleiding duinen - 5, p. 41; Vogelenzang - 5, p. 69.

Inocybe squamata Lange *(Inocybe fastigiata* var. *squamata)*: IJmuiden, Heerenduin - 11, p. 20.
Inocybe squarrosa Rea: Goor - 7, p. 7.
Inocybe striata Bres.: Driebergen - 7, p. 7.
Inocybe umboninota Peck sensu lange *(Inocybe acuta)*: Denekamp, Borchbosch - 14, p. 66.
Inocybe umbratica Quél.: Doetinchem, "Slangenburg" - 11, p. 43.
Inocybe umbrina Bres.: verschil t.o. Inocybe acuta, napipes - 8, p. 54-55*; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.
Inocybe vatricosa (Fr.) Karst.: Lonneker, Smalenbroek - 7, p. 7.
Inocybe viscidula Heim: Lonneker, Smalenbroek - 7, p. 7.
Inocybe xanthomelas Bours, et Kühner: verschil t.o. Inocybe mixtilis, praetervisa - 8, p. 53*-54.
Inocybe spec.: Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 55.
Inoloma: subgenus van Cortinarius,
Inonotus cuticularis (Bull. ex Fr.) Karst. *(Polyporus cuticularis)*: omgev. Tilburg - 11, p. 62.
Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murr.: Ruurlo, cycloonbos - 7, p. 55.
Inonotus hispidus (Bull. ex Fr.) Karst. *(Polyporus hispidus)*: omgev. Bussum - 5, p. 40; omgev. Chaam - 6, p. 35; omgev. Tilburg - 11, p. 62; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
Inonotus obliquus (Pers. ex Fr.) Pilát *(Fomes obliquus)*: Haarlem, stadstuin - 3, p. 12.
Inonotus vulpinus (Fr.) Karst *(Polyporus vulpinus)*: Bergen, staatsbossen - 13, p. 55; Ruurlo - 5, p. 87; Wassenaar, Meiendel - 5, p. 87.
Isaria ditmarii Quél.: Eindhoven, Philipsbossen - 18, p. 45.
Isaria dubia Delacr.: conidieënvorm van Cordyceps gracilis - 18, p. 45; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 18, p. 45.
Isaria farinosa Dicks. ex Fr.: niet conidieënvorm van Cordyceps militaris - 18, p. 44; omgev. Alkmaar - 2, p. 65, Eindhoven, Philipsbossen - 18, p. 45; De Lutte - 9, p. 10*; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; omgev. Rijswijk - 11, p. 25; Rijswijk, Rijswijkse bos - 9, p. 10.
Isaria sphaerocephala Petch: Tongerloo - 18, p. 46.
Ischnoderma resinosum (Fr.) Karst. *(Polyporus fuliginosus)*: omgev. Wageningen - 7, p. 4; Zeist, Zeister bos - 6, p. 57.
Ithyphallus impudicus: zie Phallus impudicus.
Laboulbenia flagellata Peyr.: ontwikkelingsgeschiedenis & afb. - 9, p. 62-65; Leiden, Hortus Bot. - 9, p. 62.
Laboulbenia subterranea Thaxter. Hengelo - 16, p. 6, 7*, 8.

Laccaria amethystina (Bolt. ex Fr.) Berk. et Br. *(Laccaria laccata* var. *amethystina)*: Breda, Mastbosch - 1, p. 53; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; Noordlaren (te. ratolog.) - 19, p. 17.

Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Berk. et Br. *(Clitocybe, Collybia laccata)*: omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Noordlaren (teratolog.) - 19, p. 14*, 16*; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; Ulvenhout - 3, p. 74.

Laccaria laccata var. *amethystina*: zie Laccaria amethystina.

Lachnea albo-badia (Saut.) Rehm. Doetinchem, "Slangenburg" - 12, p. 43; omgev. Eindhoven - 18, p. 34.

Lachnea brunnea (Alb. et Schw. ex Fuck.) Rehm. Epse, Epser bos - 12, p. 42.

Lachnea crucipila (Cooke et Phill.) Phill.: Varsseveld - 18, p. 34; Walcheren, Dishoek (nadere informatie) - 12, p. 25.

Lachnea dalmeniensis (Cooke) Phill.: Groningen - 12, p. 25.

Lachnea gilva (Boud.) Sacc. Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.

Lachnea gregaria (Rehm) Phill. Mook, Plasmolen - 12, p. 43; Mook, St. Jansberg - 20, p. 48; Oosterhout (nadere informatie) - 12, p. 43.

Lachnea hemisphaerica (Wigg. ex Fr.) Gill. *(Peziza hemisphaerica)* Amersfoort - 2, p. 12; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; omgev. Chaam - 6, p. 35; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 12, p. 42; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Oisterwijk, vennengebied - 7, p. 47.

Lachnea hirta (Schum. ex Fr.) Gill.: Terborg - 9, p. 40; 12, p. 24.

Lachnea hirtella (Rehm) Sacc. (misschien identiek met Lachnea hirta?): Texel, Geul - 12, p. 24.

Lachnea intermixta (Karst.) Rehm *(Humaria melalomoides* wellicht synoniem van Lachnea melaloma?) Renkum "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze "Buunderkamp" - 11, p. 48

Lachnea melaloma (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc *(Peziza melaloma)* Epse, Epser bos - 10, p. 4.

Lachnea miniata (Fuck.) Gill.: Nieuw Beerta - 6, p. 32; Texel, Geul - 3, p. 75; 12, p. 24.

Lachnea rosella Schweers Doetinchem "Slangenburg" - 11, p. 43; 12, p. 25

Lachnea roseo-lilacina: zie Peziza roseo-lilacina.

Lachnea scutellata (L. ex Fr.) Gill. *(Peziza scutellata)* habitustekening - 10, p. 22 Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 8, p. 67; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 12, p. 25.

Lachnea setosa (Nees ex Fr.) Gill. *(Plicaria setosa)*: Mook Plasmolen, St. Jansberg - 13, p. 34; 20, p. 49

Lachnea umbrata (Fr.) Gill.: Mook, Papenberg 14, p. 66, 20, p. 49

Lachnea umbrorum (Fr.) Gill. Mook, Plasmolen - 12, p. 25; Mook Plasmolen Hellekuil - 20, p. 48; Roermond - 12, p. 25.

Lachnea woolhopeia (Cooke et Phill.) Sacc. *(Trichophaea woolhopeia)*: Eindhoven, Oirschotsedijk - 19, p. 64.
Lachnum crystallinum (Fuck.) Rehm. Hatert, Hatertse broek - 12, p. 43
Lacrymaria velutina (Pers. ex Fr.) Pat. *(Hypholoma lacrymabundum)*. Beverwijk-Bloemendaal - 6, p. 39; Eindhoven - 7, p. 46; Tilburg - 11, p. 62; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17, 50*-51.
Lactarius aspideus (Fr. ex Fr.) Fr.: beschrijving - 15, p. 5-6; Denekamp - 15, p. 5; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77; 15, p. 5.
Lactarius aurantiacus: zie Lactarius mitissimus.
Lactarius azonites (Bull. ex Gmel.) Fr. Hengelo, "Weusthag" 4 p. 76.
Lactarius blennius (Fr.) Fr.: gastheer van Nyctalis parasiticus - 5, p 85; omgev. Amersfoort - 2, p. 11.
Lactarius camphoratus (Bull. ex Fr.) Fr. Utrecht, "Rhijnauwen' - 19, p. 23.
Lactarius controversus (Pers. ex Fr.) Fr.: Eindhoven-Best - 7, p. 46; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 13, p. 12.
Lactarius cremor Fr. Nieuwersluis, "Over-Holland" (onzeker) 18, p. 46.
Lactarius cyathula (Fr.) Fr. sensu Ricken *(Lactarius obnubilus* sensu Lange): Bergen-Schoorl - 5, p. 60; Best - 19, p. 64; Egmond aan de Hoef - De Franschman - 5, p. 60; Epse, Epser bos - 10, p. 41; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30; De Vuursche - 13, p. 10.
Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) S.F. Gray: Eindhoven - 7, p. 46; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
Lactarius flexuosus (Fr. ex Fr.) Fr. Nieuwersluis, "Over-Holland" - 13 p. 12.
Lactarius fuliginosus (Fr. ex Fr.) Fr. subsp. picinus (Fr.) Konr. et Maubl. Doe tinchem, "Slangenburg" - 7, p. 56.
Lactarius glyciosmus (Fr. ex Fr.) Fr.: Doorn-Maarn - 19, p. 11; Hooge Vuursche - 19, p. 67; Lunteren - 12, p. 47.
Lactarius helvus (Fr.) Fr. Hilversum-Baarn - 13, p. 19; De Lutte - 9, p. 10; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.
Lactarius hepaticus Plowr. Baarn - 15, p. 5, Bussum - 15, p. 6 Maarn - 14, p. 77; 15, p. 6.
Lactarius hysginus (Fr. ex Fr.) Fr. Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17.
Lactarius ichoratus (Batsch ex Secr.) Fr. Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67.
Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. Baarn, Pijnenburg - 18, p. 46 Bergen-Verbrande Pan - 3 p. 75 Egmond aan de Hoef - De Franschman - 5, p. 60 Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61.
Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. *(Lactarius aurantiacus)*: Texel, staatsbossen - 7, p. 49; Wassenaar, Meiendel - 12, p. 47.

Lactarius musteus Fr.: Nieuwersluis, "Over-Holland" (onzeker) - 18, p. 46.
Lactarius necator (Pers. ex Fr.) Karst. *(Lactarius turpis)*: omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Lunteren - 12, p. 47.
Lactarius obnubilus sensu Lange: zie Lactarius cyathula.
Lactarius pallidus (Pers. ex Fr.) Fr.: Denekamp - 5, p. 30, Driebergen - 5, p. 30; Hemmen - 5, p. 30; omgev. Ruurlo - 4, p. 27; 5, p. 30; Zoelen - 6, p. 9.
Lactarius piperatus (L. ex Fr.) S.F.Gray: reactie melksap, medicinale eigenschap - 5, p 17; verschil t.o. Lactarius vellereus - 4, p. 76; 5, p. 17, gastheer van Nyctalis asterophora - 5, p. 85; omgev. Haarlem - 6, p. 39.
Lactarius pubescens, zie Lactarius torminosus subsp. pubescens.
Lactarius pyrogalus (Bull. ex Secr.) Fr.: omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28.
Lactarius rufus (Scop. ex Fr.) Fr. omgev. Amersfoort - 2, p. 11; 3. p.79; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p 18; Texel, staatsbossen - 6, p. 55
Lactarius serifluus (D.C. ex Fr.) Fr.: Bilthoven, De Pan - 18, p. 7; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 13, p. 12; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23.
Lactarius subdulcis (Bull. ex Fr.) S.F.Gray: Overveen, "Elswout" - 4 p. 47; Texel, staatsbossen - 6, p. 55
Lactarius tabidus Fr. Paterswolde (onzeker, teratolog) 19. p 14.
Lactarius theiogalus (Bull. ex Fr.) Fr.: omgev. Maarn - 14 p 77. Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23; Renkum "Oranje Nassau Oord' of Wolfheze, " "Buunderkamp" - 11, p. 47.
Lactarius torminosus (Schaeff. ex Fr.) S.F.Gray: Eindhoven - 7, p. 46, Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18; Hilversum-Baarn - 13, p. 19.
Lactarius torminosus (Schaeff. ex Fr.) S.F.Gray subsp. pubescens (Fr.) Konr. et Favre *(Lactarius pubescens)*: Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.
Lactarius turpis: zie Lactarius necator.
Lactarius uvidus (Fr. ex Fr.) Fr.: Gorssel - 7 p. 24, omgev. Ruurlo - 4 p. 27; Ulvenhout - 2, p. 45.
Lactarius vellereus (Fr.) Fr.: verschil t.o. Lactarius piperatus - 4, p. 76; 5, p. 17 gastheer van Collybia tuberosa, Nyctalis asterophora N. parasitica 5 p. 85; omgev. Amersfoort - 2, p. 11 Amersfoort-Woudenberg, De Treek - 19, p. 49*; Bilthoven, De Pan - 18, p. 7; omgev. Haarlem - 6, p. 12; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13.

Lactarius vietus (Fr.) Fr.: Bilthoven, De Pan - 18, p. 7.
Lactarius volemus (Fr.) Fr.: omgev. Hengelo - 3, p. 48; Mook, Plasmolen, St. Martensberg - 9, p. 39.
Lactarius zonarius (Bull. ex Secr.) Fr.: omgev. Haarlem - 6 p. 39. Overveen "Elswout" - 6, p. 13; Zoelen - 6, p. 8.
Lamprospora areolata Seaver: Bergen, Verbrande Pan - 12, p. 24.
Lamprospora carbonicola Boud.: Geisteren, Rosmolen - 14, p. 66.
Lamprospora Crec'hqueraultii (Crouan) Boud.: Mook, Plasmolen, Groene Water - 12, p. 24; 20, p. 48.
Lamprospora dictydiola Boud.: Weerdinge - 12, p. 24; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
Lasiobolus spec.: Epse, Epser bos - 7, p. 56.
Lentinellus cochleatus (Pers. ex Fr.) Karst. *(Lentinus cochleatus)*: Baarn, "Groeneveld" - 19, p. 67; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; De Steeg, "Middachten - 8, p. 18.
Lentinus adhaerens (Alb. et Schw. ex Fr.) Fr. beschrijving & afb. - 14, p. 46-47; De Bilt - 14, p. 46.
Lentinus cochleatus: zie Lentinellus cochleatus.
Lentinus gallicus Quél.: Venraay - 10, p. 37.
Lentinus lepideus (Fr. ex Fr.) Fr. *(Lentinus squamosus)* biologie 6 p. 42; milieu- en habitusfoto - 6, p. 41, 43; Hoorn-Medemblik - 6, p. 43; omgev. Lochem (nadere informatie) - 18, p. 52; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Nijmegen, schuilkelder (teratolog.) - 13, p. 29*, 30; Oldenzaal, kelder - 6, p. 43; 13, p. 30; Oldenzaal, Koppelberg - 6, p. 42; Vogelenzang, A.W. duinen - 5, p. 93
Lentinus squamosus: zie Lentinus lepideus.
Lentinus suavissimus Fr.: Amersfoort (?) - 4, p. 31.
Lentinus tigrinus (Bull. ex Fr.) Fr. Best - 19, p. 64; omgev. Ede (nadere informatie) - 18, p. 35 Lexkesveer - 9, p. 39. Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40, 41*; Rijswijk - 14, p. 61; Valkenburg-Ravensbosch - 10, p. 30.
Lentinus tigrinus (Bull. ex Fr.) Fr. var. dunalii (D.C. ex Fr.) Rea (N.B. vermoedelijk identiek met Lentinus tigrinus) Doetinchem 'Slangenburg' - 7, p. 56; Nijmegen, Ooipolder - 9, p. 39.
Lenzites betulina (L. ex Fr.) Fr. Tilburg - 11, p. 62. Wassenaar, "Voor Linden" - 18, p. 75
Lenzites saepiaria: zie Gloeophyllum sepiarium.
Leotia lubrica (Scop. ex) Fr.: Amersfoort - 2 p. 12 Amersfoort-Wouden berg De Treek - 19, p. 23; omgev. Chaam - 6 p. 35 Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46 omgev. Eindhoven - 15 p. 31; Oisterwijk, vennengebied - 7 p. 47 De Vuursche Lage Vuursche - 8, p. 31. Wassenaar,

"Raaphorst" - 11, p. 65; 14, p. 5.
Lepidella vittadinii: zie Aspidella vittadinii.
Lepiota: aantekeningen over de systematiek - 9, p. 50-52, 65-68.
Lepiota acutesquamosa (Weinm.) Gill. *(Lepiota friesii* hierbij zeker ook ten dele var. furcata Kühner): Amersfoort - 4, p. 30; Amsterdam, Sted. Mus. en Kolon. Mus. - 7, p. 59-60; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; omgev. Baarn - 14, p. 77; Bilthoven, De Pan - 18, p. 7; omgev. Haarlem - 6, p. 39; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 41; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23.
Lepiota adnatifolia: zie Cystoderma granulosum var. adnatifolium.
Lepiota alba (Bres.) Sacc. Walcheren, Dishoek (nadere informatie) - 9, p. 67.
Lepiota amianthina: zie Cystoderma amianthinum.
Lepiota amianthina var. *longispora*: zie Cystoderma amianthinum var. longisporum.
Lepiota badhamii (Berk. et Br.) Quel.: Baarn, Cantonspark - 18, p. 47.
Lepiota badhamii sensu Patouillard, Rea, Cooke: zie Lepiota meleagroides.
Lepiota brebissonii Godey beschrijving 12 p 72-73 habitusfoto - 20, p. 45; habitustekening & microscop. details - 12, p. 68, 69, 71, 73 Oosterhout "Oosterhout" - 13, p 41 Oostkapelle "Berkenbosch (nadere informatie) - 12, p. 72; Wageningen, kas - 20, p. 46; Walcheren (waar?) - 12, p. 72; Warmond - 12, p. 71, Wassenaar, "Raaphorst" - 12 p. 72.
Lepiota carcharias: zie Cystoderma carcharias.
Lepiota carinii Bres. *(Lepiota echinacea)* Eindhoven Oirschotse dijk 19, p. 63; Houthem, Ravensbosch - 15, p. 11.
Lepiota castanea Quel. (N.B. hierbij wellicht ten dele ook Lepiota ignicolor Bres.?): Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; omgev. 's-Gravenhage - 6, p. 38; Hooge Vuursche - 19, p. 67; Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
Lepiota cepaestipes (Sow ex Fr.) Quel. *(Leucocoprinus cepaestipes)*. habitustekening & microscop. details - 14, p. 7; Amsterdam, Hortus, kas - 11, p. 4; Hengelo, bloemenkas - 14, p. 8; Tilburg - 11, p. 62.
Lepiota cepaestipes (Sow. ex Fr.) Quél var. lilacinogranulosa (P.Henn.) Konr. et Maubl. *(Lepiota lilacinogranulosa)*: beschrijving - 11, p. 4 Amsterdam, Hortus, kas - 11, p. 4.
Lepiota cinnabarina: zie Cystoderma cinnabarinum.
Lepiota clypeolaria (Bull ex Fr.) Quél.: Nieuw Beerta - 6, p. 32.
Lepiota clypeolaria (Bull. ex Fr.) Quel. f. minor Lange (N B. identiek met Lepiota pallida Locq.?): omgev Bussum - 14, p. 77.
Lepiota cristata (Alb. et Schw ex Fr.) Quél.: Amsterdam(?) kas - 11, p. 24; Amsterdam, Kolon. Mus. - 7, p. 60; Amsterdam, Vondelpark - 5, p.

69; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; omgev. Rijssen - 12, p. 15; Rijswijk, Hoornbrug - 5, p. 94.

Lepiota cygnea Lange: Oostkapelle, "Berkenbosch" (nadere informatie) - 9, p. 67; Oostkapelle, "Westbroek" - 8, p. 37.

Lepiota delicata: zie Limacella delicata.

Lepiota echinacea Lange: zie Lepiota carinii.

Lepiota echinata (Roth ex Fr.) Quél. *(Lepiota haematosperma, Inocybe, Psalliota echinata)*: beschrijving sporeverkleuring - 4, p. 29; Ter Apel - 4, p. 30; Ginneken - 6, p. 35; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 6, p. 22; 20, p. 47; Overveen, duinen - 4, p. 29; Ruurlo, kasteel "Ruurlo" - 4, p. 27; Tilburg - 11, p. 61; Veendam - 4, p. 30; Wageningen, plantenkas - 12, p. 21; Zuidlaren - 4, p. 30.

Lepiota excoriata (Schaeff. ex Fr.) Quél. var. konradi Huijsman *(Lepiota mastoidea* sensu Konr. et Maubl.): Oostkapelle, Oranjezon (nadere informatie) - 9, p. 66; Vrouwenpolder (nadere informatie) - 9, p. 66.

Lepiota felina (Pers. ex Fr.) Quél.: Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 69; Walcheren (waar?) - 5, p. 32.

Lepiota forquignoni Quél.: Slochteren, Slochterbosch - 6, p. 38; Walcheren (waar?) - 5, p. 32.

Lepiota friesii: vorm van Lepiota acutesquamosa.

Lepiota georginae W.G.Smith: Baarn, Baarnse bos ("Groeneveld"?) - 18, p. 47; Bergen, Berger bos - 2, p. 64; Oosterhout, "Oosterhout" - 15, p. 11; Oostkapelle, "Berkenbosch", " 't Vroon", "Westhoven" (nadere informatie) - 10, p. 36.

Lepiota haematosperma: zie Lepiota echinata.

Lepiota helveola Bres.: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41.

Lepiota holosericea (Fr.) Gill.: Huis ter Heide (nadere informatie) - 4, p. 30.

Lepiota irrorata: zie Drosella irrorata.

Lepiota laevigata Lange: Velsen, Velser bos - 14, p. 61.

Lepiota lenticularis: zie Limacella guttata.

Lepiota lilacea Bres. (N.B. hierbij misschien ook Lepiota pseudo-lilacea?, zie aldaar): beschrijving - 12, p. 20; Gorssel, " 't Joppe" - 12, p. 20; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.

Lepiota lilacina: Naam bestaat niet, verschrijving voor L. lilacea? - 1, p. 55, 57.

Lepiota lilacinogranulosa P. Henn.: zie Lepiota cepaestipes var. lilacinogranulosa.

Lepiota lutea (With. ex) Godfrin: Breda, tuinbouwschool - 9, p. 39; Eindhoven, kas - 19, p. 63; Hengelo, bloemenkas - 14, p. 7*.

Lepiota mastoidea (Fr.) Quél. (non sensu Konr. et Maubl.): omgev. Middelburg (nadere informatie) - 9, p. 66.

Lepiota meleagroides Huijsman *(Lepiota badhami* sensu Pat.) Haarlem, A.W. duinen - 10, p. 35.
Lepiota metulispora (Berk et Br.) Sacc. Oostkapelle, "Westhoven" (nadere informatie - 9, p. 67.
Lepiota minuta Lange: Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
Lepiota naucina (Fr.) Quél. *(Lepiota pudica)*. beschrijving & verschil t.o. Lepiota excoriata, lenticularis - 6, p. 53; Heemstede - 6, p. 53; Tilburg - 11, p. 62; Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
Lepiota odorata: zie Tricholoma odoratum.
Lepiota procera (Scop. ex Fr.) Quél.; verschil t.o. Lepiota rhacodes - 7, p 60; Amsterdam, Kolon. Museum - 7, p. 60; omgev. Chaam - 6, p. 35; Gorssel - 7, p. 77; Nieuw Beerta - 6, p. 32; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. ...; Wageningen - 8, p. 15; Wolfheze, omgev. "Buunderkamp" (overgangsvorm naar L. rhacodes) - 6, p. 73.
Lepiota pseudo-lilacea Huijsman omgev. 's-Gravenhage (foutief als L. lilacea, nadere informatie) - 9, p. 67.
Lepiota pudica: Zie Lepiota naucina.
Lepiota rhacoces (Vitt.) Quél. Verschil t.o. Lepiota procera - 7, p. 60 Amsterdam. Reinier Vinkeleskade - 7, p. 60; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8 p. 39 Berlicum. Wamberg" - 5, p. 41 Eindhoven - 19, p. 6
Lepiota rubella Bres. Baarn Cantonspark kas - 18, p 47 Rotterdam Blijdorp, kas (voorlopige determ.) - 16, p. 18.
Lepiota rubens. foute determinatie. nadere informatie - 9. p. 67.
Lepiota seminuda: zie Lepiota sistrata.
Lepiota setulosa Lange Oostkapelle, "Berkenbosch" (nadere informatie) - 9, p. 67.
Lepiota sistrata (Fr.) Quél. *(Lepiota seminuda)* Eindhoven, Oirschotse dij - 19, p. 63; omgev. Hilversum - 9, p. 45; Oosterhout, "Oosterhout" - 13. p. 42; Overveen. 'Elswout" - 5, p. 38; Texel. omgev. Fonteinsnol - 7, p. 35, 49; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
Lepiota subincarnata Lange : omgev. Bloemendaal (nadere informatie) - 9, p. 67.
Lepiota vittadinii : Zie Aspidella vittadinii.
Lepiota spec. beschrijving - 5, p. 4-5; Amsterdam, "Artis" - 15, p. 4.
Lepiota spec.: Hengelo, bloemenkas - 14, p. 6*.
Lepista gilva (Pers. ex Fr.) Konr. *(Cl tocybe splendens)* omgev. 's-Gravenhage - 6, p. 38.
Lepista inversa (Scop. ex Fr.) Pat. *(Clitocybe flaccida* Fr. non Bres., *Clitocybe inversa)*: Hilversum-Baarn - 13, p. 19; 14, p. 77; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; Vogelenzang - 5, p. 66.

Leptonia anatina (Lasch) Quél.: Ruurlo, kasteel " Ruurlo",- 4, p. 27.
Leptonia chalybaea (Pers. ex Fr.) Quél.: Boxtel-Best, " Veldersbosch" - 17, p. 8.
Leptonia euchroa (Pers. ex Fr.) Gill.: Baarn, Baarnse bos ("Groeneveld ?) - 6, p. 24; Baarn, " Groeneveld" - 10, p. 40; Bergen-Schoorl - 5, p. 60 Boxtel-Best, " Veldersbosch" - 17, p. 8; omgev. Chaam - 6, p. 35; Epse. Epser bos - 10, p. 41; Gorssel, " 't Amelte" - 12, p. 20; 's-Gravenhage, " Meer en Bosch" - 6, p. 38; omgev. Oisterwijk - 11, p. 62; Oldeberkoop (nadere informatie) - 7, p. 34; Olvenhout - 2, p. 45; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
Leptonia kervernii Guern.: omgev. Ruurlo - 4, p. 27.
Leptonia lampropoda (Fr.) Quél.: Hooge Vuursche, Blauwe Koepel - 6, p. 25; omgev. Ruurlo - 4, p. 27; Wassenaar, " Raaphorst" - 12, p. 4*.
Leptonia lampropus: zie Leptonia lampropoda.
Leptonia parasitica: zie Claudopus parasiticus.
Leptonia sarcita (Fr.) Quél.: Hoogezand - 4, p. 30; Zeist - 4, p. 30.
Leptonia sericella (Bull. ex Fr.) Barbier *(Rhodophyllus sericellus)*: Eindhoven - 7, p. 46; Eindhoven, Kanaaldijk - 19, p. 64; Gorssel, " 't Amelte" - 12, p. 20.
Leptonia serrulata (Pers. ex Fr.) Quél. *(Rhodophyllus serrulatus)*: omgev. Bussum - 14 p. 77; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; omgev. Ruurlo - 4, p. 27.
Leptopodia ephippium (Lév.) Boud. *(Helvella ephippium)*: beschrijving & afb. - 14, p. 74; Amsterdam, IJbos - 14, p. 74; Valkenburg - 14, p. 74; Wassenaar, "Raaphorst" (niet: Leiden) - 15, p. 5.
Leptoporus fodinarum (Vel.) Pilát: omgev. Valkenburg - 10, p. 29.
Leptosphaeria acuta (Moug. et Nestl.) Karst.: beschrijving - 18, p. 29 Doorn - 18, p. 29; Wageningen - 18, p. 29.
Leptosphaeria doliolum (Pers. ex Fr.) Ces. et De Not.: beschrijving & afb. - 18, p. 27, 29; omgev. Wageningen - 18, p. 29.
Leucocoprinus cepaestipes: zie Lepiota cepaestipes.
Leucopaxillus albissimus (Peck) Sing. *(Leucopaxillus paradoxus)*: Bergen, Verbrande Pan - 3, p. 75; Schoorl (?) - 5, p. 39; Wassenaar, Meiendel - 5, p. 87; 8 p. 16*.
Leucopaxillus paradoxus: zie Leucopaxillus albissimus.
Leucoscypha leucotricha (Alb. et Schw. ex Fr.) Boud.: Baarn, Soestdijk - 13, p. 28; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 40; 13, p. 28.
Limacella delicata (Fr.) Earle *(Lepiota delicata)*: Hengelo, bloemenkas - 14, p. 5*.
Limacella guttata (Pers. ex Fr.) Konr. et Maubl. *(Lepiota lenticularis)*: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Appelsga - 6, p. 56;

Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; 5, p. 39.

Limacium: zie Hygrophorus.

Lycogala epidendrum L. : Fr. (Myxomycetes; omgev. Haarlem - 5, p. 18; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.

Lycoperdon bovista: zie Calvatia bovista.

Lycoperdon coelatum: zie Calvatia bovista.

Lycoperdon ericetorum Pers. (*Lycoperdon furfuraceum*) Gorssel - 7, p. 77; Valkenswaard - Heeze (nadere informatie) - 14, p. 60.

Lycoperdon excipuliforme: zie Calvatia excipuliformis.

Lycoperdon furfuraceum: zie Lycoperdon ericetorum

Lycoperdon gemmatum: zie Lycoperdon perlatum.

Lycoperdon giganteum: zie Calvatia gigantea.

Lycoperdon perlatum Pers. (*Lycoperdon gemmatum*): De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7.

Lycoperdon pyriforme Willd. ex Pers. Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 6, p. 22; De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18.

Lycoperdon saccatum: zie Calvatia excipuliformis.

Lyophyllum aggregatum (Schaeff. ex Secr.) Kühner (*Tricholoma cryptarum Tricholoma borreae*) beschrijving keldervorm - 8, p. 55; 's-Gravenhage(?) - 8, p. 55; Haarlem, stadstuin - 3, p. 11.

Lyophyllum cinerascens (Bull. ex Quél.) Konr. et Maubl. (non Fr.) (*Tricholoma cinerascens Tricholoma conglobatum*) (N.B. ongeldige combinatie, moet feitelijk herdoopt worden) Beekbuizen - 5, p. 40; Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; omgev. Bussum - 5, p. 40; Delden, "Twickel" - 12, p. 18; Otterlerp - 7, p. 35; Paterswolde, "De Braak" (vermoedelijk nadere informatie) - 7, p. 34; Tilburg, Bredase weg - 11, p. 63; De Vuursche, Lage Vuursche - 6, p. 30.

Lyophyllum immundum (Berk.) Kühner (*Tricholoma immundum*): verschil t.o. Tricholoma semitale, infumatum, trigonosporum - 13, p. 27.

Lyophyllum infumatum (Bres.) Kühner (*Tricholoma infumatum*): verschil t.o. Tricholoma immundum, semitale, trigonosporum - 13, p. 27; Doetin.chem. "Slangenburg" - 7, p. 56; Hulshorst - 13, p. 27.

Lyophyllum leucophaeatum (Karst.) Karst. (*Clitocybe gangraenosa*): Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67.

Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühner (*Tricholoma cartilagineum*) Doetinche - 10, p. 37.

Lyophyllum semitale (Fr.) Kühner (*Tricholoma semitale*): verschil t.o. Tricholoma immundum, infumatum, trigonosporum - 13, p. 27.

Lyophyllum trigonosporum (Bres.) Kühner (*Tricholoma trigonosporum*) (identiek met Lyophyllum transforme (Britz.) Sing.?): verschil t.o. Tricholoma immundum, infumatum, semitale - 13, p. 27.

Lyophyllum ulmarium (Bull. ex Fr.) Kühner *(Pleurotus ulmarius)*: Amsterdam, binnenstad - 7, p. 61; Heemstede, "Groenendaal" - 5, p. 33.

Lysurus australiensis Cooke et Mass. *(Anthurus australiensis)*: verzoek om conservering & afb. - 3, p. 1-3; Beuningen - 2, p. 65; 3, p. 2; 11, p. 30; Hengelo - 11, p. 30; Hoogezand - 4, p. 16; 11, p. 30; Oisterwijk - 11, p. 30.

Macrocystidia cucumis (Pers. ex Fr.) Heim *(Naucoria cucumis, Nolanea pisciodora)*: beschrijving & afb. - 6, p. 28-29; Nolanea-kenmerken - 6, p. 27-29; Breda - 6, p. 29; Bussum - 6, p. 29; Hulshorst - 3, p. 76; Olterterp - 6, p. 27, 38; De Steeg, "Middachten" - 5, p. 60; 6, p. 29, 38; 8, p. 18; Zwolle - 6, p. 29.

Macropodia corium (Weberb.) Sacc.: Eindhoven-Acht - 17, p. 6; omgev. Valkenswaard - 14, p. 60.

Macropodia macropus (Pers. ex Fr.) Fuck. *(Helvella macropus)*: Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 39; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; omgev. Eindhoven - 15, p. 31; Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 7; omgev. De Lutte - 10, p. 36; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 78.

Marasmius amadelphus (Bull. ex Fr.) Fr. Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29.

Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr.: Bergen-Schoorl - 5, p. 60.

Marasmius bulliardii Quél.: Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28.

Marasmius candidus (Bolt. ex) Fr.: foute determinatie - 20, p. 71.

Marasmius caulicinalis: zeer waarschijnlijk verschrijving voor M. cauticinalis, zie Xeromphalina cauticinalis (N.B. Marasmius caulicinalis = Crinipellis stipitarius).

Marasmius cohaerens (Alb. et Schw. ex Fr.) Quél.: Amerongen - 7, p. 35; omgev. Haarlem - 6, p. 39; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25, Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67; Oldeberkoop (nadere informatie) - 7, p. 34; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; 5, p. 38.

Marasmius confluens (Pers. ex Fr.) Quél.: Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 30; Oosterhout, "Oosterhout" - 12, p. 30; 13, p. 41, 42.

Marasmius erythropus (N.B. dubieuze naam, misschien bedoeld Collybia acervata): 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" (onzeker) - 6, p. 38; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29

Marasmius fusco-purpureus (Pers. ex Fr.) Fr. Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17.

Marasmius globularis: zie Marasmius wynnei.

Marasmius graminum (Lib.) Fr.: habitustekening - 10, p. 22; Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 7; Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29.

Marasmius hudsonii Pers. ex Fr.) Fr.: Warmond, "Huis te Warmond" - 2, p. 66.
Marasmius impudicus Fr.: Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17.
Marasmius lupuletorum (Weinm.) Bres. (N.B. of wellicht bedoeld Marasmius torquescens Quél.?): Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61.
Marasmius menieri Boud.: omgev. Breda - 18, p. 3.
Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr.: omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; Bloemendaal(?) - 5, p. 93: omgev. Haarlem - 5, p 18, 93; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Wekerom (nadere informatie) - 18, p. 35.
Marasmius perforans (Hoffm. ex Fr.) Fr.: De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11.
Marasmius peronatus (Bolt. ex Fr.) Fr. *(Marasmius urens)*: omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.
Marasmius quisquiliaris Schweers: Nijmegen - 10, p. 37, 52 (als M. spec.); 11, p. 43.
Marasmius ramealis (Bull. ex Fr.) Fr.: Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 8, p. 29.
Marasmius recubans Quél. (non sensu Lange): Walcheren (waar?) - 5, p. 31.
Marasmius rotula (Scop. ex Fr.) Fr.: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Gieten - 9, p. 12; Haarlem, stadstuin - 3, p. 11; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23.
Marasmius scorodonius (Fr.) Fr.: Texel, omgev. Fonteinsnol - 7, p. 49.
Marasmius stipitarius: zie Crinipellis stipitarius.
Marasmius tenacellus (Pers. ex Fr.) Favre *(Collybia tenacella)* (N.B. polymorphe soort, die in drie subspecies is onderverdeeld, welke hier niet nader onderscheiden kunnen worden): Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42: Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66: Vogelenzang (onzeker) - 14, p. 30.
Marasmius tricolor (Alb. et Schw. ex Fr.) Kühner *(Omphalia tricolor)* Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64; Gennep - 9, p. 39; 20, p. 47.
Marasmius urens: zie Marasmius peronatus.
Marasmius varicosus Fr.: Delden, "Twickel" - 3, p. 76; Markelo - 3, p. 76.
Marasmius wynnei Berk. et Br. *(Marasmius globularis)*: Deventer-Lochem, omgev. "'t Joppe" - 7, p. 24; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25, 61; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Slochteren, Slochterbosch - 6, p. 38.
Marasmius spec.: zie Marasmius quisquiliaris.

Masseeola crispa (Wulf. ex Fr.) O. Kuntze *(Sparassis crispa)*: Baarn-Hooge Vuursche - 6, p. 24; Beekhuizen - 5, p. 40; Bilthoven, De Pan - 18, p. 8; omgev. Chaam - 6, p. 35; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 78.

Melachroia xanthomela (Pers. ex Fr.) Boud. Breda, Mastbosch - 15, p. 11; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7.

Melampsora helioscopiae (Pers.) Cast.: aecid., uredin., telium: Wageningen, Dorskamp, Eng - 19, p. 41.

Melampsora larici-populina Kleb.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 41.

Melampsora lini (Pers.) Desmaz.: uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 41.

Melampsorella symphyti (D.C.) Bubák: uredin.: Doorwerth, "Zalmen" - 19, p. 41.

Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.: uredin., telium: Bennekom, Oostereng - 19, p. 41; Wageningen - 19, p. 41.

Melanogaster ambiguus (Vitt.) Tul.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 17, p. 64.

Melanoleuca brevipes (Bull. ex Fr.) Pat. *(Tricholoma brevipes)*: Bilthoven, Panbos - 19, p. 23; Hengelo - 18, p. 53; Vogelenzang - 5, p. 93; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.

Melanoleuca cnista (Fr.) Pat. *(Tricholoma cnista)*: 's-Gravenhage, Meer en Bosch" - 7, p. 35; Ruurlo, kasteel "Ruurlo" - 4, p. 27; Vogelenzang - 5, p. 66; Wassenaar, Meiendel - 7, p. 35.

Melanoleuca excissa (Fr.) Sing. *(Tricholoma excissum)*: Bergen-Schoorl - 9, p. 29; omgev. Bussum - 14, p. 77.

Melanoleuca grammopodia (Bull. ex Fr.) Pat. *(Tricholoma grammopodium)*: Walcheren (waar?) - 5, p. 31; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.

Melanoleuca melaleuca (Pers. ex Fr.) Murr. *(Tricholoma melaleucum)*: Vogelenzang - 5, p. 66; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49; Zeist - 6, p. 71.

Melanoleuca oreina (Pers. ex Fr.) Kühner et Maire *(Tricholoma humile* sensu Ricken, *Tricholoma oreinum)*: Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49, 6, p. 69 (onzeker).

Merulius aurantiacus: niet meer na te gaan wat bedoeld - 4, p. 61.

Merulius domesticus: zie Gyrophana lacrymans.

Merulius lacrymans: zie Gyrophana lacrymans.

Merulius tremellosus Schrad. ex Fr. Loosduinen, "Ockenburg" 11, p. 64; Maarn - 6, p. 37.

Microglossum arenarium Rostr.: Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66.

Microglossum viride (Pers. ex Fr.) Gill. *(Geoglossum viride)*: Eindhoven, Rijkskrankzinnigengesticht - 19, p. 64.

Mitrula abietis Fr. *(Mitrula cucullata, Mitrula pusilla)*: Amersfoort-Woudenberg, De Treek - 13, p. 33*; Eindhoven - 15, p. 31.

Mitrula cucullata: zie Mitrula abietis.
Mitrula fusispora Preuss omgev. Eindhoven - 16, p. 31' vondst herroepen, determinatie onjuist - 17, p. 6
Mitrula paludosa Fr. ex Fr.' Bergeyk - 15, p. 31; Eindhoven - 15, p. 31 Maarn, Spoorsloot - 13, p. 15; Oisterwijk - 15, p. 31; Oisterwijk, Kolkven - 14, p. 60; Renkum, Renkumsche beek - 9, p. 38; omgev. Valkenswaard - 3, p. 48; 14, p. 60; 15, p. 31; Waalre, Keersop - 17, p. 46; Wolfheze, Heelsumsche beek - 9, p. 38.
Mitrula pusilla: zie Mitrula abietis.
Monilinia oxycocci (Wor.) Honey *(Sclerotinia oxycocci)* beschrijving & afb. - 7, p. 75; Kootwijk - 7, p. 75.
Monoicomyces homalotae Thaxter.: habitustekening - 14, p. 58.
Morchella conica (Pers, ex Fr.) Quél.: Bloemendaal(?) - 5. p. 93; Hoogezand - 10, p. 63, 64*.
Morchella deliciosa Fr.. habitustekening - 11, p. 6.
Morchella distans Fr.: habitustekening - 11, p. 8.
Morchella elata Fr.: Haren - 12, p. 79
Morchella esculenta L ex Fr.' Aerdenhout - 5, p. 18; Alkmaar, Alkmaarder hout - 2, p. 64; 15, p. 32; Amsterdam, "Artis" - 17, p. 24; Bloemendaal - 5, p. 93; Chaam, "Valkenberg" - 6, p. 35; omgev. Eindhoven - 15, p.31 ; Heilo, Heiloër bosch - 2. p. 64; 's-Gravenhage, omgev Haagsche Bosch - 12, p. 80' omgev Haarlem - 5, p. 18; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 41' Rockanje, duinen (abusievelijk als M. rotunda overgenomen uit Natura, 1946. p. 111) - 17, p. 45; Veendam - 6, p. 18; omgev. Wageningen - 5, p. 93.
Morchella gigas Batsch ex Fr.' Schiedam, Sterrebos - 16, p. 18*.
Morchella intermedia Boud.: habitustekening - 11, p. 7.
Morchella rimosipes D.C ex Fr.: Alkmaar - 4, p. 14; Amsterdam, "Artis" - 17, p. 24; Bloemendaal(?) - 5, p. 93; omgev. Haarlem - 5, p. 18, 93; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Rijswijk - 5, p. 90*-91.
Morchella rotunda foutief citaat uit Natura 1946, p. 111, zie Morchella esculenta.
Morchella vulgaris (N B of synoniem van, of een vorm van Morchella esculenta): Oosterhout - 10, p. 37; Veendam - 9, p. 49*.
Mucilago spongiosa (Leyss.) Morgan *(Spumaria alba)* (Myxomycetes): Amersfoort-Woudenberg, De Treek - 19, p. 23.
Mucor macrocarpus Corda: Rijswijk, Rijswijkse bos (vermoedelijk) - 6,p.70*.
Mucor rouxii (Calmette) Wehmer: habitustekening - 15, p. 27.
Mutinus caninus (Huds. ex Pers.) Fr. *(Phallus caninus)*: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; omgev. Chaam - 6, p. 35; omgev. Denekamp

(vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; Hengelo - 14, p. 17; De Lutte - 9, p. 10; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; omgev. Rijssen - 12, p. 14; Ulvenhout - 3, p. 32.

Mycena acicula (Schaeff. ex Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" (nadere informatie): - 18, p. 53; omgev. Haarlem - 5, p. 18; omgev. De Lutte - 10, p. 36; Olterterp - 6, p. 38; Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78.

Mycena adonis (Bull. ex Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; 18, p. 52 (nadere informatie); Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 7; Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; Gennep - 9, p. 39; 20, p. 47; Gieten - 9, p. 12; 12, p. 17.

Mycena aetites (Fr.) Quél. sensu Ricken *(Mycena ammoniaca)*: Delden, "Twickel" - 12, p. 16.

Mycena alcalina var. *chlorinella*: zie Mycena metata.

Mycena amicta (Fr.) Quél. *(Mycena iris)*: Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19; Mook, Plasmolen - 10, p. 37; 20, p. 47; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39; 20, p. 47.

Mycena ammoniaca: zie Mycena aetites.

Mycena arcangeliana sensu Oort: zie Mycena arcangeliana var. oortiana.

Mycena arcangeliana Bres. var. oortiana Kühner *(Mycena arcangeliana* sensu Oort): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Delft - 4, p. 46; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77; Paterswolde, "De Braak" - 5, tegenover p. 6*; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17; Zeist, Zeister bos - 6, p. 57.

Mycena atro-alba (Bolt. ex Fr.) Gill. sensu Ricken: habitustekening & microscop. details - 10, p. 22.

Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél. sensu Schroet.: Gorssel - 7, p. 24.

Mycena avenacea (Fr. sensu Schroet.) Quél.: Beverwijk-Bloemendaal - 6, p. 39; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Wekerom (nadere informatie) - 18, p. 34.

Mycena calopus: zie Mycena inclinata.

Mycena candida (Bres.) Kühner *(Omphalia candida)*: beschrijving - 11, p. 44; voorkomen op Symphytum officinale - 11, p. 44; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 11, p. 44; 's-Gravenzande, Staalduinen - 13, p. 14; Katwijk aan de Rijn, St. Willibrord College - 11, p. 44; Wassenaar, "Raaphorst" - 18, p. 9.

Mycena chlorantha (Fr. ex Fr.) Gill. sensu Oort: Vogelenzang, duinen - 5, p. 68; Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78.

Mycena cinerella Karst. sensu Lange: beschrijving & afb. - 14, p. 63-64; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; omgev. Stroe - 14, p. 63.

Mycena collariata Fr. (N.B. onvoldoend bekende soort): Geijsteren - 10, p. 37; Haarlem, stadstuin - 3, p. 11.

Mycena corticola (Pers. ex Fr.) Quél.: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39.

Mycena dissiliens: dubieuze soort, te schrappen - 6, p 55.

Mycena epipterygia (Scop. ex Fr.) Quél.: habitusfoto - 20, p. 57; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Vogelenzang - 5, p. 68.

Mycena epipterygioides Pearson: Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; Wassenaar, "Duinrel" - 12, p. 48.

Mycena erubescens v. Höhn. *(Mycena fellea* Lange): De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.

Mycena fagetorum (Fr.) Gill.: Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.

Mycena fellea Lange: zie Mycena erubescens.

Mycena fibula (Bull ex Fr.) Kühner var. swartzii (Fr.) Kühner *(Omphalia swartzii)*: Oostkapelle, 'Berkenbosch?' (nadere informatie) - 8, p. 29.

Mycena flavipes Quél.: Beesd - 10, p. 37.

Mycena flavo-alba (Fr.) Quél. Delden, "Twickel" - 12, p. 16, Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32.

Mycena flavomarginata: naam bestaat niet, misschien bedoeld Mycena citrinomarginata?(nadere informatie) - 17, p. 7.

Mycena galericulata (Scop. ex Fr.) Quél.: omgev. Aalst - 14, p. 60; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Delden, "Twickel" - 12 p. 16; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; Nieuw Beerta - 6, p. 32; Rijswijk - 9, p. 46; Texel, staatsbossen - 6, p.55; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 32.

Mycena galopoda (Pers. ex Fr.) Quél. *(Mycena galopus)*: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Tilburg - 11, p. 62.

Mycena galopoda var. *alba*: zie Mycena galopoda var. candida.

Mycena galopoda (Pers. ex Fr.) Quél. var. candida Lange *(Mycena galopoda* var. *alba)*: Texel, staatsbossen - 6, p. 55.

Mycena galopus: onjuiste schrijfwijze voor Mycena galopoda.

Mycena gracilis (Quel.) Kühner *(Omphalia gracilis)*: Mook, Plasmolen, Hellekuil (nadere informatie) - 18, p. 3.

Mycena gypsea (Fr. sensu Ricken) Gill. (N.B. indien bedoeld Mycena gypsea sensu Lange, dan Mycena olida Bres.): Wassenaar, "Voor Linden" - 18, p. 75.

Mycena gypsea var.: zie Mycena olida.

Mycena haematopoda (Pers. ex Fr.) Quél.: Baarn, "Groeneveld" - 9, p. 28; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Vogelenzang - 5, p. 68.

Mycena inclinata (Fr.) Quel. *(Mycena calopus)*: Ede, Hoekelom - 5, p. 42; Egmond aan de Hoef - De Franschman - 5, p. 60.

Mycena iris: zie Mycena amicta.

Mycena lactea (Pers. ex Fr.) Quél. (misschien *Mycena pithya)*: Bergen, De Franschman - 7, p. 56.

Mycena leptocephala (Pers. ex Fr.) Gill. sensu Lange, A.H.Smith (N.B. bijgeval indentiek met Mycena metata?): Walcheren (waar?) - 5, p. 31.

Mycena lineata: zie Mycena vitilis var. olivascens.

Mycena luteo-alba: zie (vermoedelijk) Mycena xantholeuca.

Mycena megaspora Kauffm.: zie Mycena permixta.

Mycena metata (Fr.) Quél. sensu Schroet. *(Mycena alcalina* var. *chlorinella)*: Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.

Mycena metata sensu Lange, Oort, Ricken: zie Mycena vitrea var. tenella.

Mycena olida Bres.: Heilo, natuurmonument - 3, p 76 (als *Mycena gypsea* var.).

Mycena osmundicola Lange: beschrijving - 11, p. 5; Amsterdam, Hortus, kas - 11, p. 5; 17, p. 25; Eindhoven, kas - 19, p. 64; Utrecht, Hortus, kas - 13, p. 49*; Wijster, biol. station, kas - 11, p. 5.

Mycena parabolica sensu Lange: dubieuze naam, misschien identiek met Mycena vitilis f. caespitosa.

Mycena pelianthina (Fr.) Quél.: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; 6, p. 38; Oldeberkoop (nadere informatie) - 7, p. 34, Olterterp - 6, p. 56; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Slochteren - 6, p. 56; Walcheren (waar?) - 5, p. 31.

Mycena pelliculosa: niet meer na te gaan welke soort bedoeld, M.pelliculosa sensu Lange = Mycena epipterygioides - 13, p. 19.

Mycena permixta (Britz.) Sacc. *(Mycena megaspora)*: beschrijving - 12, p. 10-11; omgev. Wijster - 12, p. 10.

Mycena pithya: dubieuze naam, misschien bedoeld Mycena lactea.

Mycena polygramma (Bull. ex Fr.) Quél.: omgev. Amersfoort 2, p. 11, omgev. Wageningen - 8, p. 35-36*.

Mycena pterigena (Fr.) Quél. beschrijving & afb. - 16 p. 43-44; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39, 48; 20, p. 47.

Mycena pura (Pers. ex Fr.) Quél.: Bilthoven, De Pan 18, p. 7; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Overveen, "Elswout" (blauwe vorm) - 5, p. 38; Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78.

Mycena quisquiliaris (Joss.) Kühner *(Omphalia quisquiliaris)*: Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39; 18, p. 3 (nadere informatie); 20, p. 47.

Mycena rorida (Scop. ex Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16.
Mycena sanguinolenta (Alb. et Schw. ex Fr.) Quél.: Amersfoort - 2, p. 12; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
Mycena seynii Quél.: habitusfoto - 7, p. 50; Aerdenhout - 1, p. 35; 3, p. 83; 4, p. 15 (vondst herroepen); Bloemendaal - 1, p. 35; 3, p. 83; Katwijk aan Zee - 1, p. 35; 3, p. 83; Loosduinen, "Ockenburgh" - 7, p. 35; 12, p. 66*; Mook, Plasmolen - 10, p. 37; 20, p. 47; Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66, 83.
Mycena speirea (Fr.) Gill. sensu Ricken, Kühner *(Omphalia camptophylla)*: Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 55; Gorssel, "Dorth" - 7, p. 56; Hatert - 14, p. 66; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
Mycena viscosa (Secr.) Maire: verschil t.o. Mycena epipterygia - 13, p. 32*; Amersfoort-Woudenberg, De Treek - 13, p. 32.
Mycena vitilis (Fr.) Quél., f. caespitosa Kühner (misschien *Mycena parabolica* sensu Lange): Walcheren (waar?) - 5, p. 31.
Mycena vitilis (Fr.) Quél. var. olivascens (Quél.) Kühner (Mycena lineata) De Steeg "Middachten" - 6, p. 38.
Mycena vitrea (Fr.) Quél. sensu Ricken var. tenella (Fr.) Kuhner *(Mycena metata* sensu Lange etc.): omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; Renkum "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.
Mycena xantholeuca Kühner (vermoedelijk *Mycena luteo-alba)*: Delden, "Twickel" - 12, p. 16.
Mycenula receptilibis: twijfelachtige soort, misschien zelfs een Collybia uit de groep tesquorum - 7, p. 55; 13, p. 34; 20, p. 48.
Mycogone perniciosa Magn.: parasiet in champignoncultuur - 8, p. 46; parasiet op Stropharia - 12, p. 41.
Mycorrhiza op Larix - 9, p. 74*.
Myriococcum praecox Fr.: begeleider bij champignoncultuur - 8, p. 46.
Myriostoma coliforme (Dicks. ex Pers.) Corda: gelijkenis jeugdstadium met Scleroderma vulgare - 2, p. 44-45; oecologie - 6, p. 86; Aerdenhout "Naaldenveld" (afwijking) - 11, p. 63; omgev. Bergen - 6, p. 86; omgev. Haarlem - 6, p. 86; Rockanje, duinen - 19, p. 24.
Myxacium: subgenus van Cortinarius.
Naematelia encephala (Pers. ex Fr.) Fr.: omgev. Oosterwolde - 5, p. 41.
Naucoria amarescens: zie Alnicola amarescens.
Naucoria arvalis: zie Agrocybe arvalis.
Naucoria bohemica: zie Alnicola bohemica.

Naucoria carpophila (Fr.) Quél.: beschrijving - 5, p. 57; Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Rijswijk, de "Voorden" - 5, p. 57.
Naucoria centunculus (Fr.) Quél.: Oosterhout, "Oosterhout" - 9, p 39.
Naucoria conspersa sensu Lange: zie Alnicola luteolofibrillosa.
Naucoria crobula: zie Deconica crobula.
Naucoria cucumis: zie Macrocystidia cucumis.
Naucoria erinacea (Fr.) Gill.: diagnose & afb. - 16, p. 43-44; Delden - 16, p. 44; Denekamp, "Breklenkamp" - 17, p. 43; Veenendaal, "Prattenburg" - 8, p. 17; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 31.
Naucoria escharoides: zie Alnicola escharoides.
Naucoria festiva: zie Phaeocollybia festiva.
Naucoria fulgens: zie Flammula fulgens.
Naucoria hilaris: zie Phaeocollybia hilaris.
Naucoria innocua (Lasch) Sacc.: Doetinchem - 10, p. 37.
Naucoria macrospora Lange: zie Alnicola submelinoides.
Naucoria myosotis (Fr.) Quél.: beschrijving & afb. - 6, p. 64-65, verschil t.o. Naucoria arvalis, festiva, tenax - 6, p. 64; Diever, "Berkenheuvel" - 12, p. 59; Oisterwijk, Campinaheide, Huisvennen - 19, p. 64; Paterswolde "De Braak" - 6, p. 64.
Naucoria pediades: zie Agrocybe pediades.
Naucoria pellucida sensu Ricken: zie Tubaria furfuracea.
Naucoria pityrodes sensu Lange: vermoedelijk synoniem van Flammula muricella - 18, p. 3.
Naucoria scolecina: zie Alnicola scolecina.
Naucoria scolecina f. *gracillima*: zie Alnicola scolecina f. gracillima.
Naucoria scorpioides sensu Lange: zie Alnicola bohemica.
Naucoria semiorbicularis: zie Agrocybe semiorbicularis.
Naucoria siparia (Fr.) Gill.: omgev. Heeze - 8, p. 37; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39, 48; 20, p. 47; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23.
Naucoria tenax (Fr.) Gill.: verschil t.o. Naucoria myosotis - 6, p. 64.
Naucoria typhicola: zie Conocybe typhicola.
Nematoloma polytrichi: onjuiste schrijfwijze voor Naematoloma; zie Hypholoma polytrichi.
Neottiella ithacaensis (Rehm) Schweers *(Humaria ithacaensis)*: nieuwe combinatie - 20, p. 49.
Nidularia confluens Fr. et Nordh.: Boxtel Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Eindhoven - 7, p. 46.
Nolanea araneosa Quél.: Kootwijk - 7, p. 56.
Nolanea cetrata (Fr.) Quél.: omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.
Nolanea clandestina (Fr.) Gill. *(Rhodophyllus clandestinus)*: Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 58.

Nolanea cocles (Fr.) Gill. *(Rhodophyllus cocles)*: Venraay, Oostrum - 14, p. 66.

Nolanea hirtipes (Schum ex Fr.) Quel. *(Nolanea mammosa* sensu Ricken, *Rhodophyllus hirtipes)*: 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30, omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 58.

Nolanea icterina (Fr) Quel. Eindhoven - 7, p. 46; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28.

Nolanea infula (Fr.) Gill. *(Rhodophyllus infulus)*: omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 58.

Nolanea inutilis (Britz.) Sacc. et Trav. *(Rhodophyllus inutilis)*: Gennep - 13, p. 34; 20, p. 48; Hatert, Hatertse broek - 18, p. 51.

Nolanea limosa (Fr.) sensu Ricken (N.B. waarschijnlijk identiek met Nolanea versatilis): beschrijving - 12, p. 58-59; omgev. Wijster, biol. station (onzeker) - 12, p. 58.

Nolanea mammosa: bedoeld sensu Ricken? zie Nolanea hirtipes.

Nolanea minuta Karst. *(Rhodophyllus minutus)*: Gennep - 18, p. 51; Gennep-Goch - 15, p. 11; 20, p. 49.

Nolanea papillata Bres. *(Rhodophyllus papillatus)*: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 58.

Nolanea pascua: dubieuze naam, waarmee Nolanea cetrata, hirtipes en staurospora bedoeld kan zijn - 8, p. 31; 9, p. 71; 12, p. 16.

Nolanea pisciodora: zie Macrocystidia cucumis.

Nolanea proletaria: dubieuze naam, waarmee Nolanea mammosa en staurospora bedoeld kan zijn - 8, p. 39.

Nolanea rickenii (Romagn.) Konr. et Maubl. *(Rhodophyllus xylophilus* sensu Reijnders?): kenmerken & afb. sporen - 13, p. 31; omgev. Lunteren - 14, p. 27; omgev. Putten (vermoedelijk) - 13, p. 31.

Nolanea staurospora Bres. *(Rhodophyllus staurosporus)*: Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 58.

Nolanea strigosissima Rea *(Rhodophyllus strigosissimus)*: beschrijving - 18, p. 51; Hatert, Hatertse broek - 15, p. 11; 18, p. 51.

Nolanea versatilis (Fr.) Gill.: beschrijving - 14, p. 63-64; Bilthoven, De Pan - 18, p. 7; omgev. Stroe - 14, p. 63.

Nyctalis asterophora: zie Asterophora lycoperdoides.

Nyctalis parasitica: zie Asterophora parasitica.

Ochroporus conchatus (Pers. ex Fr.) Schroet. *(Placodes salicinus, Polyporus conchatus)*: Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40; omgev. Tilburg(?) - 11, p. 61.

Ochroporus pini (Thore ex Fr.) Schroet. *(Trametes pini)*: Delden, "Twickel" - 3, p. 75; 5, p. 41; 9, p. 18.

Ochroporus robustus (Karst.) Schroet.: Delden, "Twickel" - 7, p. 35.
Ochroporus robustus (Karst.) Schroet. f. hippophaes Donk (*Fomes robustus*, duindoornvorm): Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78.
Ochropsora sorbi (Oud.) Dietel: aecid., uredin., telium: Oosterbeek, Duno - 19, p. 41.
Octaviana asterosperma Vitt.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.
Octojuga spec.: Venraay, Oostrum - 14, p. 66.
Ombrophila bataillei Boud.: Mook, Plasmolen, Hellekuil, St. Jansberg - 11, p. 43; 12, p. 43; 20, p. 46.
Ombrophila clavus (Alb. et Schw. ex Fr.) Cooke (N.B. waarschijnlijk identiek met Cudoniella aquatica): Mander, brongebied Mosbeek - 17, p. 38; Mook, Plasmolen - 17, p. 37; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 9, 39; 11, p. 43; 12, p. 43; 20, p. 46; Waalre - 15, p. 32; Waalre, Keersop - 17, p. 46.
Ombrophila faginea (Pers. ex Fr.) Boud.: beschrijving van grote vorm - 8, p. 67; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 8, p. 67; 9, p. 39.
Omphalia asterospora Lange: Schoorl, Zwanenvlak - 7, p. 55.
Omphalia belliae (Johnst.) Karst.: Baarn "Pijnenburg" - 18, p. 47; omgev. Breda - 18, p. 3, 34; Naardermeer - 13, p. 26*; 18, p. 3; Vinkeveen, Botshol - 13, p. 25; 18, p. 3.
Omphalia campanella: zie Xeromphalina campanella.
Omphalia camptophylla: zie Mycena speirea.
Omphalia candida: zie Mycena candida.
Omphalia cornui: zie Xeromphalina cornui.
Omphalia cyathella Favre et Schweers: Geldermalsen - 18, p. 2.
Omphalia demissa (Fr.) Karst. (N.B. zie ook onder Omphalia hepatica): Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.
Omphalia dumosa: zie Omphalia ventosa.
Omphalia gibba: zie Delicatula gibba.
Omphalia gracilis: zie Mycena gracilis.
Omphalia griseo-pallida (Desmaz.) Quel.: Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
Omphalia hepatica sensu Batsch (N.B. dubieuze naam, misschien identiek met Omphalia pyxidata): Bergen, staatsbossen - 11, p. 42.
Omphalia hepatica (dubieuze naam; indien bedoeld sensu Ricken, dan Omphalia demissa): omgev. Epse of Gorssel - 12, p. 20.
Omphalia hydrogramma: zie Clitocybe hydrogramma.
Omphalia integrella: zie Delicatula integrella.
Omphalia maura (Fr.) Gill.: veldkenmerk lamelsplijting - 13, p. 37; Epse, Epser bos - 7, p. 9, 22; 10, p. 41; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; Maarn-Driebergen - 14, p. 77; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.

Omphalia mutilus: zie Pleurotus mutilus.
Omphalia offuciata (Fr.) Gill.: Roermond - 13, p. 34.
Omphalia philonotis (Lasch) Quél. (zie ook onder Omphalia sphagnicola): beschrijving - 11, p. 21; verschil t.o. Omphalia sphagnicola - 11, p. 21-22; 16, p. 9; Gennep, Genneper veen - 11, p. 22*, 43; 20, p. 48; Haren, Hortus - 11, p. 21.
Omphalia postii (Fr.) Karst.: Mook, Plasmolen, omgev. St. Jansberg, De Diepen - 12, p. 6; 13, p. 34; 20, p. 48.
Omphalia pyxidata (Bull. ex Fr.) Quél.: Bergen, staatsbossen - 11, p. 42; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
Omphalia quisquiliaris: zie Mycena quisquiliaris.
Omphalia rustica (Fr.) Quél.: Bergen, staatsbossen - 11, p. 42; Olterterp - 6, p. 38.
Omphalia scyphoides (Fr.) Quél.: verschil t.o. Pleurotus mutilus - 8, p. 64; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; De Lutte - 9, p. 10.
Omphalia sphagnicola (Berk.) Karst. (N.B. wellicht slechts varieteit van, wellicht ook identiek met Omphalia philonotis): sporenmaten - 16, p. 9; verschil t.o. Omphalia philonotis - 11, p. 21-22; 16, p. 9; Eindhoven Kanunnekesven - 19, p. 64; Hatert, Hatertse vennen - 9, p. 39; Hatert, Uivernest - 16, p. 9, 31; omgev. Krommenie (nadere informatie) - 17, p. 43.
Omphalia striaepilea (Fr.) Gill. sensu Karst.: Bergen, De Franschman - 7, p. 56.
Omphalia swartzii: zie Mycena fibula var. swartzii.
Omphalia tricolor: zie Marasmius tricolor.
Omphalia typhae Schweers: beschrijving - 6, p. 79-80; Schoorl, duin-moeras - 6, p. 80; 18, p. 3.
Omphalia umbellifera (L. ex Fr.) Quél. *(Omphalia viridis)*: omgev. Enschede (nadere informatie) - 17, p. 42; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 72; omgev. Helenaveen - 17, p. 23; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.
Omphalia ventosa (Bull. ex Fr.) Gill. *(Omphalia dumosa)*: Bergen, staatsbossen - 11, p. 42-43.
Omphalia viridis sensu Lange: zie Omphalia umbellifera.
Onygena corvina Alb. et Schw. ex Fr.: diagnose - 17, p. 38; Aerdenhout "Naaldenveld" - 17, p. 38; Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; 17, p. 38; Eindhoven-Heeze - 17, p. 46; Westzaan - 17, p. 38.
Oospora (Monilia) fimicola (Cost. et Matr.) Cuboni et Megliola: begeleider champignoncultuur - 8, p. 46.
Otidea alutacea (Pers. ex Fr.) Boud.: omgev. Eindhoven - 15, p. 11, 32.
Otidea grandis (Pers. ex Cooke) Massee: Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p 55.

Otidea leporina (Batsch ex Fr.) Fuck.: Boxtel-Best,"Veldersbosch" - 17, p. 7; Texel, staatsbossen - 7, p. 35, 56.
Otidea onotica (Pers. ex Fr.) Fuck.: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 6, p. 38; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Wassenaar,"Raaphorst" - 15,p. 5.
Oudemansiella mucida (Schrad. ex Fr.) v.Höhn. *(Armillaria mucida)*: voorkomen op eik - 14,p.32; Overveen,"Elswout" - 4,p.47; 5,p.38; Wassenaar,"Duinrel" - 14,p.32; Wassenaar,"Raaphorst" - 12,p.47; 18,p.9.
Oudemansiella radicata (Relh. ex Fr.) Sing. *(Collybia radicata)*: Denekamp - 10, p. 40; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 31.
Oxyporus populinus (Fr.) Donk: Bergen-Schoorl - 5, p. 60.
Pachydisca nobilis Vel.: Oosterhout, "Oosterhout" (onzeker) - 17, p. 6.
Pachydisca umbilicata Le Gal: Nijmegen, Berg en Dal - 17, p. 6; Oosterhout, "Oosterhout" - 17, p. 6.
Pachyphloeus melanoxanthus Tul.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 17. p.64, 18, p. 34.
Panaeolina foenisecii (Pers. ex Fr.) Maire *(Psilocybe foenisecii)*: beschrijving & ruwsporigheid - 4, p. 15-16; Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28; Veendam - 4, p. 15.
Panaeolus campanulatus (L. ex Fr.) Quél.: zie Panaeolus sphinctrinus.
Panaeolus fimicola (Fr.) Gill.: begeleider champignoncultuur - 8,p.47; omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17, p. 45;
Panaeolus papilionaceus (Bull. ex Fr.) Quél.: begeleider champignoncultuur - 8,p.47; Gorssel - 7,p.77; Loosduinen,kassen - 3,p.77; Nieuw Beerta - 6,p.15,32; Oostkapelle,"Zeeduin"(nadere informatie) - 8,p.29.
Panaeolus retirugis (Fr.) Quél.: facultatief mestbewoner - 8, p. 40. Groesbeek - 13, p. 34.
Panaeolus separatus: zie Anellaria semiovata.
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél. *(Panaeolus campanulatus)*. facultatief mestbewoner - 8, p. 40; Bergen-Schoorl - 9, p. 68; omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17, p. 45; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30; Haarlem, omgev. Haarlemmer Hout - 5, p. 57; Hengelo - 17, p. 43; omgev. Maarsbergen - 17, p. 24-25.
Panaeolus subbalteatus (Berk. et Br.) Sacc.: omgev. Stroe - 14, p. 63; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
Panellus mitis (Pers. ex Fr.) Sing. *(Pleurotus mitis)*: verschil t.o. Claudopus variabilis en Panus stipticus - 5, p. 73-74*.
Panellus stipticus (Bull. ex Fr.) Karst. *(Panus stipticus)*: verschil t.o. Pleurotus mitis - 5, p. 73-74; omgev. Amersfoort - 17, p. 10; omgev. Amsterdam - 17, p. 10; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; 's-Gravenzande, Staalduinen - 11, p. 65.

Panellus stipticus (Bull. ex Fr.) Karst. var. albidotomentosus (Cooke et Massee) Konr. et Maubl. *(Panus stipticus* var *albidotomentosus)* 's-Gravenzande, Staalduinen - 11, p. 65.

Panus stipticus: zie Panellus stipticus.

Panus stipticus var. *albidotomentosus*: zie Panellus stipticus var. albidotomentosus.

Papulospora byssina Hotson: begeleider champignoncultuur - 8, p. 47; Naaldwijk - 8, p. 47.

Patella albo-spadicea (Grev.) Seaver: Kootwijk, staatsbossen - 12, p. 43.

Paxillus atrotomentosus (Batsch ex Fr.) Fr.: Breda, Mastbosch - 1, p. 53; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11.

Paxillus extenuatus: dubieuze naam; P. ext. Fr. = Rhodopaxillus mundulus; P. ext. sensu Ricken = Clitocybe alexandri - 11, p. 64-65.

Paxillus involutus (Batsch ex Fr.) Fr.: voorkomen op hout - 13, p. 35-36*, 56-57* voorkomen op boom - 14, p. 33; omgev. Amersfoort - 2, p. 11, Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Epe - 13, p. 35; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Rijswijk, "Te Werve" - 14, p. 33; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Ulvenhout - 1, p. 53; 3, p. 75; Wassenaar, "Raaphorst" - 13, p. 56.

Paxillus panuoides (Fr. ex Fr.) Fr.: voorkomen op dwarsliggers van coniferenhout - 6, p. 44; Amersfoort - 2, p. 12; Ter Apel - 2, p. 52; Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Beekhuizen - 5, p. 40; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; Epse, Epser bos - 10, p. 41; 's-Gravenhage, binnenshuis - 16, p. 48; omgev. Haarlem - 6, p. 39; De Lutte - 9, p. 10; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; omgev. Valkenburg ("Bergwerkform") - 10, p. 29; Winterswijk, Woold - 11, p. 17.

Paxillus rhodoxanthus: zie Phylloporus rhodoxanthus.

Paxina compressa Snijder: beschrijving - 8, p. 66; Doetinchem, "Slangenburg" - 8, p. 66; 13, p. 25.

Paxina corium (Weberb.) Seaver *(Cyathipodia corium)*: Eindhoven - 15, p. 11 11.

Paxina leucomelas (Pers. ex) O. Kuntze *(Peziza leucomelas)*: omgev. Chaam - 6, p. 35.

Paxina sulcata (Pers. ex Fr.) O. Kuntze *(Acetabula sulcata)*: Enschede, "Hooge Boekel" (nadere informatie) - 10, p. 58.

Penicillium notatum Westl.: habitustekening - 15, p. 29.

Peniophora gigantea (Fr.) Massee *(Corticium giganteum)*: aantastingsbeeld bij Douglas-sparren - 8, p. 65; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; Putten, "Schovenhorst" - 8, p. 64.

Peridermium oblongisporium Fuck.: waarschijnlijk aecid. stad. van Coleosporium senecionis - 19, p. 40.
Peridermium pini (Willd.) Kleb.: aecid.: Bennekom - 19, p. 42; Wageningen - 19, p. 42.
Peristomialis lepidula: zie Cyathicula lepidula.
Peristomialis marchantiae: zie Cyathicula marchantiae.
Peronospora violacea Berk.: beschrijving & afb. - 14, p. 73; aantastingsbeeld bij Knautia arvensis - 14, p. 72; Bakkum - 14, p. 72.
Peziza aurantia Pers. ex Fr. *(Aleuria aurantiaca):* Ter Apel - 2, p. 52; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; omgev. Chaam - 6, p. 34-35; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Egmond aan Zee - 6, p. 72; Eindhoven - 7, p. 46.
Peziza badia: zie Galactinia badia.
Peziza clypeata Schw.: omgev. Breda - 18, p. 34.
Peziza echinospora Karst. *(Plicaria echinospora)* (N.B. misschien identiek met Galactinia emileia (Cooke) Boud.?): Gorssel, "'t Amelte" - 7, p. 56; Haren, Hortus - 10, p. 39.
Peziza fructigena: zie Helotium fructigenum.
Peziza gerardi Cooke: wellicht identiek met Galactinia ionella?
Peziza hemisphaerica: zie Lachnea hemisphaerica.
Peziza leucomelas: zie Paxina leucomelas.
Peziza melaloma: zie Lachnea melaloma.
Peziza roseo-lilacina Clements *(Lachnea roseo-lilacina)* (determinatie en plaats van de soort in het systeem onzeker): Epse, Epser bos - 12, p. 6; Markelo - 11, p. 43; 12, p. 6; Mook, Plasmolen - 12, p. 6; 13, p. 34; 20, p. 48.
Peziza rutilans Fr. sensu Boud. *(Humaria rutilans):* Amsterdam - 8, p. 55; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 12, p. 24; Egmond aan de Hoef - De Franschman - 5, p. 60; omgev. Rijswijk - 11, p. 25.
Peziza scutellata: zie Lachnea scutellata.
Peziza theleboloides: zie Humaria theleboloides.
Peziza tuberosa: zie Sclerotinia tuberosa.
Peziza vesiculosa: zie Aleuria vesiculosa.
Pezizella aspidiicola (Berk. et Br.) Rehm : Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 40, 48; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 20, p. 47.
Phaeobulgaria inquinans (Pers. ex Fr.) Nannf. *(Bulgaria inquinans):* omgev. De Lutte - 10, p. 36; De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18; Wassenaar, "Raaphorst" - 12, p. 47; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.
Phaeocollybia festiva (Fr.) Heim *(Naucoria festiva):* verschil t.o. Naucoria myosotis - 6, p. 64.
Phaeocollybia hilaris (Fr. sensu Ricken) Romagn. *(Naucoria hilaris):* Egmond aan Zee, duinen - 7, p. 56.

Phaeolepiota aurea (Mattuschka ex Fr.) Maire *(Pholiota aurea)*. Delden "Twickel" - 5, p. 41

Phaeolus rutilans: zie Hapalopilus nidulans.

Phallus caninus: zie Mutinus caninus.

Phallus hadriani (Vent.) Pers. *(Phallus iosmos)* verschil t.o. Phallus impudicus - 6, p. 6; 7, p. 38-39, 53-54*; omgev. Amersfoort - 14, p. 65; 's-Gravenhage - 6, p. 6; omgev. 's-Gravenhage ("Duinrel"?) - 6, p. 38; Huizen, haven - 10, p. 40; Voorne, Rockanje, duinen - 19, p. 24; Wassenaar, Meiendel - 19, p. 11; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 76.

Phallus impudicus L. ex Pers. *(Ithyphallus impudicus)*. verschil t.o. Phallus hadriani - 7, p. 38-39; 53-54; lengtedoorsnede ei - 11, p. 51*-52*; vliegenbezoek op hoed - 3, p. 33; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Breda, Mastbosch (teratologicum) - 11, p. 12*; 's-Graveland "Bantam" - 16, p. 46; Hulshorst - 12, p. 49; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; Mook, Plasmolen, St. Martensberg - 12, p. 30; Rozenburg, De Beer (zou Ph. hadriani kunnen zijn) - 2, p. 65; Ulvenhout - 3, p. 33, 75; Vaals, Drielandenpunt - 8, p. 27; Wassenaar, "Raaphorst" - 14, p. 78.

Phallus iosmos: zie Phallus hadriani.

Phellodon amicus (Quél.) Banker *(Hydnum amicum)*. omgev. Bilthoven (onzeker) - 10, p. 40.

Phellodon melaleucus (Fr.) Karst. *(Hydnum melaleucum)*. Amersfoort - 2, p. 12; omgev. Bilthoven - 10, p. 40; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46.

Phellodon niger (Fr.) Karst. *(Hydnum nigrum)*. omgev. Bilthoven - 10, p. 39; Wolfheze, "Buunderkamp" - 6, p. 39.

Phellodon tomentosus (Fr) Banker *(Hydnum tomentosum)*. Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.

Phlebia aurantiaca: zie Phlebia radiata.

Phlebia radiata Fr. em. Donk *(Phlebia aurantiaca)*: Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; Wassenaar, "Raaphorst" - 12, p. 47; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.

Phlegmacium: subgenus van Cortinarius.

Pholiota aurea: zie Pheaolepiota aurea.

Pholiota aurivella (Batsch ex Fr.) Quél.: Amerongen - 7, p. 35; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; omgev. Haarlem - 14, p. 61; De Steeg, "Middachten", Middachter Allee - 8, p. 18; Vogelenzang - 5, p. 66; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 9, 75.

Pholiota caperata: zie Rozites caperata.

Pholiota cylindracea: zie Agrocybe aegerita.
Pholiota destruens (Brond.) Quél.: habitusfoto - 19, p. 25; Aalst, kistenfabriek - 14, p. 60; Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77.
Pholiota dura: zie Agrocybe dura.
Pholiota erebia: zie Agrocybe erebia.
Pholiota flammans (Fr.) Quél.: Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4, Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7; Enschede, "Smalenbroek" - 9, p. 18; Gorssel, " 't Amelte" - 7, p. 24; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; omgev. Oosterwolde - 5, p. 41; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13.
Pholiota marginata: zie Galerina marginata.
Pholiota mutabilis (Schaeff. ex Fr.) Quél.: beschrijving & afb. - 9, p. 57-58; vegetatiefoto - 6, p. 1; omgev. Aalst - 14, p. 60; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; omgev. Maarsbergen - 17, p. 24-25; Nijmegen, "Duckenburg" (teratologicum) - 11, p. 43; omgev. Wageningen - 9, p. 57.
Pholiota mycenoides: zie Galerina mycenoides.
Pholiota ombrophila: zie Agrocybe ombrophila.
Pholiota praecox: zie Agrocybe praecox.
Pholiota praecox subsp. *sphaleromorpha:* zie Agrocybe sphaleromorpha.
Pholiota radicosa: zie Hebeloma radicosum.
Pholiota spectabilis (Fr.) Quél.: Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Walcheren (waar?) - 5, p. 31; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.
Pholiota squarrosa (Pers. ex Fr.) Quél.: Amersfoort - 2, p. 12; De Steeg, Middachter Allee - 8, p. 18; Tilburg, Breda'se weg - 11, p. 62; Vogelenzang - 5, p. 66; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 9, 75.
Pholiota togularis: zie Conocybe togularis.
Pholiota tuberculosa (Schaeff. ex Fr.) Gill.: Castricum, Geversduin - 6, p. 57; Delden, "Twickel" - 7, p. 35.
Pholiota unicolor: zie Galerina unicolor.
Phragmidium subcorticium (Schrank ex) Wint.: aecid., uredin., telium: Wageningen - 19, p. 40.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint.: Bilthoven, Panbos - 19, p. 23; aecid., uredin , telium: Bennekom - 19, p. 40; Wageningen, Dorskamp, Eng - 19, p. 40.
Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. *(Paxillus rhodoxanthus):* beschrijving - 12, p. 13; gelijkenis met Tricholoma rutilans - 12, p. 13; Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5, 12; Mook, Plasmolen, Kloosterberg - 16, p. 31; 20, p. 49.

Piggotia astroidea Berk.et Br.: beschrijving & afb: - 19, p. 8; conidieen-stadium van Dothidella ulmi (Duv.) Wint. - 19, p. 8-9.

Pilosace algeriensis (Fr) Quél. *(Stropharia epimyces)* (N.B. misschien een Agaricus): parasiet op Coprinus atramentarius comatus - 5, p. 85, 's Gravenzande, Staalduinen - 13, p. 43 (noot); Wageningen, bij de Rijn - 14, p. 30.

Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.) Karst. *(Polyporus betulinus)*: voorkomen op beschadigde berken - 2, p. 79; Bilthoven, De Pan - 18, p. 8. Huis ter Heide, "Coburg" - 2, p. 79; Wassenaar, Meiendel - 6, p. 31*.

Pistillaria quisquiliaris: zie Typhyla quisquiliaris.

Pistillaria setipes Grev. *(Typhula grevillei)*: Eindhoven, Oirschotse dijk - - 19, p. 63.

Placodes salicinus: zie Ochroporus conchatus.

Pleurodon auriscalpium: zie Auriscalpium vulgare.

Pleurotellus acerosus (Fr.) Konr. et Maubl. *(Pleurotus acerosus)*: Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18; Winterswijk, Steengroeve - 11, p. 19.

Pleurotellus septicus (Fr.) Konr. et Maubl. *(Pleurotus septicus)*: Oosterhout, "Oosterhout" - 11, p. 43; 12, p. 30; 13, p. 44.

Pleurotus acerosus: zie Pleurotellus acerosus.

Pleurotus algidus: zie Acanthocystis algidus.

Pleurotus applicatus: zie Acanthocystis applicatus.

Pleurotus atro-caeruleus: Acanthocystis atro-caeruleus.

Pleurotus auriscalpium: zie Acanthocystis auriscalpium.

Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.) Rolland *(Pleurotus cornucopioides)*: beschrijving - 7, p 74; Middelburg - 7, p. 74; Middelburg "Veldzicht" - 8, p. 28; Oostkapelle, "Westhoven" - 7, p. 74.

Pleurotus cornucopioides: zie Pleurotus cornucopiae.

Pleurotus corticatus: zie Pleurotus dryinus.

Pleurotus corticatus var. *tephrotrichus*: zie Pleurotus dryinus var. tephrotrichus.

Pleurotus dryinus (Pers. ex Fr.) Quél. *(Pleurotus corticatus)*: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; Ede, Hoekelom - 5, p. 42; omgev. Haarlem - 6, p. 39; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10 p. 29; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30; Wassenaar, "Rust en Vreugd" - 7, p. 35; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 9.

Pleurotus dryinus (Pers. ex Fr) Quél. var tephrotrichus (Fr.) Sacc. *(Pleurotus corticatus* var. *tephrotrichus)*: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 18, p. 34.

Pleurotus lignatilis (Pers. ex Fr.) Gill.: Boekel - 14, p. 66.

Pleurotus mitis: zie Panellus mitis.
Pleurotus mutilus (Fr.) Gill. sensu Joss.: verschil t.o. Clitopilus cretatus - 8, p. 47-48; verschil t.o. Omphalia scyphoides - 8, p. 64; begeleider champignoncultuur - 8, p. 47-48*; Bergen - 8, p. 63; Hatert, Hatertse vennen - 8, p. 63; 11, p. 42 (onzeker); omgev. Heeze - 8, p. 64; Naaldwijk - 8, p. 47.
Pleurotus olearius: zie Clitocybe olearia.
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Quél.: variabiliteit sporenkleur - 7, p. 42-44; aquarel (Verkade album) - 1, tegenover p. 42; habitusfoto - 19, p. 53; omgev. Aalst - 14, p. 60; Amersfoort - 2, p. 12; omgev. Amsterdam - 7, p. 42; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p 39; Ter Apel - 2, p. 51; Haren, Hortus (afwijking) - 7, p. 37*; Renkum, "Oranje Nassau Oord" - 7, p. 42; Rijswijk - 9, p. 46; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30; omgev. Wageningen - 20, p. 33.
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Quél. f. pulmonarius (Fr.) Pilát *(Pleurotus pulmonarius):* omgev. Wageningen - 7, p. 43.
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Quél. f. salignus (Pers. ex Fr.) Pilát omgev. Wageningen - 7, p. 44*.
Pleurotus palmatus: zie Rhodotus palmatus.
Pleurotus passeckerianus Pilát: zie Clitopilus pinsitus.
Pleurotus petaloides: zie Acanthocystis petaloides.
Pleurotus porrigens (Pers. ex Fr.) Gill. vegetatiefoto - 7, p. 48.
Pleurotus pulmonarius: zie Pleurotus ostreatus f. pulmonarius.
Pleurotus septicus: zie Pleurotellus septicus.
Pleurotus serotinus: zie Acanthocystis serotinus.
Pleurotus spodoleucus (Fr.) Quél. Wageningen (onzeker) - 8, p. 33.
Pleurotus ulmarius: zie Lyophyllum ulmarium.
Plicaria echinospora: zie Peziza echinospora
Plicaria muralis: dubieuze naam, die niet goed is te identificeren met een van de Aleuria en/of Galactinia-soorten der Franse school - 2, p. 6-9; 10, p. 11; 13, p. 29; 14, p. 60; 15, p. 32.
Plicaria setosa: zie Lachnea setosa.
Plicaria vesiculosa: zie Aleuria vesiculosa.
Plicaria violacea (Pers. ex Fr.) Fuck.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7, Eindhoven, Philipsbossen - 18, p. 34; Epse, Epser bos - 7, p. 23; 10, p. 41; Hilversum, Spanderswoud - 7, p. 35.
Pluteolus aleuriatus: zie Bolbitius reticulatus.
Pluteus atromarginatus (Sing.) Kühner: Gorssel, "'t Amelte" - 7, p. 24.
Pluteus cervinus (Schaeff. ex Secr.) Quél.: verschil t.o. Pluteus pellitus - 2, p. 36-37; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Sted. Mus. - 7, p. 59; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Ter Apel - 2, p

36, omgev. Arnhem (nadere informatie) - 18, p. 35; Diepenveen - 7, p. 77; Gorssel - 7, p. 77; omgev. Haarlem - 5, p. 93; 15, p. 32; Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 93; omgev. Maarsbergen 17, p. 26; Mook - 11, p. 40; Wekerom (nadere informatie) - 18, p. 35.

Pluteus chrysophaeus (Schaeff. ex Lasch) Quél.: Ter Apel - 2, p. 51; Bloemendaal, Kraantjelek - 2, p. 51; Breda, Mastbosch - 2, p. 45; Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; Heemstede, "Groenendaal" - 2, p. 51; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; 6, p. 13.

Pluteus cinereo-fuscus Lange: Epse, Epser bos of Gorssel, " 't Hassink" (onzeker) - 12, p. 20.

Pluteus granulatus Bres.: Delden, "Twickel" - 5, p. 41; Walcheren (waar?) - 5, p. 31.

Pluteus hispidulus (Fr.) Quél.: vindplaats onbekend (nadere informatie) - 18, p. 3.

Pluteus leoninus (Schaeff. ex Fr.) Quél.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; Delden, "Twickel" - 9, p. 18; Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; omgev. De Lutte - 10, p. 36; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.

Pluteus lutescens (Fr.) Bres. *(Pluteus nanus* var. *lutescens)*: Best - 19, p. 63; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40; Walcheren (waar?) - 5, p. 31.

Pluteus nanus (Pers. ex Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 9, p. 18; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 13, p. 56; Olterterp - 7, p. 35; Wassenaar, "Raaphorst" - 3, p. 49.

Pluteus nanus var. *lutescens*: zie Pluteus lutescens.

Pluteus patricius (Schulzer) Sacc.: Mook, Mookerheide - 12, p. 48*.

Pluteus pellitus (Pers. ex Fr.) Quél.: beschrijving - 2, p. 36; verschil t.o. Pluteus cervinus - 2, p. 36-37; Ter Apel - 2, p. 35; Bilthoven - 2, p. 35; Denekamp - 2, p. 35; Hengelo - 2, p. 35; Ruurlo, "Medler" - 5, p. 55*; Stadskanaal - 5, p. 55; Winterswijk - 2, p. 35; Zuidlaren - 5, p. 55; Zwolle - 2, p. 35.

Pluteus petasatus (Fr.) Karst.: Winterswijk, houtzagerij - 14, p. 32.

Pluteus phlebophorus (Ditmar ex Fr.) Gill.: Ter Apel - 2, p. 51; Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28; Walcheren (waar?) - 5, p. 31.

Pluteus salicinus (Pers. ex Secr.) Quél.: Heilo, natuurmonument - 3, p. 76; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; 6, p. 13.

Pluteus semibulbosus (Lasch) Gill.: Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42.

Pluteus umbrinellus (Sommerf.) Gill.: Doetinchem, "Slangenburg" - 13, p. 34; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40.
Pluteus umbrosus (Pers. ex Fr.) Quél, sensu Ricken (non Quel., nec Bres.): Beesd, "Marieënweerd" - 19, p. 63; Drempt - 19, p. 62.
Podoporia sanguinolenta (Alb. et Schw. ex Fr.) v. Höhn.: gastheer van Badhamia utricularis - 7, p. 77; Ruurlo, cycloonbos - 7, p. 77.
Podoporia vitrea (Fr.) Donk *(Polyporus adiposus)*: Veenendaal, "Prattenburg" - 8, p. 17.
Podospora coprophila (Fr.) Rehm: kenmerken & afb. - 17, p. 32-33.
Polypilus frondosus (Dicks. ex Fr.) Karst. *(Polyporus frondosus)*: verschil t.o. Polyporus giganteus - 5, p. 70*-71; voorkomen op beuk - 11, p. 27; Ruurlo, cycloonbos - 11, p. 27; Slochteren, Slochter bos - 6, p. 38.
Polypilus giganteus (Pers. ex Fr.) Donk *(Polyporus giganteus)*: verschil t.o. Polyporus frondosus - 5, p. 71*; Amsterdam, Leidsche Boschje - 11, p. 24; Amsterdam, Vondelpark - 8, p. 38; omgev. Baarn - 14, p. 77, Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25; Renkum, "Oranje Nassau Oord" - 11, p. 11; Ruurlo, "Groote Meene" - 5, p. 71; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.
Polyporus abietinus: zie Hirschioporus abietinus.
Polyporus adiposus: zie Podoporia vitrea.
Polyporus adustus: zie Bjerkandera adusta.
Polyporus applanatus: zie Ganoderma applanatum.
Polyporus arcularius Batsch ex Fr.: habitustekening - 10, p. 10; 12, p. 15; Delden, "Twickel" - 12, p. 16.
Polyporus betulinus: zie Piptoporus betulinus.
Polyporus brumalis Pers. ex Fr.: habitustekening - 10, p. 10; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 18, p. 19.
Polyporus caesius: zie Tyromyces ceasius.
Polyporus calceolus: zie Polyporus varius.
Polyporus chioneus: zie Tyromyces semipileatus.
Polyporus conchatus: zie Ochroporus conchatus.
Polyporus cuticularis: zie Inonotus cuticularis.
Polyporus elegans: zie Polyporus varius subsp. elegans.
Polyporus fomentarius: zie Fomes fomentarius.
Polyporus forquignonii Quél.: Haarlem, "Eindenhout" - 5, p. 39; Overveen, "Elswout" - 5, p. 39.
Polyporus frondosus: zie Polypilus frondosus.
Polyporus fuliginosus: zie Ischnoderma resinosum.
Polyporus fumosus: zie Bjerkandera fumosa.
Polyporus fumosus var. *fragrans*: onbetekenende vorm van Bjerkandera fumosa.

Polyporus giganteus: zie Polypilus giganteus.
Polyporus hispidus: zie Inonotus hispidus.
Polyporus lucidus: zie Ganoderma lucidum.
Polyporus melanopus Sw. ex Fr.: 's-Gravenhage - 14, p. 66; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40.
Polyporus mollis: dubieuze naam, misschien bedoeld Tyromyces fragilis ? - 3, p. 66.
Polyporus perennis: zie Polystictus perennis.
Polyporus picipes Fr.: Nieuw Beerta - 6, p. 32; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40; Wageningen, Lexkesveer - 13, p. 30
Polyporus pubescens: zie Coriolus pubescens.
Polyporus rufescens: zie Heteroporus biennis.
Polyporus rutilans: zie Hapalopilus nidulans.
Polyporus schweinitzii: zie Hapalopilus schweinitzii.
Polyporus squamosus (Huds. ex) Fr.: grote afmetingen - 16, p. 48; sporenproductie - 10, p. 65; gastheer van Collybia tuberosa - 5, p. 85; Amsterdam, Vondelpark - 5 p. 70; 7, p. 59; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; 's-Gravenhage - 16, p. 48; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; omgev. Haarlem - 5, p. 93; Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 92; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Overveen-Zandvoort - 17, p. 25; Rijswijk - 6, p. 31; Wassenaar, "Raaphorst" - 12, p. 80; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 9.
Polyporus squamosus (Huds. ex) Fr. f. erectus Bres.: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 6, p. 38.
Polyporus sulphureus: zie Tyromyces sulphureus.
Polyporus tuberaster Jacq. ex Fr.: beschrijving - 13, p. 3-4; Alkmaar, Alkmaarder Hout (pseudo-sclerotia) - 13, p. 2; Alkmaar, Alkmaarder Hout (vruchtlichaam) - 17, p. 38; Oegstgeest, "Oud-Poelgeest" (vruchtlichaam) - 13, p. 2*-3*.
Polyporus ungulatus: zie Fomes pinicola.
Polyporus varius Pers. ex Fr. *(Polyporus calceolus)*: omgev. Chaam (onzeker) - 6, p. 35; omgev. Ede (nadere informatie) - 18, p. 35; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.
Polyporus varius Pers. ex Fr. subsp. elegans (Fr.) Donk *(Polyporus elegans)*: Walcheren (waar?) - 8, p. 29.
Polyporus versicolor: zie Coriolus versicolor.
Polyporus vulpinus: zie Inonotus vulpinus.
Polystictus cinnamomeus (Jacq. ex Pers.) Sacc.: verschil t.o. Polyporus perennis - 12, p. 27; Delden - 12, p. 27; Deventer, park Brabant - 12, p. 27; Diepenveen, Molenweg - 12, p. 27.

Polystictus perennis (L. ex Fr.) Karst. *(Polyporus perennis)*: verschil t.o. Polyporus cinnamomeus - 12, p. 27; gastheer van Claudopus subdepluens - 5, p. 85; Baarn, "Groeneveld" - 13, p. 10; Hilversum-Baarn - 13, p. 19.
Poromycena decipiens v. Ov.: habitustekening & details - 9, p. 3.
Poronia punctata (L. ex Fr.) Fr.: beschrijving & afb. - 9, p. 68*, 69*; 70 ; verschil tussen fungi op konijnenmest en paardenmest - 9, p. 69-70; omgev. Bergen - 9, p. 29, 68-69; 11, p. 42.
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilbert: diagnose - 18, p. 18.
Psalliota: zie Agaricus.
Psalliota ammophila: zie Agaricus xanthodermus var. ammophilus.
Psalliota campestris var. *vaporaria*: zie Agaricus villaticus.
Psalliota cretacea: dubieuze naam, misschien bedoeld Agaricus xanthodermus.
Psalliota echinata: zie Lepiota echinata.
Psalliota sylvatica var. *haemorrhoidaria*: zie Agaricus haemorrhoidarius.
Psathyra bifrons (Berk.) Sacc. (N.B. moet een Psathyrella worden?): Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70.
Psathyra conopilea: zie Psathyrella conopilea.
Psathyra consimilis: zie Psathyrella pygmaea.
Psathyra fagicola (Lasch) Ricken (N.B. moet tot Psathyrella worden gerekend): Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 56.
Psathyra fibrillosa: zie Psathyrella spadiceo-grisea var. fibrillosa.
Psathyra gossypina: zie Psathyrella gossypina.
Psathyra lactea Lange f. *virginea* Lange (N.B. moet een Psathyrella zijn?): Oosterhout, "Oosterhout" - 15, p. 11.
Psathyra nolitangere: zie Psathyrella noli-tangere.
Psathyra pennata: zie Psathyrella pennata.
Psathyra subatrata: zie Psathyrella subatrata.
Psathyra typhae: zie Psathyrella typhae.
Psathyra urticicola (Berk. et Br.) Sacc. (N.B. moet tot Psathyrella gerekend worden?): Hatert - 14, p. 66.
Psathyra spec.: Geldermalsen - 18, p. 3.
Psathyrella atomata (Fr.) Quél.: verschil t.o. Psathyrella gracilis - 5, p. 57-58*; Veendam - 5, p. 57-58.
Psathyrella candolleana (Fr.) A.H.Smith *(Hypholoma candolleanum)*: Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; 7, p. 60 (onzeker): Bloemendaal - 5, p. 93; Rijswijk, Hoornbrug - 5, p. 94.
Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konr. et Maubl. *(Hypholoma, Stropharia caput-medusae)*: afb. sporen en cystiden - 8, p. 50; verschil t.o. Stropharia jerdonii - 6, p. 68; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 51.

Psathyrella casca (Fr.) Sing. *(Hypholoma cascum)*: Boekel - 15, p. 11; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17 (naderhand herzien als H. caput medusae, zie aldaar).

Psathyrella caudata (Fr.) Quél.: Alkmaar - 7, p. 56.

Psathyrella conopilea (Fr.) Quél. *(Psathyra conopilea)*: Oosterhout "Oosterhout" - 13, p. 42; Rijswijk - 9, p. 46.

Psathyrella disseminata: zie Coprinus disseminatus.

Psathyrella gossypina (Bull. ex Fr.) Sing. *(Psathyra gossypina)*: Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17.

Psathyrella gracilis (Pers. ex Fr.) Quél. verschil t.o. Psathyrella atomata - 5, p. 57-58*; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30; Veendam - 5, p. 57-58.

Psathyrella hydrophila (Bull. ex Fr.) Sing. *(Bolbitius hydrophilus, Hypholoma hydrophilum)*. Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.

Psathyrella hypsipoda (Fr.) Konr. et Maubl. *(Stropharia hypsipoda)*: Delden - 14, p. 8.

Psathyrella jerdonii (Berk. et Br.) Konr. et Maubl. *(Stropharia jerdonii)*: beschrijving & afb. - 6, p. 66-67; verschil t.o. Stropharia caput medusae - 6, p. 68; Drouwen, Drouwenerzand - 6, p. 66.

Psathyrella noli-tangere (Fr.) Sing. *(Psathyra nolitangere)*: beschrijving - 12, p. 59; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 59.

Psathyrella pennata (Fr. sensu Ricken) Sing. (N.B. sensu Lange = Drosophila plumulosa Romagn.): Epse, Epser bos - 7, p. 9, 22; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20.

Psathyrella pygmaea (Quél.) Sing. *(Psathyra consimilis)*: Nijmegen, omgev. Waalbrug - 10, p. 37; 11, p. 40.

Psathyrella scobinacea (Fr.) Sing. *(Hypholoma melantinum)* beschrijving & afb. - 14, p. 57; Ruurlo, cycloonbos - 5, p. 43*; 14, p. 57.

Psathyrella spadiceo-grisea (Schaeff. ex Fr.) A.H.Smith *(?Psilocybecernua)*: Walcheren (waar?) - 8, p. 29.

Psathyrella spadiceo-grisea (Schaeff. ex Fr.) A.H.Smith var. fibrillosa (Pers. ex Fr.) Konr. et Maubl. *(Psathyra fibrillosa)*: omgev. Wijster biol. station - 12, p. 59.

Psathyrella stipatissima Lange (N.B. volgens Romagnesi synoniem van Psathyra fasciculata Bertrand, welke tot Psathyrella te rekenen): Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.

Psathyrella subatrata (Batsch ex Fr.) Gill. *(Psathyra subatrata)*: Amsterdam Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Roermond "Ahrwinkel" en/of

"Munnicksbosch" - 10, p. 29; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72; Winterswijk-Bekkendellen - 11, p. 17.

Psathyrella typhae (Kalchbr.) Sing. *(Psathyra typhae)*: omgev. Breda - 18, p. 34; Geldermalsen - 10, p. 37; Schoorl, Overval - 7, p. 55.

Pseudoplectania nigrella (Pers. ex Fr.) Fuck.: Hilversum, "Zonnestraal" - 15, p. 32; Mook, Plasmolen - 10, p. 37; 12, p. 42; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 20, p. 47; Schoorl - 6, p. 90.

Psilocybe ammophila (Dur. et Lév.) Gill.: Walcheren, duinen - 5, p. 31.

Psilocybe atro-brunnea (Lasch) Gill.: Boxmeer (nadere informatie) - 18, p. 3.

Psilocybe bullacea: zie Deconica bullacea.

Psilocybe callosa (Fr.) Quél.: Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.

Psilocybe cernua: dubieuze soort, waarschijnlijk identiek met Psathyrella spadiceo-grisea.

Psilocybe coprophila: zie Deconica coprophila.

Psilocybe ericaea: zie Hypholoma ericaeum.

Psilocybe foenisecii: zie Panaeolina foenisecii.

Psilocybe physaloides: zie Deconica physaloides.

Psilocybe sarcocephala (Fr.) Gill. (dubieus! P. sarcocephala sensu Lange = Psilocybe spadicea): Bergen-Schoorl - 5, p. 60; 9, p. 29; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; Rotterdam - 16, p. 18; Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66.

Psilocybe semilanceata (Fr. ex Fr.) Quél. (foutief als Ps. semilanceolata). Beekhuizen - 5, p. 40.

Psilocybe semilanceolata: verschrijving voor Psilocybe semilanceata.

Psilocybe spadicea (Schaeff. ex Fr.) Quél.: De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; omgev. Haarlem - 14, p. 61; Hilversum, "Hilverbeek" - 18, p. 47.

Psilocybe turficola J.Favre: Hatert, Hatertse vennen - 15, p. 11.

Psilopezia oocardii (Kalchbr.) Sacc. (wellicht identiek met Psilopezia aquatica (Lam. et D.C. ex) Rehm?): Mook, Plasmolen, Groene Water Sprengen - 16, p. 31; 20, p. 49.

Ptychogaster albus: zie Tyromyces ptychogaster.

Puccinia absinthii D.C. uredin. telium Bennekom, Oude Tol - 19, p. 38.

Puccinia acetosae (Schum.) Körn. uredin., telium: Wageningen, Binnenveld, Grebbedijk - 19, p. 38.

Puccinia aegopodii (Schum.) Mart., telium: Bennekom, Kerkhof, Nergena - 19, p. 38; Doorwerth, Onderlangs - 19, p. 38; Wageningen, Dorskamp, Eng - 19, p. 38.

Puccinia antirrhini Diet. et Holw.: uredin., telium: Wageningen, Arboretum - 19, p. 40.

Puccinia calthae Link., uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 39.

Puccinia caricis: zie Puccinia urticae-caricis.
Puccinia centaureae D.C.: uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 38.
Puccinia cichorii (D C.) Bell.: uredin., telium: Wageningen, Dijkgraaf, Eng - 19, p. 38.
Puccinia cirsii-lanceolati Schroet.: aecid., uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 38.
Puccinia coronata Corda: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 39.
Puccinia cyani (Schleich.) Pass.: uredin., telium: Wageningen, Eng - 19, p. 38.
Puccinia deminuta Vleugel: uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 39.
Puccinia dispersa Erikss.: aecid.: Bennekom - 19, p. 39; Wageningen, Eng - 19, p. 39: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 39.
Puccinia fusca (Pers.) Wint.: telium: Bennekom, Nergena - 19, p. 38; Doorwerth, Onderlangs - 19, p. 38.
Puccinia glechomatis D.C.: telium: Wageningen Binnenhaven - 19, p. 39.
Puccinia glumarum (Schmidt) Erikss et Henn. uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 39.
Puccinia graminis Pers. uredin., telium. Wageningen, Binnenhaven, Nude - 19, p. 38; aecid.: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 38.
Puccinia magnusiana Körn. verschil t.o. Puccinia phragmitis - 20, p. 50*-51; uredin., telium: Wageningen, Grift: 20, p. 50.
Puccinia malvacearum Mont. telium: Wageningen, Dijk - 19, p. 39.
Puccinia maydis Bereng., uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 39.
Puccinia menthae Pers.: uredin., telium: Wageningen Binnenveld - 19, p. 38.
Puccinia opizii Bubák: aecid.: Wageningen - 19, p. 39.
Puccinia phragmitis (Schum.) Korn.: verschil t.o. Puccinia magnusiana - 20, p. 50*-51; telium: Doorwerth, De Zalmen - 19, p. 39; Wageningen, Binnenveld - 19, p. 39; telium, uredin.: Bennekom - 20, p. 49; Doorwerth - 20, p. 49; Neerijnen - 20, p. 49; Wageningen - 20, p. 49.
Puccinia polygoni Alb. et Schw.: zie Puccinia polygoni-amphibii.
Puccinia polygoni-amphibii Pers. *(Puccinia polygoni)*. uredin., telium: Wageningen, Binnenveld, Grift - 19, p. 39.
Puccinia pruni-spinosae Pers.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 38.
Puccinia ribesii-caricis Kleb.: aecid.: Wageningen, Lage Steeg - 19, p. 39.
Puccinia schoeleriana Plowr. et Magn.: omgev. Haarlem - 5, p. 18; Vogelenzang - 5, p. 18.

Puccinia silvatica Schroet.: aecid., uredin., telium: Doorwerth, De Zalmen - 19, p. 39.
Puccinia smilacearum-digraphidis Kleb.: aecid.: Wageningen, Bergrand - 19, p. 39.
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr.: aecid., uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven, Binnenveld - 19, p. 38.
Puccinia tanaceti D.C.: uredin., telium: Renkum, "Oranje Nassau Oord" - 19, p. 38.
Puccinia taraxaci (Reb.) Plowr.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p 38.
Puccinia thalictri Chev.: telium: Wageningen, Binnenveld: 19, p. 38.
Puccinia triticina Erikss.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven 19, p. 39.
Puccinia urticae-caricis (Schum.) Reb. *(Puccinia caricis)*: aecid., uredin., telium: Doorwerth, Onderlangs, De Zalmen - 19, p. 39; Rhenen - 18, p. 28; Wageningen, Binnenhaven, Binnenveld, Grebbedijk - 19, p. 39.
Pulvinula constellatio (Berk. et Br.) Boud. *(Barlaea constellatio)*: Hengelo - 12, p. 24.
Pulvinula haemastigma (Hedw.) Boud. *(Barlaea Peziza convexella)*: Eindhoven, Rijkskrankzinnigengesticht - 19, p. 64; Mook, Plasmolen, Groene Water - 12, p. 24; 20, p. 48.
Pustularia patavina (Cooke et Sacc.) Boud.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.
Pustularia stevensoniana: dubieuze soort - 7, p. 56.
Pustularia vesiculosa: zie Aleuria vesiculosa.
Pyronema confluens: zie Pyronema omphalodes.
Pyronema omphalodes (Bull. ex Fr.) Fuck. *(Pyronema confluens)*: Wageningen, kas - 17, p. 34.
Pythium spec.: ontwikkelingsstadia - 17, p. 62; 18, p. 11.
Rachomyces philonthinus Thaxter: beschrijving & afb. (als Rachomyces spec.) - 13, p. 52-53; habitustekening - 14, p. 71.
Rachomyces spec.: beschrijving & afb. - 13, p. 52-53: blijkt te zijn R. philonthinus - 14, p. 57*.
Ramaria aurea (Schaeff. ex Fr.) Quél. *(Clavaria aurea)*: Amersfoort - 2 p. 12.
Ramaria botrytis (Pers. ex Fr.) Ricken *(Clavaria botrytis)*: omgev. Bilthoven - 10, p. 40.
Ramaria cristata: zie Clavulina cristata.
Ramaria flaccida (Fr.) Ricken *(Clavaria abietina* f. *flaccida)*: Hooge Vuursche - 19, p. 67.
Ramaria flava (Pers. ex Fr.) Quél.: omgev. Delden - 14, p. 51.

Ramaria formosa (Pers. ex Fr.) Quél. omgev. Delden - 14, p. 51.
Ramaria mairei Donk *(Clavaria pallida)*: beschrijving - 14, p. 51; omgev. Delden - 14, p. 51.
Ramaria ochraceo-virens (Jungh.) Donk *(Clavaria abietina)* Amersfoort - 2, p. 12; omgev. Delden - 14, p. 51; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42.
Ramaria stricta (Pers. ex Fr.) Quél.: Nieuw Beerta - 6, p. 32.
Reticularia lycoperdon Bull. (Myxomycetes) Wageningen - 9, p. 57.
R(h)acodium cellare Pers. ex Pers. (myce lium sterile): Maastricht - 10, p. 65.
Rhizina inflata: zie Rhizina undulata.
Rhizina undulata Fr. ex Fr. *(Rhizina inflata)*. parasiet op dennen - 12, p. 46*; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; omgev. Eindhoven - 15, p. 31; Epse, Epser bos - 7, p. 10, 23; 10, p. 41; Hilversum, Spanderswoud - 7, p. 35; Lheebroekerzand - 16, p. 46; Loosduinen, "Ockenburg" - 12, p. 46; Markelo- Rijssen - 12 p. 14; Oisterwijk, Campinaheide - 19, p. 64; Wassenaar, Meiendel - 13, p 15.
Rhizophydium acuforme (Zopf) Fischer (foutief als Rh. pollinis) omgev. Enschede - 17, p. 21*, 32.
Rhizophydium pollinis onjuiste determinatie; zie Rhizophydium acuforme.
Rhizopogon luteolus Fr. et Nordh. Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Eindhoven, Oirschotse dijk - 17, p. 64; Hilversum-Baarn - 13, p. 19.
Rhizopogon rubescens Tul. Oisterwijk - 17, p. 64; St. Michielsgestel - 19, p. 63.
Rhodopaxillus irinus (Fr.) Kühner *(Tricholoma irinum)* Aerdenhout "Naaldenveld" - 5, p. 41; Egmond aan de Hoef - De Franschman - 5 p 60; omgev. Haarlem - 6 p 39; Overveen, 'Elswout - 4, p. 47; Vogelenzang - 6, p. 39.
Rhodopaxillus mundulus zie Clitopilopsis mundulus.
Rhodopaxillus nudus (Bull ex Fr.) Maire *(Tricholoma nudum)*: habitustekening - 10, p. 22; Amsterdam Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Haarlem stadstuin - 3, p. 12; omgev Haarlem - 5, p. 93; Loosduinen, Ockenburg" - 5, p. 92; Rijswijk - 9, p. 46; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; Wassenaar, Meiendel - 3, p 49.
Rhodopaxillus panaeolus (Fr.) Maire *(Tricholoma panaeolum)* omgev. Nijmegen - 6, p. 22; Walcheren (waar?) - 5, p. 31; Wassenaar, Meiendel - 3 p. 49.
Rhodopaxillus saevus (Fr.) Maire *(Tricholoma personatum* en var. *anserinum)* Delft(?) - 4, p. 46; Delft - 7 p. 32; Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19; Noordbroek - 6, p. 32; Spaarndam, IJpolder - 3 p. 64.

Rhodopaxillus sordidus (Fr.) Maire *(Tricholoma sordidum)*: Bunnik, fort Vechten - 19, p. 23; Gorssel - "De Flesch" - 12, p. 19; Loosduinen, Kas - 3, p. 77; Rijswijk - 9, p. 46; Tilburg - 11, p. 61.

Rhodopaxillus truncatus (Schaeff. ex Fr.) Maire (N.B. zie opm. bij Tricholoma geminum!): beschrijving - 7, p. 73; verschil t.o. Hebeloma truncata sensu Lange - 14, p. 56; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64; omgev. Gorssel - 7, p. 73.

Rhodophyllus: zeer zeker is het beter Claudopus, Eccilia, Entoloma, Leptonia en Nolanea tot een geslacht te verenigen; daarvoor mag om nomenclatorische redenen echter niet de naam Rhodophyllus gebruikt worden.

Rhodophyllus cancrinus: zie Eccilia cancrina.

Rhodophyllus clandestinus: zie Nolanea clandestina.

Rhodophyllus cocles: zie Nolanea cocles.

Rhodophyllus fernandae Romagn. (moet tot Nolanea gerekend worden): Gennep, Genneper veen - 13, p. 34; 18, p. 51; 20, p. 48.

Rhodophyllus griseorubellus: zie Eccilia griseo-rubella.

Rhodophyllus hirtipes: zie Nolanea hirtipes.

Rhodophyllus infulus: zie Nolanea infula.

Rhodophyllus inutilis: zie Nolanea inutilis.

Rhodophyllus jubatus: zie Entoloma jubatum.

Rhodophyllus minutus: zie Nolanea minuta.

Rhodophyllus nigrellus: zie Eccilia nigrella.

Rhodophyllus papillatus: zie Nolanea papillata.

Rhodophyllus porphyrophaeus: zie Entoloma porphyrophaeum.

Rhodophyllus rhodocylix: zie Eccilia rhodocylix.

Rhodophyllus rhodopolium: zie Entoloma rhodopolium.

Rhodophyllus sericellus: zie Leptonia sericella.

Rhodophyllus serrulatus: zie Leptonia serrulata.

Rhodophyllus sphagneti: zie Entoloma sphagneti.

Rhodophyllus staurosporus: zie Nolanea staurospora.

Rhodophyllus strigosissimus: zie Nolanea strigosissima.

Rhodophyllus subnigrellus Romagn. (moet tot Eccilia gerekend worden): Doetinchem - 18, p. 51; Doetinchem, Kruisberg - 15, p. 11.

Rhodophyllus undatus: zie Eccilia undata.

Rhodophyllus undatus (Fr.) Quél. var pusillus Lange (moet tot Eccilia gerekend worden): Hatert, Hatertse broek - 18, p. 51.

Rhodophyllus vilis: zie Eccilia vilis.

Rhodophyllus xylophilus Lange: sensu Reijnders, misschien identiek met Nolanea rickenii?

Rhodophyllus (Eccilia)-spec.: Mook, Plasmolen, Groene Water - 20, p. 48.

Rhodophyllus (Entoloma) spec.: Hatert, Hatertse vennen - 15, p. 11.

Rhodotus palmatus (Bull. ex Fr.) Maire *(Pleurotus palmatus)*: beschrijving 5, p. 33; omgev. Amersfoort - 5, p. 33; Amsterdam - 5, p. 33; De Bilt - 5, p. 33 omgev. Haarlem - 5, p. 33; Heemstede - 5, p. 33; omgev. Rotterdam - 16, p. 18; Rozenburg (eiland, waar?) - 9, p. 41; Wildervank (nadere informatie) - 7, p. 34; omgev. Wildervank - 12, p. 49; Zuid-Beveland (waar?) - 5, p. 33.

Rhytisma acerinum Pers. ex Fr.: ontwikkelingsgeschiedenis - 9, p. 73; Haarlem - 9, p. 73.

Ripartites tricholoma (Alb. et Schw. ex Fr.) Karst.: voorkomen in combinatie met Marasmius confluens algemeen? - 12, p. 30, 49. 13, p. 42; Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5, 30; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20, 30; Oosterhout, "Oosterhout" - 12, p. 30.

Rosellinia thelena (Fr.?) Rabenh.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" (nadere informatie) - 18, p. 34.

Rozites caperata (Pers. ex Fr.) Karst. *(Pholiota caperata)*: beschrijving & afb. - 7, p. 11-12; Bussum - 7, p. 12, Gieten (nadere informatie) - 7, p. 11, 34; Gieten - 9, p. 12; 12, p. 17; Loenen - 7, p. 12; Vierhouten - 7, p. 12; Winterswijk - 7, p. 12.

Russula: determinatietabel - 20, p. 27-32.

Russula adusta (Pers. ex Fr.) Fr. gastheer van Nyctalis asterophora, parasitica, Collybia tuberosa - 5, p. 84-85; omgev. Amersfoort - 2, p. 11.

Russula aeruginea Lindbl.: verschil t.o. Russula heterophylla - 11, p. 36; Denekamp - De Lutte - 13, p. 48; omgev. Lunteren - 14, p. 26; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.

Russula albo-nigra (Krombh.) Fr. Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.

Russula alutacea (Pers. ex Schw.) Fr.: Amersfoort - 2, p. 12.

Russula amethystina Quél. (= Russula punctata Krombh. sensu Sing.?): kenmerken - 11, p. 38.

Russula amoena Quél. kenmerken - 11, p. 39; omgev. Hilversum - 11, p. 39.

Russula amoenata Britz. *(Russula caerulea* sensu Cooke): kenmerken - 11, p. 39.

Russula atro-purpurea (Krombh.) Britz.: kenmerken - 11, p. 38-39; Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) 13, p. 10; Oostkapelle "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 8, p. 29; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.

Russula aurora Krombh.: zie Russula rosea.

Russula badia Quél.: oecologie - 8, p. 52; onjuiste determinatie (nadere informatie) - 12; p. 56.

Russula betulina: zie Russula venosa.

Russula brunneo-violacea Crawsh.: kenmerken - 11, p. 39.

Russula caerulea sensu Cooke: zie Russula amoenata.

Russula chamaeleontina Fr.: sensu Zvára, non Bres. (N.B. = Russula punctata Krombh. sensu Sing.?): Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) - 13, p. 10; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13.

Russula chloroides: zie Russula delica var. glaucophylla.

Russula claroflava Grove *(Russula flava)*: geschiedenis naamgeving - 8, p. 51-52; veldkenmerk grauw kleurende steel - 11, p. 38; oecologie - 8, p. 52; Boxtel (nadere informatie) - 17, p. 45; Denekamp, omgev. "Natura Docet" - 13, p. 47; Lochem-Almen, "De Flesch" - 12, p. 19; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39; 20, p. 47; Oisterwijk (nadere informatie) - 17, p. 45; Oisterwijk, Kolkven - 11, p. 38; Oisterwijk, vennengebied - 8, p. 52; Valkenswaard (nadere informatie) - 17, p. 45; Wijster, vennengebied - 12, p. 59.

Russula cyanoxantha (Schaeff. ex Schw.) Fr.: veldkenmerk spekkige lamellen - 18, p. 74; vlees met $FeSO_4$ negatief of lichtgroen - 11, p. 36; verschil t.o. Russula grisea - 7, p. 72-73; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Denekamp - De Lutte - 13, p. 48; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61; Losser - 1, p. 6, omgev. Maarsbergen - 17, p. 25; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; Rijswijk, Rijswijkse bos (teratologicum) - 20, p. 52.

Russula decolorans (Fr.) Fr.: Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 11, p. 37.

Russula delica Fr.: gastheer van Nyctalis parasitica - 5, p. 85; Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28.

Russula delica Fr. var. glaucophylla Quél. *(Russula chloroides)*: gastheer van Nyctalis parasitica - 5, p. 85.

Russula depallens: dubieuze naam, maar vermoedelijk bedoeld sensu Ricken, zie Russula vesca.

Russula drimeia: zie Russula sardonia.

Russula emetica (Schaeff. ex Fr.) Pers. ex S.F.Gray.: Hollandsche Rading - Baarn - 2, p. 66.

Russula exalbicans (Secr.) Melz. et Zv.: Denekamp (nadere informatie) - 11, p. 38; Denekamp - Dinkel - 13, p. 47; Wassenaar, Meiendel (nadere informatie) - 11, p. 38.

Russula farinipes Romell: Hatert, Hatertse broek - 9, p. 39; Oostkapelle, "Westhoven" (nadere informatie) - 12, p. 57; Wijster, "Klencke" - 12, p. 60.

Russula fellea (Fr.) Fr.: veldkenmerk hard vlees, inktachtige geur - 12, p. 57; verschil t.o. Russula ochroleuca - 7, p. 74; Paterswolde (teratologicum) -19, p. 16.

Russula flava (Romell) Romell: zie Russula claroflava.

Russula foetens (Pers. ex Fr.) Fr.: verschil t.o. Russula laurocerasi - 8, p. 12*; gastheer van Nyctalis parasitica - 5, p. 85; omgev. De Lutte - 10, p. 36.

Russula fragilis (Pers. ex Fr.) Fr.: Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze "Buunderkamp" - 11, p. 47; Ulvenhout - 3, p. 75.

Russula grisea (Pers. ex Secr.) Fr. sensu Gill.: verschil t.o. Russula cyanoxantha - 7, p. 72-73, Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 8, p. 29; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Rijswijk, "Overvoorde" (onzeker) - 9, p. 26; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28.

Russula heterophylla (Fr.) Fr. sensu J. Schaeffer: veldkenmerken - 11, p. 36; kweekproef - 3, p. 6, verschil t.o. Russula aeruginea - 11, p. 36; De Lutte - Denekamp - 13, p. 48.

Russula integra (L. ex Vitt.) Fr. sensu Maire, Melzer & Zvára, et. (N.B. wellicht beter Russula polychroma Sing.?): Denekamp - De Lutte - 13, p. 48; Enschede-Glanerbrug - 13, p. 48.

Russula laurocerasi Melz.: verschil t.o. Russula foetens - 8, p. 12*; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Breda, Mastbosch - 8, p. 12; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28; Ulvenhout - 8, p. 12.

Russula lepida Fr.: veldkenmerken - 11, p. 37; verschil t.o. Russula aurora - 11, p. 37; Breda, Liesbosch (nadere informatie) - 11, p. 37; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 11, p. 37; Nijmegen, Beek (nadere informatie) - 11, p. 37.

Russula lutea (Huds. ex Fr.) S.F. Gray: Baarn, "Groeneveld" (onzeker?, nadere informatie) - 13, p. 10.

Russula luteotacta Rea: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64; Wassenaar, "Raaphorst" (waarschijnlijk) - 12, p. 56.

Russula maculata Quél.: Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 12, p. 57; Wassenaar, "Duinrel" (nadere informatie) - 12, p. 56.

Russula melliolens Quél.: kenmerken - 11, p. 38.

Russula mustelina Fr.: Wassenaar, Meiendel (zie Med. Ned. Myc. Ver.), blijkt foute determinatie - 11, p. 39.

Russula nauseosa (Pers. ex Schw.) Fr.: Doetinchem (nadere informatie) - 12, p. 55; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; omgev. 's-Gravenhage (nadere informatie) - 12, p. 55; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77.

Russula nigricans (Bull. ex) Fr.: gastheer van Nyctalis asterophora, parasitica, Collybia tuberosa - 5, p. 85; kweekproef - 3, p. 6; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 47; omgev. Chaam - 6, p. 35; Gieten - 9, p. 12;

Hilversum (teratologicum) - 15, p. 3-4*; Rijswijk, Rijswijkse bos (teratologicum) - 20, p. 52; Ulvenhout - 2, p. 45.

Russula nitida (Pers. ex Schw.) Fr.: Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61; Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" - 8, p. 29.

Russula ochroleuca (Pers. ex) Fr.: verschil t.o. Russula fellea - 7, p. 74; teratologicum (identiteit onzeker) - 19, p. 15*.

Russula paludosa Britz.: veldkenmerken - 11, p. 37; oecologie - 8, p. 52; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.

Russula parazurea J. Schaeff.: omgev. Bussum - 14, p. 77.

Russula pectinata (Bull. ex) Fr.: Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 39; omgev. Haarlem - 6, p. 12; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77.

Russula pseudo-integra Arn. et Gor.: kenmerken - 11, p. 38; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67.

Russula puellaris Fr.: verschil t.o. Russula versicolor - 12, p. 54.

Russula queletii Fr.: verschil t.o. Russula drimeia - 12, p. 56; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.

Russula raoultii (Quél.) Sing.: Denekamp (nadere informatie) - 12, p. 56; Gorssel (nadere informatie) - 12, p. 55; Winterswijk (nadere informatie) - 12, p. 55.

Russula rosea Quél. *(Russula aurora)*: verschil t.o. Russula lepida - 11, p. 37; Breda, Liesbosch - 19, p. 63; omgev. De Lutte - 13, p. 48.

Russula rubra (Fr. sensu Krombh.) Fr. (N.B. tot veel verwarring geleid hebbende soort): omgev. Amersfoort - 2, p. 11.

Russula sanguinea (Bull. ex Poll.) Fr.: Renkum "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.

Russula sardonia Fr. *(Russula drimeia)*: verschil t.o. Russula queletii - 12, p. 56; omgev. Ruurlo (teratologicum) - 19, p. 15*-16; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77; Wouwsche Plantage - 12, p. 56.

Russula solaris Ferd. et Winge: Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 12, p. 57.

Russula subfoetens W.G. Smith: Oostkapelle, "Westhoven" (nadere informatie) - 18, p. 29; Ulvenhout - 2, p. 45.

Russula turci Bres. (= Russula punctate Krombh. sensu Sing.?): veldkenmerk jodoformgeur - 13, p. 47; Denekamp-De Lutte - 13, p. 47.

Russula velenovskyi Melz. et Zv.: omgev. Denekamp - 13, p. 47; Oostkapelle, "Berkenbosch" (nadere informatie) - 12, p. 57; Wouwsche Plantage - 8, p. 52; Wijster, "Klencke" - 12, p. 60.

Russula venosa Vel. em. Melz. *(Russula betulina* Melz.; volgens Singer = Russula sphagnophila Kauffm.): omgev. Denekamp - 13, p. 47; Oisterwijk, Belversven - 12, p. 54-55; Valkenswaard - 19, p. 63; Wassenaar, Meiendel - 12, p. 54-55.

Russula versicolor J. Schaeff.: verschil t.o. Russula puellaris - 12, p. 54; Oostkapelle, "Berkenbosch" (nadere informatie) - 12, p 57; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Valkenswaard - 19, p. 63; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 19 (nadere informatie), 52.

Russula vesca Fr. sensu Maire Bres., non Ricken (*Russula depallens* sensu Ricken) kenmerken - 11, p. 36; Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) - 13, p. 10; omgev. Denekamp - 13, p. 47; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25; Ulvenhout - 1, p. 52; 3, p. 74.

Russula veternosa Fr. sensu Bres., Quél.: De Bilt (nadere informatie) - 12, p. 56.

Russula virescens (Schaeff. ex Zanted.) Fr.: Denekamp-De Lutte - 13, p. 48.

Russula viscida Kudrna: Valkenswaard - 19, p. 64.

Russula xerampelina (Schaeff. ex Secr.) Fr.: veldkenmerken - 11, p. 36-37; vlees intens groen met $FeSO_4$ - 11, p. 36; Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 3; Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) - 13, p. 10.

Russula spec.: slakkenvraat - 6, p. 14*.

Rutstroemia bolaris (Batsch ex Fr.) Rehm: Amersfoort - 14, p. 66.

Rutstroemia firma (Pers. ex Fr.) Karst.: Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 12, p. 42; omgev. Eindhoven - 15, p. 32.

Rutstroemia sydowiana (Rehm) White (*Ciboria sydowiana*): Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 40; 12, p. 42; 20, p. 48.

Saccharomyces cerevisiae Meyen: habitustekening - 15, p. 25.

Sarcodon fennicus (Karst.) Karst. (waarschijnlijk foutief als Hydnum scabrosum): omgev. Bilthoven - 10, p. 39.

Sarcodon fuligineo-albus (Schmidt ex Fr.) Quél.: omgev. Bussum - 14, p. 77.

Sarcodon imbricatus (L. ex Fr.) Karst. (*Hydnum imbricatum*): Amerongen - 7, p. 35; Beekhuizen - 5, p. 40; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46; omgev. Chaam - 6, p. 35; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p 7; Heilo, Heiloër bos - 17, p. 30.

Sarcodon inopinatus Donk (*Hydnum inopinatum*): habitustekening - 9, p. 71; Amersfoort, "De Boom" - 13; p. 10; omgev. Bilthoven - 10, p. 39; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.

Sarcodon mollis (Fr.) Quél. (*Hydnum molle*): omgev. Chaam - 6, p. 35.

Sarcoscypha radiculata (Sow. ex Fr.) Sacc. var. percevalii (Phill.) Sacc. (*Discina radiculata* var. *percevali*): Walcheren, waterleidingterrein (nadere informatie) - 6, p. 38.

Schizophyllum commune Fr.: beschrijving & afb. - 6, p. 7-8; omgev. Aalst - 14, p. 60; Ter Apel - 6, p. 7; Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 7.

Scleroderma aurantium (L. ex) Pers. *(Scleroderma vulgare)*: gelijkenis met jonge Myriostoma coliforme - 2, p. 44-45; standplaats - 3, p. 79, gastheer van Boletus parasiticus - 5, p. 85; omgev. Amersfoort - 2, p 11; Breda, Mastbosch - 3, p. 39; Delft, stadsplein - 17, p. 26, omgev. Stadskanaal - 6, p. 10-11*; Ulvenhout - 3, p. 74.
Scleroderma bovista Fr.: Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 76
Scleroderma verrucosum Pers.: gastheer van Boletus parasiticus - 5, p. 85
Scleroderma vulgare: zie Scleroderma aurantium
Sclerotinia candolleana (Lév.) Fuck. Mook, Plasmolen, Heilekuil - 11 p. 43; 12, p. 43.
Sclerotinia kirschsteiniana P.Henn.: beschrijving & afb. - 15, p. 9*-10, Naardermeer, Jan Hagenbos - 15, p. 9, 11.
Sclerotinia oxycocci: zie Monilinia oxycocci.
Sclerotinia pseudo-tuberosa: zie Ciboria batschiana.
Sclerotinia rapulum (Bull. ex Fr.) Rehm *(Tarzetta rapulum)* Bergen - 12 p. 42.
Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fuck. *(Peziza tuberosa)*. Barneveld Barneveldsche beek (nadere informatie) 11, p 20 omgev. Eindhoven - 15, p. 32; Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 36; 's Gravenhage, Haagsche Bosch - 13, p. 15; Vogelenzang - 17, p. 46.
Selenaspora batava Heim et Le Gal: beschrijving & afb. - 10, p 5-8. Epse, Epser bos - 10, p. 4; 12, p. 42.
Sepedonium chrysospermum (Bull. ex) Fr. imperfecte vorm van Hypomyces chrysospermus: parasiet bp boleten - 12, p. 41.
Sepultaria arenosa (Fuck.) Rehm omgev. Acht (nadere informatie) - 19 p. 64; Doetinchem, "Slangenburg" - 9 p. 40; Eindhoven, Oirschotse dijk Rijkskrankzinnigengesticht, "Wielewaal" (nadere informatie) - 19, p. 64
Sistotrema confluens Pers. ex Fr., De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18.
Slijmzwam; plasmodium stadium - 6, p. 81*.
Sparassis crispa: zie Masseeola crispa.
Spathularia clavata: zie Spathularia flavida.
Spathularia flavida Pers. ex Fr. *(Spathularia clavata)*: beschrijving & afb. - 17, p. 63-64; Eindhoven-Heeze - 17, p. 63; Utrecht, Oud Amelisweert - 17, p. 63.
Spathularia neesii Bres.: beschrijving - 17, p. 63.
Sphaerobolus stellatus Tode ex Pers. Amsterdam Zuidelijke Wandelweg - 8, p 39; Best - 19, p 64; Heelsum-Doorwerth - 13, p 19; Rotterdam, Kralinger Hout - 16, p. 18, Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66, De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30, Wassenaar, "Duinrel" - 15, p. 6.
Sphaerospora confusa (Cooke) Sacc Epse, Epser bos - 7, p 56*, 12, p. 42. Mook, omgev. St. Jansberg - 12, p. 6.

Sphaerospora trechispora (Berk. et Br.) Sacc.: Doetinchem, "Slangenburg" - 12, p. 25; 14, p. 66; Texel, De Geul - 3, p. 75.
Spicaria tenuipes (Peck) Petch: 's-Hertogenbosch(?) - 18, p. 45*; omgev. Turnhout - 18, p. 45.
Spumaria alba (Myxomycetes): zie Mucilago spongiosa.
Stemonitis fusca Roth (Myxomycetes). Haarlem, stadstuin - 3, p. 12.
Stephanoma tetracoccum van Zinderen Bakker: parasiet op Geoglossum hirsutum - 12, p. 39; Soest, Soesterveen - 12, p. 39.
Stereum hirsutum (Willd. ex Fr.) Fr.: voorkomen op eiken dwarsliggers - 6, p. 44; omgev. Aalst - 14, p. 60; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; Haarlem, omgev. Haarlemmer Hout - 5, p. 57; Nieuw Beerta - 6, p. 32.
Stereum purpureum (Pers. ex Fr.) Fr.: omgev. Aalst - 14, p. 60; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; Nieuw Beerta - 6, p. 32.
Stereum rugosum (Pers. ex Fr.) Fr.: Haarlem, omgev. Haarlemmer Hout - 5, p. 57.
Strobilomyces floccopus (Vahl ex Fr.) Karst. *(Strobilomyces strobilaceus)*: beschrijving & afb. - 8, p. 27-28; diagnose - 18, p. 18; Ubbergen - 18, p. 18; Vaaks, Drielandenpunt - 8, p. 27.
Strobilomyces strobilaceus: zie Strobilomyces floccopus.
Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quél.: omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19; Rijswijk, Julianalaantje, "Overvoorde" - 8, p. 40; Wassenaar, "Raaphorst" - 8, p. 40; 18, p. 9.
Stropharia caput medusae: zie Psathyrella caput-medusae.
Stropharia comtula: zie Agaricus comtulus.
Stropharia coronilla (Bull. ex Fr.) Quél.: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; Amsterdam, Vondelpark - 7, p. 59; omgev. Haarlem - 15, p. 32; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Nieuw Loosdrecht (nadere informatie) - 17, p. 44; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23; Zuid-Beveland, Kaloot, - 20, p. 71.
Stropharia epimyces: zie Pilosace algeriensis.
Stropharia hypsipoda: zie Psathyrella hypsipoda.
Stropharia inuncta (Fr.) Quél.: Deventer-Lochem, omgev. "'t Joppe" - 7, p. 23; omgev. Maarn - 14, p. 77; Pernis - 14, p. 30.
Stropharia jerdonii: zie Psathyrella jerdonii.
Stropharia luteonitens (Vahl ex Fr.) Quél.: Doorn-Maarn - 19, p. 11.
Stropharia merdaria (Fr.) Quél.: facultatief mestbewoner - 8, p. 39; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Bilthoven, De Pan - 18, p. 8; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38

Stropharia semiglobata (Batsch ex Fr.) Quél. *(Stropharia stercoraria)*: Amersfoort - 2, p. 12; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; omgev. Bergen - 9, p. 68; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 34; Hilversum-Baarn - 13, p. 19.
Stropharia separata: zie Anellaria semiovata.
Stropharia squamosa (Pers. ex Fr.) Quél.: Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19.
Stropharia stercoraria: zie Stropharia semiglobata.
Stylopaga hadra Drechsler: Nematode-vangend apparaat - 17, p. 59*.
Suillus castaneus: zie Gyroporus castaneus.
Suillus cyanescens: zie Gyroporus cyanescens.
Symplectromyces vulgaris Thaxter: habitustekening - 14, p. 58.
Tapesia hydrophila (Karst.) Rehm: Geldermalsen - 11, p. 43.
Taphrina aurea: zie Taphrina populina.
Taphrina populina Schum. ex Fr. *(Taphrina aurea)*: omgev. Haarlem - 5 p. 18.
Tarzetta rapulum: zie Sclerotinia rapulum.
Telamonia: subgenus van Cortinarius.
Tephrophana atrata: zie Collybia atrata.
Tephrophana palustris: zie Collybia palustris.
Thecopsora vacciniorum (Link) Karst.: uredin.: Renkum, Renkumsche beek - 19, p. 41.
Thelephora caryophyllea Schaeff. ex Fr.: De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11.
Thelephora mollissima Pers. ex Fr.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.
Thelephora pallida Pers. ex Fr. *(Thelephora sowerbii* var. *pallida)*: De Steeg, "Middachten" - 12, p. 26; Winterswijk - 12, p. 26.
Thelophora palmata Scop. ex Fr.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 34.
Thelephora sowerbii Berk. et Br., beschrijving & afb. - 12, p. 26-27. Delden, "Twickel" - 5, p. 59; Heerde, Bakhuisbos - 12, p. 23; Heeze - 12, p. 49.
Thelephora sowerbii var. *pallida*: zie Thelephora pallida.
Trametes gibbosa (Pers. ex Fr.) Fr.: verschil t.o. Daedalea quercina - 8, p. 41* Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 38; 's-Gravenhage "Clingendaal" - 11, p. 65.
Trametes mollis (Sommerf.) Fr.: Wageningen, Holleweg - 8, p. 19.
Trametes odora: zie Trametes suaveolens.
Trametes pini: zie Ochroporus pini.
Trametes serialis (Fr.) Fr.: De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.
Trametes suaveolens (Fr.) Fr. *(Trametes odora)*: Druten, Leuven - 9, p. 39; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40.

Trametes trogii Berk.: omgev. Valkenswaard - 3, p. 48.
Tremella foliacea Pers. ex Fr.: Amersfoort - 2, p. 12; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; omgev. Tilburg - 11, p. 63; Wassenaar, "Duinrel" - 11, p. 65.
Tremella mesenterica Retz. ex Fr.: Denekamp, Breklenkamp - 17, p. 43; Wassenaar, Meiendel - 2, p. 66.
Tremella mycetophila Peck: teratologicum bij Collybia dryophila - 5, p. 72-73.
Tremella steidleri (Bres.) Bourd. et Galz.: Gennep, Ottersum - 17, p. 6; 20, p. 49.
Tremella tubercularia Berk.: Vierlingsbeek - 9, p. 39.
Tremellodon gelatinosum (Fr.) Pers.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; omgev. Chaam - 6, p. 35; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7; Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18*; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; omgev. Oisterwijk - 11, p. 62; Olterterp - 6, p. 38; 7, p. 35.
Tricharia fimbriata (Quél.) Boud.: Beugen - 12, p. 25.
Tricharia gilva Boud.: Wieringermeerpolder (waar?) - 12, p. 42.
Trichoderma koningii Oud.: zie Trichoderma viride.
Trichoderma viride Pers. ex Fr. *(Trichoderma koningii)*: begeleider champignoncultuur - 8, p. 48.
Trichoglossum hirsutum (Pers. ex Fr.) Boud. *(Geoglossum hirsutum)*: Soest, Soesterveen - 12, p. 39.
Tricholoma albo-brunneum (Pers. ex Fr.) Quél.: Texel, staatsbossen - 6, p. 55; omgev. Winterswijk - 11, p. 17.
Tricholoma album (Schaeff. ex Fr.) Quél.: vegetatiefoto (identiteit onzeker) - 7, p. 2; Vogelenzang - 5, p. 66; Wassenaar, Meiendel, Kijfhoek - 14, p. 59; IJmuiden, Heerenduin - 14, p. 52.
Tricholoma argyraceum: zie Tricholoma scalpturatum.
Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc.: Gorssel, " 't Joppe" - 12, p. 20.
Tricholoma aurantium (Schaeff. ex Fr.) Ricken: Wassenaar, "Duinrel" - 11, p. 65; 12, p. 48.
Tricholoma brevipes: zie Melanoleuca brevipes.
Tricholoma carneum (Bull. ex Fr.) Quél.: Baarn, "Groeneveld", Torenlaan (nadere informatie) - 13, p. 10; Tilburg - 11, p. 62; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
Tricholoma cartilagineum: zie Lyophyllum loricatum.
Tricholoma cinerascens: zie Lyophyllum cinerascens.
Tricholoma cingulatum: zie Tricholoma ramentaceum.

Tricholoma cnista: zie Melanoleuca cnista.
Tricholoma columbetta (Fr.) Quél.: omgev. Amersfoort - 3, p. 79; Doorn-Maarn - 19, p. 11; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
Tricholoma conglobatum: zie Lyophyllum cinerascens.
Tricholoma cryptarum: onbetekenende, in het donker gegroeide, vorm van Lyophyllum aggregatum.
Tricholoma elytroides (Fr.) Karst.: omgev. De Bilt (onzeker) - 6, p. 40.
Tricholoma equestre (L. ex Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Heilo, Heiloër bos - 17, p. 30; Wassenaar, "Duinrel" - 12, p. 48; Zeist - 6, p. 71.
Tricholoma excissum: zie Melanoleuca excissa.
Tricholoma flavo-brunneum (Fr. ex Fr.) Quél.: Beekhuizen - 5, p. 40; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
Tricholoma focale (Fr.) Ricken: omgev. Hilversum - 9, p. 45
Tricholoma gambosum: zie Tricholoma georgii f. gambosum.
Tricholoma geminum (Paul. ex Fr.) Gill. sensu Sev. Petersen: volgens Reijnders vermoedelijk juister dan Rhodopaxillus truncatus - 14, p. 56-57.
Tricholoma georgii (Clus. ex Fr.) Quél. f. gambosum (Fr.) Konr. et Maubl. *(Tricholoma gambosum)*: Bergen, Berger bos - 2, p. 64; Bloemendaal(?) - 5, p. 93; omgev. Haarlem - 5, p. 93; Oud Valkenburg, Sibber Grubbe - 18, p. 35; omgev. Wageningen - 5, p. 93; Wageningen, Grebbeberg - 9, p. 56.
Tricholoma grammopodium: zie Melanoleuca grammopodia.
Tricholoma hortense: zie Lyophyllum aggregatum.
Tricholoma humile: indien bedoeld sensu Ricken, zie Melanoleuca oreina.
Tricholoma imbricatum (Fr.) Quél.: Lunteren, "De Leperkoen" - 14, p. 25*, 27; Wassenaar, "Duinrel" - 7, p. 35; Wolfheze, "Buunderkamp" - 6, p. 39.
Tricholoma immundum: zie Lyophyllum immundum.
Tricholoma inamoenum (Fr.) Quél.: Wassenaar, "Raaphorst" - 14, p. 59; Wassenaar, "Voor-Linden" - 14, p. 60.
Tricholoma infumatum: zie Lyophyllum infumatum.
Tricholoma inocybeoides Pearson: beschrijving - 11, p. 20; IJmuiden, Heerenduin - 11, p. 20.
Tricholoma ionides (Bull. ex Fr.) Quél.: 's-Gravenhage, Nieuwe Scheveningsche Boschjes - 1, p. 57; omgev. Haarlem - 6, p. 39; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; omgev. Ruurlo - 4, p. 27.
Tricholoma irinum: zie Rhodopaxillus irinus.
Tricholoma leucocephalum (Fr.) Quél. sensu Lange: omgev. Winterswijk (indien tenminste gedetermineerd met Lange) - 11, p. 19.

Tricholoma leucocephalum sensu Ricken: dubieus, volgens Konrad en Maublanc niet identificeerbaar - 3, p. 75; 7, p. 35; 56.
Tricholoma melaleucum: zie Melanoleuca melaleuca.
Tricholoma nudum: zie Rhodopaxillus nudus.
Tricholoma odoratum (Cool) Konr. et Maubl. *(Lepiota odorata)*: Baarn, omgev. "Groeneveld" - 9, p. 28.
Tricholoma opaca Schroeter et Nüesch Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28.
Tricholoma oreinum: zie Melanoleuca oreina.
Tricholoma panaeolum: zie Rhodopaxillus panaeolus.
Tricholoma persicolor (Fr.) Karst: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67.
Tricholoma personatum: zie Rhodopaxillus saevus.
Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél. *(Tricholoma stans)*: Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; omgev. Hilversum - 9, p. 45; omgev. Nijmegen - 6, p. 22.
Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Zeist - 6, p. 71.
Tricholoma ramentaceum (Bull. ex Fr.) Ricken *(Armillaria ramentacea, Tricholoma cingulatum)*: Bergen, Verbrande Pan - 3, p. 75; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7.
Tricholoma russula: zie Hygrophorus russula.
Tricholoma rutilans (Schaeff. ex Fr.) Quél.: verschil t.o. Phylloporus rhodoxanthus - 12, p. 13; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Overveen, "Elswout" - 6, p. 14; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
Tricholoma saponaceum (Fr. ex Fr.) Quél.: Amersfoort - 2, p. 12; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. *(Tricholoma argyraceum)*: Breda, Mastbosch - 2, p. 45.
Tricholoma sejunctum (Sow. ex Fr.) Quél.: Gorssel, "'t Amelte" - 7, p. 24; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67.
Tricholoma semitale: zie Lyophyllum semitale.
Tricholoma sordidum: zie Rhodopaxillus sordidus.
Tricholoma squarrulosum Bres.: Deventer-Lochem, omgev. "'t Joppe" - 7, p. 23; Wassenaar, Meiendel - 2, p. 66.
Tricholoma stans: zie Tricholoma pessundatum.
Tricholoma terreum (Schaeff. ex Fr.) Quél: Bunnik, fort Vechten - 19,

p. 23; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Markelo (teratologicum) - 19; p. 16; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; 6, p. 14; Wassenaar, "Duinrel" (teratologicum) - 20, p. 53.

Tricholoma trigonosporum: zie Lyophyllum trigonosporum.

Tricholoma ustale (Fr. ex Fr.) Quél.: Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; 5, p. 38

Tricholoma vaccinum (Pers. ex Fr.) Quél.: omgev. Rijssen - 12, p. 14.

Tricholoma virgatum (Fr.) Gill.: beschrijving - 9, p. 25; Delden, "Twickel" - 9, p. 18; Heerde, Wapenvelde - 9, p. 25; Hilversum, Bussumer Grintweg - 9, p. 44.

Trichophaea woolhopeia: zie Lachnea woolhopeia.

Triphragmium ulmariae (Schum.) Link: aecid., uredin., telium: Wageningen Binnenveld - 19; p. 40.

Tubaria autochthona (Berk. et Br.) Sacc.: Oosterhout, "Oosterhout" - 11, p. 43; 13, p. 42.

Tubaria furfuracea (Pers. ex Fr.) Gill. *(Naucoria pellucida* sensu Ricken): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11; p. 48.

Tubaria pellucida (Bull. ex Fr.) Gill. sensu Romagn.: omgev. Wageningen - 20, p. 33.

Tuber dryophilum Tul.: Rotterdam, Kralinger Hout - 16, p. 17.

Tulostoma brumale Pers. ex Pers. *(Tulostoma mammosum)*: Egmond aan Zee - 5, p. 65; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p 61; Voorne, duinen Rockanje - 19, p. 24.

Tulostoma granulosum Lév.: Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78.

Tulostoma mammosum: zie Tulostoma brumale.

Tylopilus felleus (Bull. ex Fr.) Karst. *(Boletus felleus)*: diagnose - 18, p. 19-20; Amersfoort-Woudenberg, De Treek - 19, p. 23; Best (nadere informatie) - 17, p. 45; omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17; p. 45; Oirschot (nadere informatie) - 17, p. 45; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Wassenaar, "Duinrel" - 11, p. 65.

Typhula erythropus Pers. ex Fr. *(Cnazonaria erythropus)*: beschrijving & afb. - 18, p. 14-15; Epse, Epser bos - 10, p. 41.

Typhula grevillei: zie Pistillaria setipes.

Typhula juncea: zie Clavariadelphus junceus.

Typhula phaco rhiza (Reich. ex) Fr.: beschrijving & afb. - 18, p. 14-15. Baarn, "Groeneveld" - 18, p. 47; Vogelenzang - 5, p. 67-68*.

Typhula quisquiliaris (Fr. ex Fr.) Corner *(Pistillaria quisquiliaris)*: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 55; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7,

p. 46; Gieten - 9, p. 12*; Hooge Vuursche-Baarn - 19, p 67; Mook, Plasmolen - 5, p. 55; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 48; 20, p. 47; De Vuursche, Lage Vuursche - 8; p. 31.

Tyromyces caesius (Schrad. ex Fr.) Murr. *(Polyporus caesius)*: Overveen, "Elswout" - 5, p. 39; De Punt, "De Poll" - 17, p. 65; Vijlen, Vijlener bos - 10, p. 30.

Tyromyces fragilis (Fr.) Donk (? *Polyporus mollis*) Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66.

Tyromyces ptychogaster (Ludwig) Donk *(Ceriomyces Ptychogaster albus)* Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61

Tyromyces semipileatus (Peck) Murr. *(Polyporus chioneus)* omgev. Oosterwolde - 5, p. 41.

Tyromyces sulphureus (Bull. ex Fr.) Donk *(Polyporus sulphureus)* voorkomen op eiken dwarsliggers - 6, p. 44; omgev. Delden - 1 p. 29 Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46 omgev. Haarlem - 5; p. 93; Heilo Heiloër bos - 13, p. 30; Nijmegen Nassaulaan - 13, p. 29; omgev. Tilburg(?) - 11, p. 61; Voorst; "'t Schol" - 12, p. 75.

Ulocolla saccharina: zie Exidia saccharina.

Uromyces armeriae (Schlecht.) Lév.: uredin., telium: Arnhem - 19, p. 38.

Uromyces betae (Pers.) Lév.: aecid., uredin., telium Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 37.

Uromyces dactylidis Otth: aecid., uredin. telium omgev. Wageningen - 19, p. 37.

Uromyces ervi (Wallr.) West.: telium: Bennekom, Kraats - 19, p. 37 Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 37.

Uromyces fabae (Pers.) De By.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven, Binnenveld, Lage Steeg - 19, p. 37.

Uromyces ficariae (Schum.) Lév.: uredin., telium: Doorwerth, kasteel "Doorwerth" - 19; p. 37.

Uromyces loti (Kirchn.) Blytt uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19; p. 37.

Uromyces phaseoli (Pers.) Wint. aecid., uredin., telium: Wageningen, Lage Steeg, Hoge Steeg, Binnenhaven - 19, p. 37.

Uromyces pisi (Pers.) Schroet.: aecid.: Doorwerth De Zalmen; uredin., telium: Wageningen, Dijk - 19, p. 37.

Uromyces rumicis (Schum.) Wint.: uredin., telium: Wageningen, Holleweg, Binnenveld - 19; p. 37.

Uromyces trifolii (Hedw.) Lév. uredin., telium: Wageningen Binnenhaven, Binnenveld, Eng - 19, p. 38.

Uromyces trifolii-repentis (Cast.) Liro: aecid., uredin., telium: Wageningen, Binnenveld, Eng - 19, p. 37.
Uromyces valerianae (Schum.) Fuck.: aecid., uredin., telium: Renkum, "Oranje Nassau Oord" - 19, p. 37; Wageningen, Grift - 19, p. 37.
Uropyxis mirabilissima Magn.: Wageningen - 19, p. 41.
Vararia ochroleuca (Bourd. et Galz.) Donk: Wassenaar, Meiendel - 5, p. 87.
Vermicularia dematium Pers. ex Fr.: beschrijving - 18, p. 27*, 30; Doorn - 18, p. 30; Wageningen - 18, p. 30.
Verpa conica Müll. ex Fr.: Nijmegen, stadstuin - 10, p. 37; Vogelenzang - 5, p. 93.
Verpa digitaliformis Pers. (wellicht identiek met Verpa conica?): Amersfoort - 10, p. 51; omgev. Assen - 10, p. 51; Egmond-Bergen - 4, p. 13; Leersum - 10, p. 49; Oostvoorne - 12, p. 47; Rhenen, Grebbeberg - 10, p. 50; Scheveningen - 12, p. 47.
Verpa helvelloides Krombh. (identiek met of varieteit van Verpa conica?): Arnhem - 15, p. 11.
Verpa krombholzii Corda: Alkmaar (onzeker) - 4, p. 13.
Verticicladium cf. acuum Oudem.: beschrijving & afb. - 19, p. 30-31, 33; conidiale stadium van Desmazierella acicola Lib. - 19, p. 34-35.
Volvaria bombycina (Pers. ex Fr.) Quél.: Heere, Kasteellaan - 14, p. 34; Wassenaar, Meiendel - 14, p. 51.
Volvaria gloiocephala: zie Volvaria speciosa.
Volvaria hypopithys subsp. *Loweana*: zie Volvaria loveiana.
Volvaria loveiana (Berk.) Gill. *(Volvaria hypopithys* subsp. *Loweana)*: parasiet op Clitocybe nebularis, clavipes - 5, p. 85; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 34, 42-43*.
Volvaria pusilla (Pers. ex Fr.) Quél.: Velsen, binnenshuis - 14, p. 52; Walcheren (waar?) - 5, p. 31; 8, p. 29.
Volvaria speciosa (Fr.) Gill. *(Volvaria gloiocephala)*: toevallige begeleider der champignoncultuur - 8, p. 48-49*; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; omgev. Amersfoort - 14, p. 65; Amsterdam, gasfabriek, Stadion - 7, p. 60; Beverwijk-Bloemendaal - 6, p. 38; omgev. Bussum - 5, p. 40; omgev. Delft - 10, p. 24; Eindhoven - 7, p. 60; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 6, p. 38; Heeze - 7, p. 76; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25; Nieuw Beerta - 6, p. 15; 32; omgev. Rotterdam - 8, p. 48; Voorst "'t Schol" - 12, p. 75; Wassenaar, "Duinrel" - 7, p. 35; 14, p. 78.
Volvaria taylori (Berk.) Quél.: Alkmaar - 7, p. 55.
Vuilleminia comedens (Fr.) Maire: Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.
Xeromphalina campanella (Batsch ex Fr.) Kühner et Maire *(Omphalia campanella)*: Haarlem, stadstuin - 3, p. 11.

Xeromphalina cauticinalis (With. ex Fr.) Kühner et Maire *(Marasmius cauticinalis)*: omgev. Ruurlo - 4, p. 27.
Xeromphalina cornui (Quél.) Favre *(Omphalia cornui)*: Hatert, Uiversnest - 16, p. 9.
Xerula pudens (Pers. ex S. F. Gray) Sing. *(Collybia longipes)*: De Steeg, "Middachten" - 5, p. 60; 8, p. 18; Zoelen - 6, p. 9.
Xylaria carpophila (Pers. ex Fr.) Fr.: Baarn, "Groeneveld" - 18, p. 47.
Xylaria hypoxylon (L. ex Fr.) Grev.: vegetatiefoto - 6, p. 18; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 38; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Ulvenhout - 2, p. 38; 3, p. 42; Wolfheze, omgev. "Buunderkamp" (cristata-vorm) - 6, p. 73.
Xylaria obovata Berk.: habitustekening & details - 9, p. 3.
Xylaria polymorpha (Pers. ex Fr.) Grev.: Amsterdam, Vondelpark - 11, p. 24; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 38; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32.

OFFSETDRUK S. O. L.
Apollolaan 185 - Amsterdam-Z. - Tel. 25714